

ALBERT R. MANN
LIBRARY

AT

CORNELL UNIVERSITY



COMSTOCK
MEMORIAL LIBRARY
of
Entomology

Gift of
H. H. Schwardt Memorial
Fund

7
Ent. Förs. K. 1515741
Stockholm

Emil Holmgren

LEPIDOPTERA

SCANDINAVIÆ

RHOPALOCERA,

DISPOSITA ET DESCRIPTA.

AUCTORE

H. D. J. WALLENGREN.

MALMÖGÆ,

EX OFFICINA CRONHOLMIANA,

1853.

Skandinaviens
Dagfjärilar,

beskrifne

af

S. D. J. Wallengren.

Malmö,
tryckt hos B. Cronholm,
1858.

9L

561

R47

W19

Ent

Åt

Hans Excellence

Högvälborne Herr Grefven

H. G. Trolle Wachtmeister,

En af Rikets Herrar, f. d. Justitiæ-Kansler, Riddare och
Commendör af Kongl. Maj:ts Orden, Ledamot af Kongl.
Wetenskaps-Akademien,

egnas detta arbete

Vördnadsfullt

af

Författaren.

Förord.

Härmed lemnas i Allmänhetens händer ett försök till Bearbetning af de Dagsskrifter, som hittills blifvit funna inom Sverige och Norge. Många äro de brister, som widlåda detta försök. Det utgifwes också utan alla anspråk, endast under den önskan, att det måtte tjena till en handledning för nybegynnaren och för landthushållaren, som önskar lära känna de djurarter, det afhandlar. Dertföre har det äfwen blifwit till största delen affattadt på vårt eget språk, isynnerhet som det eljest, företrädesvis af författare i Entomologien, brukade latinet gör arbetena otillgängliga för den större mängden af dem inom vårt land, som hysa både vilja och lust att egna lediga stunder åt naturens studium, och äfwen till en del hafwa behof af att känna de skadliga och nyttiga insektarterne, men icke förstå det begagnade språket. Likväl hafwa äfwen här dels diagnoser för släkten och arter blifwit bifogade på latin för att gifwa utländska Entomologer tillkänna hvilka arter war halv-ö fostrar; dels hafwa också beskrifningar blifwit på samma språk affattade för de arter, som äro egna för vår Fauna och dertföre i samlingar utomlands samlade, samt äfwen till en del ofända eller misfända.

På arbetet har jag använt de lediga ögonblick, som en trågen tjenstgöring lemnat. Då jag således icke oafbrutet funnat sysselsätta mig med saken, hafwa äfwen här och der inconsequenser insmugit sig, hvilka torde benäget öfverses och ursäktas. Till

följe af tryckningsortens aflägsenhet och deraf uppkommande hinder för mig, att sjelf i allo besörja korrekturläsningen, hafwa tryckfelen blifwit många, men de betydligaste och mest förvillande äro efteråt bland rättelserne och tilläggen fullständigt upptagne, och torde före bokens begagnande rättas. Med de mindre och obetydligare torde den gunstbenägne läsaren öfwerse.

Det wore wiðerfärligen min affigt att så småningom lemna beskrifningar öfwer alla våra Fjärilar, och detta är orsaken till det rhapsodiska sätt, hwarpå de ännu, som Inledningen afhandlar, blifwit framställda; men innan en sådan önskan kan realiseras, behöfwa ännu många undersökningar på stilda orter inom war på omverlande lokaler så rika half-ö anställas, serdeles hwar Vinnés *Noctua* och de smärre Fjärilarne beträffar. Så wiðsträckt undersökningar är jag icke i tillfälle göra, hwarföre jag och wägar hemställa till dem, som intressera sig för saken, att antingen på lämpligt ställe i våra Tidskrifter — och helst detta — offentliggöra sina iagttagelser, eller och på ensild wäg lemna mig del deraf. Prioritetsrättigheten skall alltid blifwa af mig samwetsgrannt respekterad. — Öwisgheten huruvida min här ofwan uttalade önskan kan uppfyllas, har dock föranledt mig att utgifwa denna Beskrifning under fersild titel, isynnerhet som de här afhandlade fjärilarterne bilda ett helt för sig.

Jag kan derjemte icke underlåta att här offentliggen uttala min stora tacksamhet för Gäderneslandets utmärkta Naturforskare, mina wördade Lärare, Hrr. Prof. och Commend. S. Nilsson och Prof. och Ridd. J. W. Zetterstedt, samt Prof. och Ridd. G. S. Boheman, hwilka med uppmuntringar, råd och upplysningar gynnat mig uti mitt förehafwande. De båda sistnämnde, äfwen som Prof. och Ridd. P. F. Wahlberg, hafwa också, jemte det de meddelat exemplar af många sällhynta arter, till frött begagnande upplåtit dels deras ensilda, dels och de offentliga, under deras wärd stående rika samlingar. Likaså hafwa Hrr. Acad. Adjunkterne M. G. Dahlbom och W. Siljebohm på ett wänskapsfullt sätt befördrat mitt företag, dels genom wärdetta upplysning

gar, dels och genom meddelande af exemplar. Från Hr. Thool. Doct. och Ordensledamoten Ch. Stenhammar har jag äfwen fått mottaga upplysningar om fjärilarterne i hans ort, äfwenfom från Prostén och Ordensledamoten J. Pontén. Målare-Mästaren M. Fredricheson i Norberg, hvilka med berömvärd isfver egnar sin lediga tid åt naturens studium, har också sändt mig många arter från Dalarne och Westmanland, jemte anteckningar rörande deras flygtid m. m. Vertill att jag, så widt möjligt varit, funnat med noggrannhet upptaga och anföra de sydnorsta fjärilarne har ihymnighet Hr. Doct. Siebke i Christiania bidragit genom de anteckningar, som han af intresse för saken ställt till min disposition. Det är mig en kär pligt att så'unda erkänna, det jag utan de bidrag, dessa Herrar lemnat, icke hade funnat gifwa en så fullständig lokalförteckning som nu är fallet, icke eller utan de upplysningar, som Prof. Bletterstedts och Bohemans samlingar gifvit wid handen, funnat reda mången intrasslad fråga uti art-nomenclien. — Christianstad och Trolle-Ljungby i November 1853.

S. D. J. Wallengren,

S. M. Adjunct.

Förteckning på arbeten som blifvit i Synonymien anförda :

- Bohem.** — **Boheman.** Öfversigt af Kongl. Vet. Acad. Förhandlingar 1847.
- Boisd.** — **Boisduval** : Icones Historique des Lépidoptères d'Europe nouveaux et peu connus. Paris 1832—1838.
- Borkh.** . . . **Borkhausen** (M. B.) : Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge. Frankfurt 1788, 1789.
- Dahlb.** — **Dahlbom** (A. G.) : Skandinaviska Insekters Skada och Nyttå. Lund 1837.
- Dalm.** — **Dalman** (F. W.) : Uppställning af Sveriges Fjärilar. Kongl. Vet. Acad. Handl. 1816. (Anfördt under ålkortningen : *Pap. Sv.*).
- Esp.** — **Eaper** : Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. Erlangen 1777.
- Fabr.** — **Fabricius** (J. C.) : Entomologia systematica emendata et aucta. Hafniæ 1793. (Anfördt under förkortningen : *E. S.*).
- God. et Dup.** — **Godart** och **Duponchel** : Histor Naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. Paris.
- H-S.** — **Herrich-Schäffer** (G. A. W.) : Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, als Text, Revision und Supplement zu Hübners Sammlung europæischer Schmetterlinge.
- Hüb.** — **Hübner** : Sammlung europæischer Schmetterlinge. Augsburg 1805.
- Lefeb.** — **Lefebur** (A.) : Annal. de la Soc. Entom. de France 1836.

- Lin.** — **Liné (C.)**: Fauna Suecia. Holmiæ 1761. Systema Naturæ. Ed. 12. Holmiæ 1767.
- Müll.** — **Müller**: Prodromus Zoologie Danicæ. Halmiæ 1776.
- Nickerl.** — Synopsis der Lepidopteren Fauna Böhmens. Prag 1850.
- Ochs.** — **Ochsenheimer**: Schmetterlinge von Europa. T. 1—4. Leipzig 1807—1816.
- Quens.** — **Quensel**: Beskrifning öfver Nya Svenska Fjärilar. Kongl. Wet. Acad. Handl. 1791.
- Ramb.** — **Rambur**: Fauna Andalousica.
- Ross.** — **Ress**: Appendix to the Narrative of a second voyage in Search of a North-West-Passage. 1835.
- Schrank** — Fauna boica. Ingolstadt 1801
- Scriba** — Journal für die Liebhaber der Entomologie. Frankfurt 1790.
- Thbg.** — **Thunberg**: Dissertationes Academicæ, Insecta Suecana sistentes. Upsaliæ 1784—1794.
- Treitsch.** — **Treitschke**: se Ochsenheimer.
- Wallengr.** — **Wallengren**: Öfversigt af Kongl. Wet. Acad. Förhandlingar 1853.
- W. V.** — Systematisches Verzeichniss der Schmetterlinge der Wiener Gegend. Wien 1776.
- Zett.** — **Zetterstedt (J. W.)**: Insecta Lapponica Lipsiæ. 1837—1840

Namnförkortningar vid lokaluppgifterne:

Bhm.	Bohem.	:	Bolleman.
Dahlb.	Dahlbom.
Dalm.	Dalman.
Fredr.	Friedrichs.	:	Fredricksson.
Liljeb.	Liljeborg.
Stenh.	Stenhammar.
Wahlb.	Wahlberg.
Zett.	Zetterstedt.

Inledning.

Fjärilarne (Lepidoptera) anses vanligen såsom sjerde ordningen af Insekternas stora och atrilla klass. De hafwa i allmänhet språa hinagtiga wingar, som äro betäckta med fjäll, ordnade uti tågtegel-formigt lagda rader och fastsittande wid wingen medelst en liten stift. Några få arteres honor sakna wingar, eller hafwa blott rudimenter deraf.

Hufvudet är försedt med tvenne, i flera leder delade spröt eller antenner (antennæ). Dessa bestå af ett stakt (scapus), som i spetsen är mer eller mindre tillspetsadt, då antennerne sägas vara klubbförmiga (clavatæ) eller knappförmiga (capitatæ). Sjelfwa tillspetsningen fallas klubba (clava). Men de kunna äfwen sakna en sådan och äro då trådförmiga (filiformes), perlbandelika (moniliformes), allt efter som lederna framträda mer eller mindre tydliga. Sällan äro de borstförmiga (setaceæ). Under alla dessa förhållanden fallas antennerne enkla (simplices); men hos åtskilliga arter hafwa de hvarjehanda bihang på större och benämnas då sammansatta (compositæ). Dessa bihang kunna dels hafwa form af tänderne i en kam och antennerne sägas då vara kamade (pectinataæ), dels af strålarne i en fjäder, då antennerne fallas fjädrade (plumataæ); detta sednare i synnerhet då strålarne äro särdeles långa på båda större om staktet, som då benämnas rachis. Stundom äro antennerne fransade (limbriatæ), då flera fina hår utgå från en sida af staktet; stundom ræppförmiga (seobinæformes), då de undertill äro ojemna såsom en fil *). Antennklubban kan hafwa mycket

*) Samma förhållande inträffar likväl ej alltid hos båda könen.

olika form, såsom *afslång* (elongata), *äggformig* (ovata), *omvänt äggformig* (obovata), *päronformig* (pyriformis); och vara *spetsen trubbig* (obtus), *rundad* (rotundato-obtus), *försedd med tagg* (mucronata), eller *försedd med krok* (hamata). Den kan också vara *sammanstryckt* (compressa), *neholkad* (excavata) o. s. w.

Munddelarne äro väl desamma hos *ijärilarne* som hos öfriga insekter; men här äro de flesta högst rudimentära. De mest utbildade äro *tungan* och *palperne*. **Tungan** (lingua) består af *tvenne sugrör*, som till hela längden äro *hopsliggande*, så att ett tredje bildas mellan dem båda. Det är egentligen *maxillerne*, som äro utbildade till *tunga*, hwilken merendels är *ganska lång*, men *slundom kort* och *rudimentär* och hos några *helt och hållet felflagen*. (Emedan den oftast ligger *sammansrullad* i *platt snigelform*, fallas den *spiraltunga* (lingua spiralis); *jällan* är den *framstående* (exserta) och oftast i *spetsen tvåfluswen* (bilida). **Palperne** äro hos *ijärilarne* egentligen *fyra*, *jällan sex*, men oftast äro blott *tvenne labialpalper* (palpi labiales) utvecklade och dessa fallas *företrädeswis palper*. Hos några *lägre stående* släkten finnas *äfwen maxillarpalper* (palpi maxillares) *ganska mycket utvecklade*, under det att några *deremot alldeles sakna palper*. — Oftast äro *palperne treledade* (triariculati), *jällan tvåledade* (biarticulati), *högst jällan flerledade*. Till deras form äro de dels *från sidorne sammanstryckta* (compressi), och dels *platttryckta* (depressi). Ofta äro de *framstående* (porrecti), *uppåtsluggande*, (adscendentes), *tillbakaböjda* (resexi), *hängande* (penduli), *räta* (recti), eller *kneböjda* (geniculati). *Sällmånhet* äro de *bredda*, men *i synnerhet* hos *motten* antaga de *juvärtare former*, så att de *blifwa trådformiga* o. s. w. *Sänsende* till *beklädnaden* äro de *fjälliga* (squamati), *hårfransade* (limbriati), *pensel-lik*a (penicillati), o. s. w.

Ögonen äro hos *ijärilarne* merendels *endast sammansatta*, *nätögon* eller *facettögon* (oculi compositi l. retarii), men hos några iä *släkten* finnas *äfwen punktögon* (stemmata). Hos *larverne* *deremot*, *saknas* alltid *nätögon*, och *då ögon* finnas, äro de *endast punkt-*

ögon. Hos några Mattsfjärilar eller Mal, täckas nätögonen flundom med ett lock (valvula l. operculum), hwilket skjutes fram från kanten af mellantroppen.

Mellantroppen, hos hwilken wälsjerligen de wanliga delarne kunna urskiljas, men, med undantag af **mellauringen** (mesothorax), mindre utvecklade, är ofwan i anseende till ryggen eller ryggskölden (dorsum) rundad (rotundatus), äggformig (ovatus), flotformig (globosus), sammantryckt (compressus), hög (altus) eller plattad (depressus). I anseende till hårligheten är den tätluden (lomentosus), luden (hirsutus), försedd med kam (cristatus), tandad (dentatus) o. s. w. Undre delen af mellantroppen fallas bröstet (pectus), och på ryggskölden urskiljer man **halskragen** (collare), som omgifwer eller är närmast hufvudet, och **skuldran** (humerus), som är närmast vingbasen. — Vid mellantroppen hafwa wingarne och fötterna sitt fäste.

Wingarne äro till antalet tvenne par: det främre, **framwingarne** (alæ anticæ, l. anteriores, l. primores), och det bakre, **bakwingarne** (alæ posticæ, l. posteriores, l. secundariæ). Till formen äro de **långsträckt** (elongatæ), **lancettformiga** (lanceolatæ), **rundade** (rotundatæ), o. s. w. Merendels äro de **odelade** (indivisæ); sällan **flikiga** (fissæ l. digitatæ). I jevnare fallet fallas **flikarne**: digiti. I anseende till utkantens beskaffenhet äro de **helbräddade** (integre), försedde med **stjertlik förlängning** (caudatæ), **vinklade** (angulatæ), **småtandade** (denticulatæ), och **tandade** (dentatæ), **finnaggade** (crenulatæ) då tänderne äro mycket små; **färgtandade** (erosæ), då tänderne äro stora och ojemna; **utsturna** (emarginatæ), då brädden är insjwängd; o. s. w. I anseende till sättet för deras läge då fjärilen hwilar, äro de **uppat hopplagne** (erectæ), **plattliggande** (patulæ, l. patentæ); **utsperrade** (divaricatæ), då båda wingparen ej ligga på samma sätt; **takformiga** (deslexæ), då båda wingparen ligga bakåt och nedåt, så att de skylla hela abdomen; **öfwer hwarandra liggande** (incumbentes), då de ligga bakåt och platt ofwan på hwarandra; **isfinnerhet bakwingarne** kunna vara **veckade** (plicatæ), **sammanrullade** (convolutæ), eller

jemuplatta (plane), då de ej lägga sig samman i veck, eller rullas tillhopa omkring abdomen. Hos de flesta nattfjärilar hållas framvingarne tillsammans med bakvingarne genom en egen apparat (costinaculum) bestående af en hornögla på de förras undre fida nära basen, och en hållhake i de bafres framkant. Hållhaken utgår från första wingnerven och skjuter in uti framwingarnes hornögla, hwilket gör att bakvingarne måste utspännas på samma gång som de främre och deltaga i dessas rörelse.

Hvarje winge har trenne fakter: **framfanten** (margo anterior l. margo), hwilken på framvingarne af en ordentligen utspänd fjäril går rakt ut från hufvudet och på bakvingarne finnes, der dessa råka framvingarne; **infanten** (margo interior), hwilken på framvingen af den utspända fjärilen följer bakwingens framkant, och på bakvingen följer abdomen; **utfanten** (margo exterior l. posterior l. limbus), hwilken på hwardera wingen sammanbinder framfanten och infanten, samt är försedd med fransar (limbrae l. cilie). Desutom ha äro wingarne tvenne hörn: **framhörnet** (angulus anterior), hwilket på framvingarne vanligen fallas **wingspetsen** (apex), och **bakhörnet** (angulus posterior), hwilket på bakvingarne merendels benämnas: **analthörnet** (angulus analis). Det förra finnes der framkant och utfant, det sednare der utfant och infant möta hwarandra. Den del af wingen, som är närmast mellankroppen, kallas **wingbas** (basis alae) och midten af wingen får namn af **disc** (discus). Wid basen af bakvingarne och i dessas framkant finnes en liten flak, som benämnas **rotlob** (lobus basalis). Andra fanten af samma wingar bildar ofta också en flak, hwilken kallas **abdominalflak** (lobus abdominalis). Då denna skjuter ned omkring abdomen sägas wingarne wara rännformiga (canaliculatae).

Wingmembranen hålles utspänd genom ihåliga hornrör, som kallas **nervor** (costae) och äro ganska användbara wid bestämmandet af genera och större grupper. Detas högsta normala antal är, då man betraktar dem wid deras utgång från wingbasen, egentligen sex. Dessa äro: **framfantenerven** (costa costalis l. marginis anterioris), hwilken löper uti själwa framfanten; **subcostalnerven** (costa

ulicostalis), som utgår från basen närmast föregående och oftast utlöper i framfanten; främre mediannerven (costa mediana anterior) och bakre mediannerven (costa mediana posterior), hvilka båda vid basen äro hvarandra temligen närstående, men under loppet åtskiljas betydligt och sända flera eller färre grenar (rami l. ramuli) till vingfanterne; subdorsalnerven (costa subdorsalis), hvilken oftast utlöper i vingens bakre hörn, men stundom uti dennes infant, och ändtligen dorsalnerven (costa dorsalis), som alltid utlöper i infanten. Sällan äro alla dessa nerver på en gång tillstädes, och i synnerhet hos de såfallade microlepidoptera saknas flera af dem. — Båda mediannerverne innesluta på tvenne ställen ett fält, hvilket på större eller mindre afstånd från basen är på tvären slutet (clausa) genom en tverrerv (costa transversa l. transversalis) och kallas distfältet (cellula l. areola discoidalis). Ofta saknas likväl denna tverrerv och distfältet säges då vara öppet (aperta). Stundom är tverrnerven mycket fin, eller ett blott veck, i hvilket sednare fall den kallas spår (spuria); stundom också mer eller mindre afbruten (abrupta), då distfältet säges vara antingen halföppet (semiaperta) eller halfslutet (semiclausum). Distfältet är stundom deladt åt hela sin längd medelst en fin nerv, hjälpererv (costa auxiliaris), eller också genom ett veck, hjälperveck (plica auxiliari-). Hos några fjärilar finnas flera genom tverrerver inneslutna vingfält, hvilka kallas öfverloppsfält (cellulae accessorie), och de tverrerver, som innesluta sådana kallas öfverloppsnerver (costae accessorie). Distfältet saknas hos några microlepidoptera. — Emellan de flesta wingnerverne finnas wingveck (plicae), som stundom på en oblottad winge likna nerver, men sedan wingfältet blifvit bortrensade visa sig endast såsom sömmar i membranen, der fjällen haft en annan ställning.

Hos Dagfjärilarne saknas på både framvingar och bakvingar alltid framfantenerven, och på framvingarne oftast äfven dorsalnerven, så att på dessa endast subcostalnerven, de båda mediannerverne och subdorsalnerven finnas. Endast hos *Equites* och *Parnassii* förekommer en kort dorsalnerv, men hos dessa grupper saknas deremot samma nerv på bakvingarne, ehuru den förekommer hos alla öfriga.

Mediannerverne dela sig uti flera grenar på olika sätt hos olika släkten. Hos dagfjärilarne förefomma normalt inga öfverleppsåft. Likväl finnes ett litet sådant wid basen af framvingarne emellan subdorsalnerven och bakre mediannerven hos *Equites*. Skymningsfjärilarne, en stor del af Spinnarne, första delen af Mattflyn och en del Mätare hafva på framvingarne framkantnerven ganska tydlig, men på bakvingarne förefommer den endast hos några så. Framvingarne sakna dorsalnerv hos de flesta af dessa, men hafva merendels ett, stundom twenne öfverleppsåft wid diffältets slut och främre hörn hos Spinnare, Mattflyn och Mätare. På bakvingarne hos en del arter af flånnande familjer saknas jemte framkantnerven äfwen subcostalnerven, och ersättes genom en gren af främre mediannerven. Sådant är isynnerhet förhållandet hos första delen Mätare. Motten wila: första likhet i wingnervernes lopp och tillstådeswaro med Mätarne; men hos de egentliga microlepidoptera är förhållande af varierande beskaffenhet. Här finnas på framvingarne endast subcostalnerven, båda mediannerverne och subdorsalnerven; stundom saknas äfwen en eller flera af dessa. På bakvingarne förefommer stundom endast ena mediannerven.

I efterföljande afhandling benämnas wingnerverne efter den metod som De Linné föreslagit. Man räknar dem på framvingarne från infanten och på bakvingarne från framkanten, och benämner dem efter deras ordningsnummer, så att på de förre bli hos dagfjärilarne dorsalnerven eller, då denna icke finnes, subdorsalnerven, och på de sednare subcostalnerven den första. Främre mediannerven kallas öfre nervstammen (*truncus communis superior*) och bakre mediannerven benämnas nedre nervstammen (*truncus communis inferior*). För underlättandet wid grupperis och generas indelning får likväl dessa båda nervstammars grenar blott ordningsnummer såsom nerver, då de skilja sig från diffältet, men så snart de skilja sig från någondera stammen sedan denne lemnat diffältet benämnas de grenar.

Wid bröstdelen af mellanfroppen hafva fötterne deras fäste. De äro till antalet sex, men de twenne första äro hos en del dagfjärilar förtare, än de öfriga och stundom rudimentära, så att de äro

obrukbara wid gåendet. Deras delar äro de samme som hos andra insekter.

Abdomen består af flere leder och är stundom på ryggen försedd med en eller flera hårkammar, då den såges wara betoffad (eristatum). Motsatzen härtill är slät (hæve). — Könsskilnaden visar sig till det yttre deri, att hannens analöppning merendels är omgifwen af en mer eller mindre tjwig hårborste (analborste), hwilken honan deremot saknar. Hennes abdomen är robustare än hannens och mot anus mera tillspetsad. Hos några få arter finnes en fort yttre äggläggningsskida.

Fjärilarnes metamorphos är fullständig, så att larv och pupa äro sinsemellan till formen helt olika, äfwenom olika med den fullbildade insekten (imago).

Äggen äro till form och yttre beskaffenhet ganska olika hos skilda genera och arter. Än äro de runda, elliptiska, skålsformiga, cylindriske, fegelska, halfrunda eller pettiolerade; än äro de refflade, strierade, chagrinerade, punkterade, taggiga, håransade eller släta. Utaf modren läggas de alltid på den planta, som skall tjena den upfläcda larven till näring; men der kunna de än läggas spridda, än i högar, klor eller ringar. Ofta omgivas de af flem, som skall skydda dem för wäderlekens inwerkkan, hwilket isynnerhet är förhållandet hos de arter, hvars ägg skola utfläcdas först påföljande vår.

Larven (larva) är hos olika släkten af olika form: ofta cylindrisk (cylindrica), men äfwen asellformig (aselliformis), då den lifnar till formen en wanlig gråsugga; snigelformig (limaciformis), spindelwriden (vermicillata), oval (ovalis), affsmalnande (attenuata) och tillspetsad (acuminata). Till yttan är den naken (nuda), hårig (pilosa), luden (hirsuta), borstig (laseiculato-pilosa) silkesluden (sericea), obewäpnad (inermis), taggig (spinosa), behornad (cornuta), tentakulerad (tentaculata), wärtig (verrucosa) eller finknölig (tuberculata). Larverne lewa antingen ensamme (solitariae), eller i sällskap (grogariae); antingen utan betäckning (diales l. subdiales) eller med betäckning, i hwilket sednare fall de kunna wara delö invecklade (involutae), då de omgiva

flå med sammanspunna blad, dels säckbärande (saccophoræ), då de spinna omkring sig en bult, hvilka de föra med sig. De kunna äfven lefwa dolda (latentes) antingen uti jorden, i trädens wed- och fruktstämme, eller i växternes blad och stjekar. Då larven lefwer dolt uti växterne, der den bildar gångar i bladen eller weden, kallas den också minnerande (cuniculatrix) och dess gångar benämnas *minor* (cuniculi).

Pupans (pupa l. ekrysalis) delar äro hufvudregionen (caput l. regio capitis), mellankroppsregionen (thorax l. regio thoracis), **abdominalregionen** (abdomen l. regio abdominalis) och **wingsflätorne** (tegulae l. valvulae alarum). I analspetsen är pupan försedd med 1—4 taggar. Till bän är hon slät, punkterad, håtig, näsen, fäntig, taggig eller knölig; i främre delen trubbig (obtus), spetsig eller taggig. Den är antingen insvept i en silkesbult (folliculata), eller i ett eller flere sammanspunna blad invecklad (involuta), eller of fri (libera); på olika sätt upphängd (suspensa) wid ett blad, en stjell eller ett annat föremål, eller of hvilande fri i jorden, i moss, under stenar o. s. w.

Liksom i öfriga Zoologiens delar hafwa wi äfven här den första egentliga systematiska indelningen af *Pinné*. Han söndrade fjärilarnes ordning uti trenne stora och artrika släkten: **Dagfjärilar** (Papilio), **Skymningsfjärilar** (Sphinx) och **Nattfjärilar** (Phalæna). Sistnämnde släkte delade han åter uti 7 mindre: **Spinuare** (Bombyx), **Nattflyn** (Noctua), **Mätare** (Geometra), **Mott** (Pyrælis), **Vecklare** (Tortrix), **Mal** (Tinea), och **Fjädermott** (Alucita). Efter *Pinné* bearbetades fjärilarne hufvudsakligen af *Göpper*, *Bergsträsser*, *Gramer*, *Fabricius*, *Serbst*, *Sablowsky*, *Giliger*, *Vatreille*, *Schiefsermüller*, *Hübner*, *Schsenheimer* och *Treitschke*, *Saworth*, *Godart* och *Duponchel*, *Boisduval*, *Stephens*, *Stainton*, *Herrich-Schäffer*, och rednast har *Zeller* systematiskt sig med micro-

lepidoptera och fortsat att lemna utmärkta monographier öfver släkten och grupper bland dessa. De svenska fjärilarne hafva wäl icke eier *Pinnés* tid blifwit fullständigt beskrifne, men *De Geer*, *Thunberg*, *Paykull*, *Dalman*, *Betterstedt* och *Boheman* hafwa lemnat rika bidrag till deras kännedom.

Indelningen uti Dagfjärilar (*Lepidoptera diurna*), Skymningsfjärilar (*Lepidoptera crepuscularia*) och Nattfjärilar (*Lepidoptera nocturna*), hwilken med stöd af *Pinnés* tienne hufvudsläkten införts i systemet, kan wäl icke bibehållas, emedan ättfylliga arter, som räknas till de båda sednare afdelningarne, fluga och äro i rörelse om dagen lika mycket som någon af de egentliga dagfjärilarne, men de svenska benämningarne så, i brist af bättre, begagnas, ehuru man numera temligen enhälligt antagit den indelning, som *Soisduval* föreslagit, wagtadt äfwen hans afdelningar icke med nog bestämda och säkra kännetecken ännu kunna karakteriseras. Dessa afdelningar äro:

I. *Rhopalocera*: Antennerne försedde med mer eller mindre tydlig flubba; deras medlersta leder mycket längre än breda. Antingen båda wingparen eller blott det främre under hwilan merendels uppåt hopflagne. Ingen hornögla på framwingarnes undre sida, eller hållhake i bakwingarnes framkant. Framkantserven på både framwingar och bakwingar saknas; oftast äfwen dorsalnerven på de förre, sällan på de sednare. Aldrig öfverloppsålt wid diståltets på framwingarne slut.

II. *Heterocera*: Antennerne af olika form, likwäl aldrig flubbsformiga, men wäl stundom på midten tilltjocknade; deras medlersta leder ej längre än breda. Wingarne under hwilan högst sällan uppåthopflagne, utan antingen tåtförmiga, plattliggande, utsperrade, öfver hwarandra liggande, sammanrullade eller weckade. Merendels hornögla på framwingarnes undre sida och hållhake i bakwin-

garnes framkant. Ofta förefinnes framkantsnerven på framvingarne, mera sällan äfwen på bakvingarne. På dessa saknas äfwen stundom subcostalnerven, stundom förefinnes blott en eller tvenne nerver. Ofta ett eller tvenne öfverlopps-fält wid distfältets på framvingarne slut.

Till förra afdelningen höra alla de så kallade dagfjärilarne eller *Pinnés* slägte *Papilio* och till den sednare alla de öfriga *Linnés* ansta släktena.

Man har äfwen welat till dessa båda lägga en tredje afdelning, under namn af *Microlepidoptera*, sammansattande derunder *Pinnés* släkten: *Tortrix*, *Tinea* och *Allucita*, men denna benämning kan endast hafwa praktisk nytta såsom fortare än uppräknandet af släktena, och kan icke användas i systemet, emedan den endast afser den mindre storleken.

Lepidoptera Scandinaviæ.

Rhopalocera.

Scandinavien's Dagfjärilar.

Dagfjärilarne utgöra första hufvudafdelningen af Fjärilarnes Ordning och kallas med ett gemensamt namn **Rhopalocera**, till följe af de enkla, mer eller mindre klubbformiga antennerne. Namnet är sammansatt af de Grekiska orden: rhopalon, klubba, och kera, horn. De äro i rörelse om dagen och hvila under natten, men de flesta arternas larver hålla sig dolda om dagen och framkomma först i afstämningen att söka sin föda.

Larvernes födoämnen äro hufvudsakligen växternes blad och stänglar, hvarpå isynnerhet wisja allmänna arter göra ganska stor skada. Inga Scandinaviska arter hämta sin näring af växternes rötter. Ut **Satyroiderne** hafwa gräsen blifwit anvisade och denna familj ensamt omfattar nära en tredjedel af alla kända dagfjärilar. De öfriga familjerna deremot söka dicotyledonerna, ehuru, jemförelsevis med Spinnarne och isynnerhet med wisja familjer bland microlepidoptora, temligen så angripa träden. Blåvingarne tyckas till största delen wara inskränkt till Leguminoferne och Perlemorfjärilarne till ett enda wertslägte: **Viola**. Andra åter lefwä på flera wextarter och wertsläkten, ehuru en wis art likwäl synes wara den egentliga moderplantan. Fjärilarne sjelfwa deremot hafwa icke såsom deras larver så inskränkt gränser för födoämnenas hämtande. Hela Floras rike står dem till buds. Därför begagna de sig af denna frihet. Från blomma till blomma färdas de hela dagen igenom utan att tröttna, och tömma honungsgömmena medelst den långa spiralkungan. Men

de förkasta icke eller andra vätskor, såsom den saft, som utflöjrar ur träden på ställen, der barken blifwit stadad, eller dagg- och regndroppen, som stadnat på bladet. Man får också flundern se Hagtornshjärilen m. fl. infinna sig wid wattenpuosarne, iätta sig wid kanten deraf och begärligt uppsörpla af wattenet.

Enligt följande schema indelas Afdelningen i twenne Familjer:

- I. Fam. **Papiliones**. Margo anticus alarum anticarum ocostatus costis 2—4 extenditur. Ex apice cellulæ discoidalis alarum posticarum aut costa nulla, aut distincta et normalis egreditur.

Framkanten af framvingarne, som sjelf saknar nerv, hålles utspänd genom 2—4 nerver. Ursprunget af bakvingarnes distålt utgår antingen ingen, eller ock en tyblig, de öfrige lif nerv.

- II. Fam. **Hesperioidea**. Margo anticus alarum anticarum ocostatus costis 5 extenditur. Ex apice cellulæ discoidalis alarum posticarum costa nulla, sed plica subtilissima loco costæ egreditur.

Framkanten af framvingarne, som sjelf saknar nerv, hålles utspänd genom 5 nerver. Ursprunget af bakvingarnes distålt utgår ingen egentlig nerv, utan i dess ställe ett fint wingwed.

I. Fam. Papiliones.

Margo anticus alarum anticarum ocostatus costis 2—4 extenditur. Costa harum unica plerumque plus minus ramosa, rarius omnes simplices. Ex apice cellulæ discoidalis alarum posticarum costa aut nulla, aut distincta et normalis egreditur.

Caput mediocriter l. minutum (thoraco quidem latitudine semper, attamen vario modo, minus). Antennæ basi approximatae. Stemmata nulla.

Corpus, respectu habito expansionis alarum, gracile. Thorax abdomine haud latior, altus et convexus.

Alæ omnes inaequaliter quiescentis erectæ, amplæ. Margo interior alarum posticarum aut deflexus, ut canalis pro receptione abdominis formetur, aut excisus, ut abdomen sit liberum, nullo modo tamen per totam longitudinem plicatus. Cellula accessoria nulla.

Larva subdialis, 16-poda, cylindrica, elongata, aselliformis l. subovata, vario modo armata aut hirta.

Pupa angulata, rarius lævis, aut ano tantum, aut filo transverso quoque alligata, rarissime subfolliculata.

Framfanten af framvingarne, som sjelf safnar nerv, hålles utspänd genom 2—4 nerver. En af dessa är merendels mer eller mindre grenig, sällan äro alla enkla. Ur spetsen af bakvingarnes distält utgår antingen ingen, eller ock en tydlig, de öfriga lik nerv. Intet öfverloppsält.

Snufvudet medelmåttigt eller litet (alltid, men på olika sätt, i anseende till bredden mindre än thorax). Antennerne wid basen hvarandra närstående. Inga punktögon.

Kroppen med hänseende till vingutsträckningen smal. Thorax föga bredare än abdomen, hög och konvex.

Wingarne under hwilken uppåt hopplagne, vida. Bakvingarnes insatt antingen nedböjd, så att derigenom bildas en ränna, som upptager abdomen, eller ock utsturen, så att abdomen hänger fri; men aldrig på längden wedad.

Varven merendels lefwande utan betäckning, 16-fotad, cylindrisk, långsträckt, asellformig eller äggformig, på olika sätt wäpnad eller hårig.

Pupan fäntig, sällan slät, antingen blott fästad wid analtaggen, eller ock derjemte medelt en om kroppens midt slagen tråd, högst sällan liggande i en förlängd hylsa.

Till denna familj hörande arter hafwa till följe af de, jemförelsevis med kroppen, stora wingarne en hopprande flygt, hwilken är mer eller mindre ihållande. En del äro lifwål ganska snabbflygande.

Största delen äro i rörelse från morgonen ända till aftonen, men en del blott i middagstunden. Några äro äfwen så känsliga för solvärman och beroende af denna, att de söka flydd så snart moln bortskjuter solen. Detta är isynnerhet förhållandet med några af de högnordiska arterne. Bergiga, högländta och jumpiga trakter hafwa hwardera sina arter. Äfwen inom inöregionen finnas några representanter af familjen, hvilken man indelat i sektioner och grupper, som på följande sätt låta karakterisera sig:

I. Sect. Tetrapodes. DALM.

Pedes tantum quatuor postici grossorii; antici duo spurii, breves, debiles.

Blott de fyra bakre fötterna äro gångfötter; de båda främste falska, korta, rudimentära.

Cellula discoidalis alarum posticarum costa transversa ceteris æquali clausa. Margo anticus alarum anticarum costis 3 et ramulis duobus quartæ extenditur.

Bakvingarnes distålt slutet genom en tvärvärd, som lifnar vingnerberne. Framfanten af framvingarne hålles utspänd genom 3:ne nerver och 2:ne grenar af en sjerde.

Cellula discoidalis alarum posticarum plano aperta l. costa transversa spuria subclausa. Margo anticus alarum anticarum aut costis 2 et ramulis duobus tertiae, aut costis 3 et ramulo unico quartæ extenditur.

Bakvingarnes distålt alldeles öppet, eller blott tillslutet af en falsk

I. Trib. Satyroidæ.

II. Trib. Nymphalides.

twernerb. Framfanten af framwingarne hålles utspänd antingen genom 2:ne nerver och 2:ne grenar af en tredje, eller och genom 3:ne nerver och en gren af en fjärde.

II. Sect. Hexapodes. DALM.

Pedes 6 omnes gressorii, invicem conformes.

Alla 6 fötterna äro gångfötter, sfinnemellan lifformiga.

1. Cellula discoidalis alarum posticarum costa transversa, reliquis æquali clausa.

Bakvingarnes diffält slutet genom en twernerb, som lifnar wingnerberne.

Margo anticus alarum anticarum costis 3 et ramulis aut duobus, aut unico quartæ, rarissimo costa unica et ramulis quatuor secundæ extenditur.

Framfanten af framwingarne hålles utspänd genom trenne nerver och genom 2:ne, eller blott en enda gren af en fjärde, högst sällan genom en nerv och 4 grenar af en andra.

III. Trib. **Heliconides.**

Margo articus alarum anticarum costis 3 simplicibus extenditur.

IV. Trib. **Parnassii.**

Framfanten af framwingarne hålles utspänd genom 3:ne enkla nerver.

Margo anticus alarum anticarum costis 4 simplicibus extenditur.

V. Trib. **Equites.**

Framvingarnes framfamt hålles utspänd genom 4 enkla nerver.

2. { Cellula discoidalis alarum posticarum aperta, plica transversa subtilissima tantum subclausa.
 { Baswingarneð difsfält öppet, blott tillflutet af ett fint tværfled.

Margo anticus alarum antica-
 rum costis 4 aut simplicibus, aut
 una biramosa extenditur.

Framfanten af framwingarne hål- VI. Trib **Lycanoidæ.**
 leð utspänd genom 4 nerver, antin-
 gen alla enkla, eller den ena två-
 grenig.

III. Sect. Heteropodes.

Pedes 6 omnes feminae, 4 tantum postici maris gressorii :
 antici duo maris breves, debiles.

Alla 6 fötterna hos honan, men blott de 4 bakre hos hannen
 äro gångfötter; de båda främre hos hannen korta och rudimentära.

Cellula discoidalis alarum posti-
 carum costa transversa in medio
 abrupta semiclausula. Margo anti-
 cus alarum anticarum costis 3 et
 ramulis 2 quartæ extenditur.

Baswingarneð difsfält halfflutet ge- VII. Trib. **Erycinides.**
 nom en i midten afbruten tværnerv.
 Framfanten af framwingarne hålles
 utspänd genom 3:ne nerver och 2:ne
 grenar af en flerde.

I. Trib. Satyroidæ.

Pedes tantum quatuor postici gressorii, antici duo spurii, bre-
 ves, debiles, sæpius pilosi.

Cellula discoidalis alarum posticarum costa transversa coteris aequali clausa; anticarum costa transversa aut continua, aut plus minus abrupta, clausa.

Margo anticus alarum anticarum costis 3 et ramulis 2 quartæ, nempo costis alæ 8, 9 et 10, et ramulis anticis costæ septimæ, extenditur.

Costæ alarum posticarum semper 9; 1:a e trunco communi cum 2—4 egrediens et ramulum breviorum aut distinctum, aut tantum tumiditate vario modo indictum, in lobum basalem emittens; 8—9 o basi egredientes; anticarum 10 (septima triramosa), ad basin una et altera inflata; 4:ma e basi egrediens.

Alæ posticæ pro receptione abdominis canaliculatæ.

Larva cylindrica, inermis, nuda aut soricea, ano bimucronato.

Pupa submulica, apico anali suspensa.

Fötterne: blott de spåra bakre äro gångfötter; främsta paret korta, rudimentära, oftast lubna.

Diffäktet på bakvingarne slutet genom en tvärvägg, som är lifvingnerverne; på framvingarne slutet antingen genom en fullständig, eller genom en mer eller mindre afbruten tvärvägg.

Framkanten af framvingarne hålles utspänd genom 3:ne nerver och 2:ne grenar af en sjerde, nemligen genom 8:de, 9:de och 10:de vingnerverne och de båda främre grenarne af den 7:de.

Nerverne på bakvingarne allti: 9: 1:sta utgående från gemensamt stam med 2:dra—4:de och utgående åt vingens rotlob en kort, antingen tydlig, eller genom en uppsvällning på olika sätt ankydd gren; 8:de—9:de utgående från basen. De främre nerver 10 (den 7:de tregrenig), den ena och andra vid basen uppsvällt; den 1:sta utgående från basen.

Bakvingarne bildande en ränna för abdomens upptagande.

Varven cylindrisk, obväpnad, antingen naken eller silkesluden, med tvåspetsad anus.

Pupan föga fantig, fasthängande med analtaggen.

Denna grupp utgöres till större delen af arter med tung och

föga snabb, eluru hos några temligen ihållande flägt. De äro alla föga mångfärgade och lefwa såsom larver uteslutande af gräsarter. Den skada de förorsaka är dock i det hela obetydlig. Larverne lefwa om dagen dolba i gräset och utgå först om aftenen att söka föda.

Flera af hithörande arter gå hanska högt mot norden och uppåt bergens sidor, så att äfwen de finnas, som tillhöra den lägre snöregionen. Mot æquatorn deremot tyckes artantalet aftaga i jemförelse med andra grupper, och synes denna således företrädeswis tillhöra den tempererade och den arktiska zonen.

De till vår Fauna hörande slågten kunna utmärkas med följande korta karaktärer:

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | Truncus inferior, ut etiam costa prima | } 1. <i>Coenonympha</i> . |
| 1. | et costa decima alarum anticarum, ad basin inflatus. | |
| | Framvingarnes nedre nervslam, 1:sta och 10:de nerv wid basen uppblåst. | |

- | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| II. | Truncus inferior, ut etiam costa decima alarum anticarum, ad basin anflatus. |
| | Framvingarnes nedre nervslam och 10:de nerv wid basen uppblåste. |

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4. | Costa transversa cellulæ discoidalis alarum anticarum ramulum brevem, rectum in cellulam ipsam omittens. | } II. <i>Pararga</i> . |
| | Twernerven wid framvingarnes dist-fält utfänder i sjelfva distfältet en rät och fort gren. | |

- | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Costa transversa cellulæ discoidalis alarum anticarum simplex. (non ramosa). |
| | Twernerven wid framvingarnes dist-fält enkel (utan gren.) |

Costa transversa alarum anticarum inter costam 5 et 6 oblique subarcuata (Ramulus costæ primæ alarum posticarum tumiditate subquadrangulari obtusa indictus. Intervallum inter costam alarum anticarum 8 et 9 triplo majus quam inter costam 7 et 8).

a.

III. Aphantopus.

Bakvingarnes tvärvärv något snedt bögböjd. (Första nervens på bakvingarne gren antydd genom en nästan fyrkantig, trubbig uppsvälning. Mellanrummet emellan 8:de och 9:de nerven på framvingarne tre gånger större, än emellan 7:de och 8:de nerven.)

b.

Costa transversa alarum posticarum inter costam 5 et 6 exacte arcuata.

Bakvingarnes tvärvärv fullkomligt bögböjd emellan 5:te och 6:te vingnerven.

Ramulus costæ primæ alarum posticarum tumiditate rotundata indictus. Intervallum inter costam alarum anticarum 8 et 9 vix duplo majus, quam inter costam 7 et 8.

Första nervens på bakvingarnes gren antydd genom en rundad uppsvälning. Mellanrummet emellan 8:de och 9:de nerven på framvingarne knapt dubbelt större, än emellan 7:de och 8:de nerven.

IV. Epinephe

Ramulus costæ primæ alarum posticarum tumiditate arcuata, acuminata indictus. Intervallum inter

costam alarum anticaram 8 et 9
æque magnum ac inter costam 7
et 8.

Första nervens på bakvingarne gren
antydd genom en tillspetsad och böjd
uppsvällning. Mellanrummet emellan
8:de och 9:de nerverne på framwin-
garne lifa stort som emellan 7:de och
8:de.

V. *Satyrus*.

Costa tantum decima alarum anticarum
ad basin inflata.
Blott framvingarnes 10:de nerv wid ba-
sen uppblåst.

Costa transversa cellulæ discoidalis
alarum anticarum inter costam 4 et 5
arcuata, ad 5 normalis.

VI. *Chionobas*.

Laternerven wid framvingarnes diffält
emellan 4:de och 5:te nerven båg böjd, wid
den 5:te normal.

Costa transversa cellulæ discoidalis
alarum anticarum inter costam 4 et 5
recta, ad 5 evanescens.

VII. *Erebia*.

Laternerven wid framvingarnes diffält
emellan 4:de och 5:te nerven rät, wid den
5:te försvinnande.

Släktet: *Coenonympha*. HÜBN. H—S.

(*Hipparchia* FABR. OCHS. *Erebia* DALM. *Satyrus* LATR. BOISD. ZETT.)

Antennæ longiores, extrorsum in Clavam oblongam, subincrassatam sensim transeunt.

Palpi capite nonihil longiores, subadscendentes, apicibus nutantibus, compressi, triarticulati: articulus medius reliquos

conjunctos longitudine vix l. nonihil superans, aut conformis, aut in medio dilatatus; ultimus basali æqualis, l. eo multo longior, gracillimus. Articulus medius et basalis infra pilis longissimis divaricatis dense instructi, et in lateribus squamis obtecti; ultimus tamen nudus (non squamosus), pilis rarioribus, plerumque adpressis, instructus, in pilositate reliquorum plus minus latens.

Oculi nudi.

Pedes antici graciles, maris brevissimi et densius, feminæ longiores et parcius pilis ciliati, tarsis inarticulatis. Femora ceterorum infra hirta; tibiæ dentibus brevissimis instructæ, ad insertionem tarsorum calcaribus duobus validis munitæ; articulus tarsorum primus longissimus (longitudinem secundi tertiique plus minus superans), secundus tertio, hic tamen quarto longior, quintus tertio quartoque longitudine fere æqualis.

Alæ rotundatæ, integræ; margo interior posticarum ad angulum ani subexcisus. Cellula discoidalis clausa.

Costæ alarum posticarum 9: 1—4 e trunco communi superiori, 5—7 e trunco communi inferiori, 8—9 e basi egredientes. 1:ma ramulum nullum, interdum tumiditate tamen hamiformi, obliqua, gracili inditum, in lobum basalem emittens. Costæ alarum anticarum 10: 1:ma e basi, 2—4 e trunco communi inferiori, 5—6 e costa transversa cellulæ, 7—9 e trunco communi superiori (7 triramosa ex eodem fere loco cum 8 oriens), 10:ma e basi egredientes. Basis costæ primæ, decimæ et trunci communis inferioris valde inflata. Costa transversa cellulæ discoidalis ramulum rectum brevem in cellulam ipsam plerumque emittens*); costa ipsa fortiter arcuata, fere angulata.

*) Costa illa valde variat. In *C. davo* interdum simplex, sed interdum etiam ramulos duos gerens. Sic etiam *C. arcania*, in qua specie præterea ramulum inter costam 4 et 5, e cellula egredientem, observari.

Antennerne temligen långa, utåt småningom öfvergående i en aflång, något tjock klubba.

Palperne något längre än hufvudet, uppåstigande, med lutande spetsar, sammantryckta och treledade; medlersta leden föga öfverstigande i längd de öfriga tillsammans, antingen likformig, eller på midten bredare: den sista lika med eller öfver mycket längre än basleden, ganska smal. Den medlersta och basleden undertill tätt bevädda med långa, utspärrade hår, på färborna täckta med fjäll; den sista deremot naken (utan fjäll) merendels försedd med gleja, tilltryckta hår, mer eller mindre böska i de öfrigas hårlighet.

Ogonen nakna.

Fötterna: främsta paret smala, hos hannen mycket forta med tätare hårfransar, hos honan deremot längre och gleföre hårfransade, tarserne oledade. De öfriga låra undertill ludna; tibiaerna försedda med ganska forta tänder och vid tarsleden väpnade med tvänne starka sporrar; tarsernes första led längst (mer eller mindre i längd öfverstigande den 2:dra och 3:dje); den 2:dra längre än den 3:dje och denna åter längre än den 4:de, den 5:te till längden nästan lika med den 3:dje och 4:de tillsammans.

Wingarne rundade, helbräddade; de bakre indre kant nära analhörnet något utfuren. Diffjäلتet slutet.

Nerverne på bakwingarne 9: 1—4 utgående från öfre nervstammen, 5—7 från den nedre, 8—9 från wingbasen. Den första utgår till vingens rotlob ingen gren, men stundom finnes dock en ankyndning dertill medels en hakformig, smal och smal uppsvälldning. Framwingarnes nerver 10: 1:sta utgående från basen, 2—4 från nedre nervstammen, 5—6 från diffjäلتets tvärvägg, 7—9 från öfre nervstammen (den 7:de tregrenig, uppsvällande nästan från samma ställe som den 8:de), 10:de från basen. Första och tionde wingnervens, samt nedre nervstammens rot mycket uppsvälld. Diffjäلتets tvärvägg utgår merendels en rät och kort gren i själwa fältet; nerven starkt böjd, nästan vinklad.

Öfihörande arter träffas till första delen allmänna på torra fogs- och betesmarker, på ängar och i fårr. Med undantag måhända af blott en art, synas de förekomma endast i en generation om året. Egentligen tillhörande Sveriges och Norriges sydliga och mellersta landskaper, äro de sällsynta inom de nordliga delarne. Larverne äro flåta och glänsande, utan hår.

1. Kamgräs-Fjärilen (*Coenonympha pamphilus*. Lln.)

Alis integris, flavo-ochraceis, anticis utrinque ocello unico; posticis supra immaculatis, subtus cinereis, fascia interrupta albida ocellisquo 3—4 valde absoletis. L. al. exp. 33—35 millim.

Wingarne helbräddade, ofragula; de främre med en ocell på båda sidor; de bakre ofwan ofläckade, undertill med ett afbrutet hvitagtigt band och 2—4 mycket otydliga oceller. L. e. wingspots $1\frac{5}{16}$ — $1\frac{7}{16}$ t.

Syn. *Papilio pamphilus* Lln. F. Sv. p. 273 n. 1044. Fabr. E. S. III. 1. 224. 694. Müller Zool. Dan. p. 445. n. 4329. *Hipparchia* Ochs. Schm. I. 4. p. 305. IV. p. 23. n. 67. *Erebia* Dalm. Pap. Sv. p. 83. n. 45. *Satyrus* Zett. Ins. Lapp. p. 905. n. 47. Godart et Duponch. Lepid. I. p. 476 pl. 8 secund. f. 3. *Coenonympha* H—S. Text I. p. 84. *Papilio nephele* Hübn. Pap. tab. 54 f. 237 238. 239.

Fjärilen förekommer i tvenne generationer om året, den första i Maj och Juni, den andra i Augusti och September månader, samt är tesmarker och högländta ängar under denna tid allmän i de södra och medlersta landskaperna, men sällsynt inom de nordliga. Han förekommer både i fogstrakter och på flättlandet. Vid 60° nordlig latitud tyckes han upphöra att vara allmän. Det nordligaste ställe, der han ofweterligen blifwit anmärkt, är Alstahaug på ön Alsten i Norrige, dock torde han förekomma ännu nordligare.

Artbeskr. Antennerne bruna med ljusare klubba och hvita ringar. Palperne hvitgrå, undertill med långa grå och svarta hår. Ansigte och mellankropp starkt gråfudne. Abdomen ofwan grå, undertill hvitagtig. Fötterna hvitgrå.

Hanne. Vingarne rundade, helbräddade med gråagtiga franfar; ofswan ochragula. Framvingarnes främre kanter och alla wingarnes utkanter brunagtiga. Framvingarne nära wingspetsen försedde med en svart, ocellformig, större punkt. Framvingarne undertill wid basen gråbruna, i diffen rödgula, i framfanten och utkanten asfegrå; i framhörnet försedde med en svart ocell, omgifwen af en blekgul ring och prydd med hwit pupill. Bakvingarne undertill gråbruna, mot roten mörkare och bewurde med hwitgrå ludd; från främre kanten inåt midten af wingen går ett hwitagtigt, afbrutet band och bakom detta finnas 3—4 merendels mycket otydliga, ocelliska punkter.

Honan, som är större, liknar hannen, men har smalare brunagtiga kanter på wingarnes öfre sida och hufvare utkant på de bakres undre sida.

Varven är naken, till färgen grön med en mörk linea längs ryggen och en hwit längs hwardera sidan. Den lefwer på flera gräsarter, men isynnerhet på kamgräset (*Cynosurus cristatus*). **Pupan** är slät, utan taggar, men har fäntigt hufvud och är till färgen grön.

2. Starrgräs-Fjärilen (*Coenonympha davus*. Fabr.)

Alis integris, flavo ochraceis, anticis utrinque ocello unico, subtus lineola albida; posticis supra ocellis 2—3, subtus cinereis fascia abrupta albida ocelli-que 5—6. L. al. exp. 35—40 millim.

Vingarne helbräddade, ochragula, de främre på båda sidor med en ocell, undertill prydd med en kort, hwitagtig linea; de bakre ofswan med 2—3 oceller, undertill grå med ett afbrutet hwitagtigt band och 5—6 oceller. *L. e. wingsp. 1⁷/₁₆—1⁵/₈ t.*

Syn. *Papilio davus* Fabr. E. S. III. 4. 221, 690 *Hipparchia* Ochs. Schm. I. 4. p. 302. IV. p. 23. 66. *Erebli* Dalm. Pap. Sv. p. 83. n. 44. *Satyrus* Zett. Ins. Lapp. p. 904. 15. Godart et Duponch. Lepid. II. p. 455. pl. 24. l. 4. 2. *Coenonympha* H—S. Text I. p. 84. *Papilio tullia* Hübn. Pap. t. 52. f. 243. 244.

Var. h) Bakvingarne undertill bruna, pudrade med oöfragult; ett bredt afbrutet hvitt band öfver diffen och wid anallhörnet 2 större oceller, omgifne af gula ringar och förfebbe med felfwerfärgade pupiller. (Alæ posticæ infra fusæ, flavo-pulverulatæ, fascia lata, abrupta, albida in disco, et ocellis 2 magnis, argenteo-pupillatis, flavedine circumcinctis, ad angulum ani).

Var. c. Framvingarne ofwan utan oceller, undertill med en; bakvingarne undertill med 3:ne. (Alæ anticæ supra coecæ, subtus uniozellatæ; posticæ subtilus ocellis 3).

Syn. *Papilio laidion* Borkh. Schm. I. p. 94. n. 29.

Var. d. Framvingarne ofwan bleft oöfragula utan ocell, undertill deremot med en, hvilken dock flundom är otydlig och försvinnande; bakvingarnes undre flida utan eller med en otydlig ocell. (Alæ anticæ supra pallide ochraceæ, coecæ, intra ocello unico, interdum evanescente; posticæ coecæ aut ocello tantum obsoleto).

Syn. *Papilio isis* Thunb. Diss. Ins. Sv. 2. p. 30. *Satyrus* Zett. Ins. Lapp. p. 905. n. 46. *Erebila davus* var h. Dalm. Pap. Sv. 83. 44. Ochs. Schm. I. 4. 302. 65. Godart et Duponch. Lepid. II. p. 155. *Coenonympha isis* II—S. Text I. p. 84. tab. 61. f, 293—296.

I Juni, Juli och Augusti månader träffas denna art mer eller mindre talrik i fårr och på sankt ångar såväl i södra som i norra delarne af Skandinaviska halfön. Lifväl är han mera sporadiskt än föregående. I Skåne är han på flera ställen allmän, såsom wid Lrolle Ljungby, W. Bramb, Giphult m. fl. fl. Så äfwen i Småland t. ex. wid Anneberg (Bhm) och i Östergöthland t. ex. wid W. Gneby nära Norrköping (Stenh.), samt i Norrige t. ex. wid Christiania, Edeberg och i Österdalen (Siebke). Mot norden aftager han dock, och är sällsynt inom polcirkeln. De olika varieteterne förefomma tillfannman med hvarandra. Var. b., äfwenfom var. c., är ganska sällsynt och blott en gång träffad wid Lrolle Ljungby. Var. d., som af några författare blifwit ansedd för egen art, är lifaledes rar och förekommer egenligen i norden, der den är anmärkt wid

Galix i Österbotten, wid Åsele i Umeå Lappmark och wid Bosjefop nära Nord-Cap, men icke sydligare än i Roslagen (Bett.) — I södra Europa är arten mindre allmän, men skall dock talrik träffas i östra delarne af Frankrike.

Artbeskr. Antennerne bruna, på ena sidan hwitringlade med mörk flubba, på den andra deremot enfärgadt grå ända ut i flubbans spets. Palperne gråagtiga med långa, mörkgrå hår undertill. Ansigtet och mellankroppens rygg gulbrunt-håriga. Prostet starkt grålubet. Abdomen ofwan mörkbrun, undertill hwitgul.

Samme: Vingarne rundade, helbräddade med ljusgrå fran-sar; ofwan mer eller mindre mörkt ocfragula, mot utfanterne mörkare; de främre hafwa nära framhörnet en svart ocellformig punkt, omgifwen af en blekgul ring, och stundom ännu en annan otydligare punkt eller ring; de bakre äro i diffen enfärgade med 2—3 swarta punkter nära utfanten, hwardera omgifne af en gul ring. Stundom saknas en eller annan af dessa punkter. Undertill äro framvingarne från basen utöfver midten ocfragula, i utfanten och framhörnet askegrå med en svart, hwitpupillerad, med gul ring omgifwen ocell, och innanför denna en tvergående hwit linea, som ej hinner någondera wingfanten; stundom finnes ännu en mindre och otydlig ocell, oftast utan pupill. Bakvingarne äro mörkt askegrå med ett hwitt, på midten afbrutet band öfver diffen, och 5—6 med hwita ringar omgifne ocellformiga punkter, oftast saknande pupiller.

Soundan liknar hannen till färgen, men är ljusare ocfragul. Varieteternes olikheter äro ofwan angifne.

3. Perlgräs-Fjärilen (*Coenonympha arcania*. Linn.)

Alis integris, anticis ferrugineis, infra ocello unico; posticis supra fuscis, infra cinereis ocellis 5, primo fascia alba continua remoto. L. al. exp. 32—35 millim.

Vingarne helbräddade, de främre rostgula, undertill med 1 ocell; de bakre ofwan bruna, undertill gråagtiga med 5 oceller, hvaraf den

första är skild från de öfriga genom ett hvitt, sammanhängande band. L. e. wingsp. $1\frac{5}{16}$ — $1\frac{3}{8}$ t.

Syn. *Papilio arcania* Lin. F. S. p. 273 n. 4045.
Fabr. E. S. III. 4. 224. 692. **Hüb.** Pap. I. 54. f. 240. mas.
 241. 242. **sem.** Text. p. 42. n. 75. **Hipparchia** Ochs.
 Schm. I. 4. p. 317. IV. p. 24. n. 72. **Erebica** Dalm.
 Pap. Sv. 84. 47. **Satyrus** Godart et Duponch. Lepid. I.
 474. pl. 8. f. 3. **Coenonympha** II—S Text I. p. 85.

Denna art tillhör endast flögstrakterne, isynnerhet lössfogarne, i Sveriges södra och medlersta provinser. Dess flygtid infaller i Juni och Juli månader. I Skåne förekommer han nämnde tid på flera ställen, liksom i Blekinge, i Småland, på Öland och Gotland, i Östergötthland, vid Stockholm och i Westmanland mer eller mindre allmän. I norra delarne af landet är han ännu icke anmärkt, så att han tyckes upphöra med sistnämnde provins. Inom Norrige är han weterligen icke ännu träffad.

Artbeskr. Antennerne mörkbruna med hwita ringar. Balperne hwitgrå, undertill med tätta, långa grå och swarta hår. Anstgdet och mellankroppen gulbrunhåriga. Abdomen ofwan mörkt gulbrun, undertill hwitagtig. Fötterne gulbruna.

Samme: Wingarne helbräddade med hwitagtige fransar; de främre ofwan rostgula, längs framkanten smalt, längs utkanten bredt swartbruna; de bakre mörkbruna med en smal rostgul fläck wid analhörnet. Framwingarne undertill rostgula, i främre och yttre kanten gråbruna, med ett swartagtigt, stundom silfversfärgadt streck längs den sednare. Bakwingarne från roten utöfwer midten och återigen wid utkanten mörkt gråbruna. Dessa båda sålt åtskiljas genom ett hvitt band af olika bredd, som innansför sig har i wingens främre kant en ocell, och utanför sig längs wingens yttre kant 4 andra. Dessa oceller äro försedde hwardera med en hwit pupill och omgifne af en mörk och en gul ring. Stundom äro 1—2 af dem otydliga; äfwen antydas de stundom på wingens öfre sida. Emellan ocellerne och yttre kanten löper ett silfversfärgadt och ett rostgult streck.

Swan liknar hannen, men har ofwan i framvingarnes mörka utkant en svart, af gul linea omgifven punkt, som motsvarar undre sidans ocell. Innanför den sednare på undre sidan en otydlig hvit tverfläck.

Varven är grön med en mörkgrön linea längs ryggen, på hvars båda sidor löper en hvitgul. Munnen är röd och öfver fotraden går på hvardera sidan en gul linea. Pupan har rödaktig abdomen och whitagtiga wingslidor med röd infattning. Larven lefwer isynnerhet på gräsarterne af släktet *Melica*. (Ochs).

4. *Bruma Gräs-Fjärilen* (*Coenonympha hero* Lin)

Alis integris, fuscis: anticis supra aut immaculatis, aut ocello minutissimo, infra distinctiore; posticis supra ocellis 2—5 coecis, infra 6 pupillatis fasciaque dentata alba. L. al. exp. 30—32 millim.

Wingarne helbräddade, svartbruna; de främre ofwan antingen ofläckade eller försedde med en gansta liten ocell, som undertill är större och tydligare; de bakre ofwan med 2—5 blinda, undertill med 6 hvitpupillerade oceller och ett tandadt, hvitt band. L. e. wingsp. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{5}{16}$ t.

Syn. *Papilio hero* Lin. F. Sv. 274 4047. Hübn. Pap. t. 53 f. 252. 253. tem. Text p. 42. n. 76. *Hipparchia* Ochs. Schm. I. 4. 343. IV. 23. 70. *Erebia* Dalm. Pap. Sv. 84. 46. *Satyrus* Zett. Ins. Lapp. 905. 48. *Godart et Duponch. Lepid. I. 472 pl. 8 secund. f. 2. Coenonympha* H—S. Text I. p. 85. *Papilio sabaeus* Fabr. E. S. III. 4. 222. 694.

Denna släktets jällsyntaste artens egentliga hemvist inom Skandinavien är Sveriges och Norges medlersta, bergigare provinser emellan 58—62 grader nordlig polhöjd, der han mindre sällan träffas i Juni och Juli månader, isynnerhet uti flogarne i Dalarne (Bohm) och i Westmanland, såsom wid Norberg (Friedrichs.). I norra delen af Westergöthland, wid Galnatorp i Udenäs socken, förekommer han äfven (Wahlb.). Linné anför också Upsala såsom fundort. I Skåne är han högst sällsynt och der tagen blott af Prof. Bettersstedt (se anf. st.) I Norge är han träffad wid Christiania och

Kongswinger af Doctor Siebke. Enom de egentliga Lappmarkerne är han ej anmärkt. Utom Sverige är han funnen på åtskilliga ställen i Tyssland och Nordfrankrike.

Artbeskr. Antennerne på ena sidan bruna med hwhita ringar, på den andra enfärgadt grå. Palperne på längden hwhita och swarta, undertill med långa mörkgrå hår. Mellankroppen mörkt brunhårig. Abdomen ofwan mörkbrun, undertill gulhvit. Fötterne brungrå.

Hanne: wingarne helbräddade med hwhitagtiga fransar; ofwan mörkbruna, de främre oftast enfärgade, sällan med en ocellformig fläck i framhörnet, bestående af en mörk punkt, som omgifwes af en matt, gulagtig ring; de bakre nära utkanten med 2—5 ocellformiga fläckar, oftast utan pupiller, omgifne hwardera med en gul ring; i analhörnet ett smalt rödgult streck. Undertill äro wingarne ofvabruna; de främre ofta med en liten hwhitpupillerad, af gul ring omgifwen ocell; innanför denna synes mer eller mindre tydligt en fort, hwhit linea. Bakwingarne hafwa bakom midten ett twergående, merendels sammanhängande, tandadt, hwhitt band, utanför hwilket finnas 6 swarta, hwhitpupillerade oceller, som hwardera äro omgifne af en rödgul ring. Längs alla wingarnes yttre kanter löpa en blufärgad, och en rödgul linea.

Honan liknar hannen, men ocellfläcken på framwingarnes öfre sida är merendels tydligare, och ofta löper längs utkanten af bakwingarnes öfre sida ett smalt, rödgult streck. Åfwen är ocellen wid analvinkeln på nyfnämnde wingars undre sida ofta dubbel.

Num. Till Sveriges Fauna har åfwen blifwit räknad Darrgräs-Fjärilen, hwilken likwäl icke är känd af någon nu lefwande Lepidopterolog såsom Skandinavisk. Af Dalman har den blifwit uppförd på grund af ett till Gyllenhal jändt exemplar utan localuppgift. För widare efterforskning uppföres här dess artmärke:

Darrgräs-Fjärilen (Coenonympha iphis W. V.) *).

Wingarne helbräddade, hos hannen ofwan ofvabruna, hos ho-

*) Intra limites Scandinaviæ non occurit, quantum novimus.

nan oöfragula; de bakre undertill brunagtigt grå med ett afbrutet hvitt band, 5—6 oceller och en rödgul linea bakom en annan smal, fläpverfärgad i ufsanten.

Syn. *Papilio iphis* W. V. Anh. p. 321. 25. Hübn. Pap. t. 53. f. 249 mas. 250. 254 fem. Text p. 40. 74. *Hipparchia* Ochs. Schm. I. 4. 310. *Satyrus*. Godart et Duponch. Lepid. II. p. 445. pl. 20. f. 3. 4. *Erebia* Dalm Pap. Sv. 84. 18. *Coenonympha* H—S. Text. p. 85.

Arten förekommer i Tyskland, Östra Frankrike, på Pyreneerne m. fl. a. st. under Juni och Juli månader; men då man icke har sig bekant någon säker local för dess förekomst inom Skandinavien, kan den ej ännu räknas till dess Fauna.

Släktet: **Pararga.** HÜBN. H—S.

(*Hipparchia* FABR. OCHS. *Satyrus* LATR. BOISD. ZETT. *Erebia* DALM.)

Antennæ longiores, extrorsum in clavam distinctiorem, plerumque sat determinatam, ovatum, sensim transeuntes.

Palpi longitudinem capitis vix l. parum superantes, subadscendentes, apicibus nutantibus, compressi, triarticulati. *Articulus* medius reliquis conjunctis multo longior, ad basin basali latitudine æqualis, exinde sensim attenuatus, apice rotundato; ultimus minutus, basali multo brevior, ovatus, ad basin medio gracilior, ad apicem tamen illo latitudine fere æqualis, rotundatus. *Articulus* medius, ut etiam basalis, infra pilis longissimis parcius instructus; ultimus pilis rarioribus obsitus. in pilositate reliquorum fere occultus.

Oculi hirti.

Pedes antici graciles, maris breves et densius, feminæ tamen longiores et parcius pilis ciliati, tarsibus in maro inarticulatis, sed in femina articulis 3—5, debilibus. Femora et tibiæ ceterorum fere ut in *Coenonympha*; sic etiam articuli tarsorum.

Alæ rotundatæ, subdentatæ, margine interiori posticarum ad angulum ani rotundato. Cellula discoidalis anticarum subaperta.

Costæ alarum ut in *Coenonympha*, sed ramulus costæ primæ posticarum tamditate subquadrangulari, ad finem sæpe latiori, indictus, et basis costæ 40:mæ et trunci communis inferioris tantum inflata. Costa transversa cellule discoidalis ramulum rectum et brevem in cellulam ipsam semper emittit; costa ipsa non tam fortiter arcuata, ut in *Coenonympha*, et inter costam 4 et 5 plerumque abrupta, tantum plica tenuissima continuata.

Antennerne temligen långa, utåt småningom öfvergående i en tydligare, merendels temligen bestånd och äggformig flubba.

Palperne knapt eller högst obetydligt öfverstigande hufvudets längd, uppåttligande, med lutande spetsar, sammantryckta och treledade: medlersta leden mycket längre än de öfrige tillsammans, wid basen i bredd lika basleden, derefter småningom afsmalnande, i spetsen tillrundad; den sista liten, mycket kortare än basleden, äggformig, wid basen smalare än medlersta leden, men wid spetsen i bredd nästan lik den samma, afrundad. Medlersta leden jemte basleden undertill försedd med glesare längre hår; sista leden föga hårig, i de öfriges hårichet nästan dold.

Ögonen ludda.

Fötterna: de främre smala, hos hannen korta med tätare hårfransar, hos honan deremot längre, och glesare hårfransade; tibierne hos hannen oledade, hos honan delade i 3—5 rudimentera leder. De öfrige fötternes låar och tibier, äfvensom tarsleder lika dem hos *Coenonympha*.

Wingarne rundade, småtandade; de bakres indre kant i analhörnet rundad. De främres distålt halsöppet.

Nerverne på wingarne såsom hos *Coenonympha*, men första wingnervens gren på bakwingarne angifves genom en nästan quadrangulär uppsvällning, som ofta är bredast mot slutet, och blott 10:de wingnervens samt nedre nervslammens rot är uppsvällb. Diståltets tverrnerv på framwingarne utfänder alltid

en kort och rät gren i fjelfwa fältet, och nerben fjelf är icke så starkt böjd som hos *Coononympha* och merendels afbruten mellan 4:de och 5:te wingnerverne, och blott fortsatt medelst ett fint wingveck.

De till detta slägte räknade arter, hwilka föredraga steniga, stogrika trakter och högländt betesmark framsör slättlandet med dess åkrar, tillhöra, med undantag af en enda, södra och medlersta Sverige och Norge. Största delen förekomma ock i twenne generationer om året, den ena, hwilken öfvervintrat, om våren och den andra om hösten. Larverne äro ludna af fina och korta hår.

A. *Antennklubban långsträckt, föga afskild från skufket.*

1. **Dårgås-Fjärilen** (*Pararga dejanira* Lln.)

Alis subdentatis, cinereo-fuscis; anticis utrinquo ocellis 5, magnis; posticis supra ocellis 2—4, infra 6, fasciaquo albida. L. al. exp. 49—57 millim.

Wingarne småtandade, gråbruna, de främre på båda sidor med 5, de bakre ofwan med 2—4, undertill med 6 oceller och ett hwitt tvärband. L. e. wingsp. $2-2\frac{5}{16}$ t.

Syn. *Papilio dejanira* Lln. S. N. I. 2. 774. 454. Fabr. E. S. III. 4. 230, 749. Hübn. Pap. t. 38 f. 470. 471 fem. Text. p. 29. 29. *Hipparchia* Ochs. Schm. I. 4. p. 229. IV. p. 24. 29. *Satyrus* Godart et Duponch Lepid. I. p. 468. pl. 8 f. 4. *Pararga* II—S. Text I. p. 87.

Denna, medlersta Europa egenligen tillhöriga, art, hwilken ijsnerhet är allmän i några af Frankrikes och Tysklands stogar, blef inom Sverige först upptäckt af Prof. Zetterstedt, som fann den på Medhamra äng nära Wadstena, der den på fuggrika ställen under ekar är särdeles allmän i Juni månad. På samma ställe har den blifwit återfunnen af Prof. Boheman. Afwenledes lär den wara träffad wid Drottningholm af Stud. Belstage. Annorstädes inom landet är den ej anmärkt.

Artbeskr. Antennerne bruna, hwitringlade. Palperne hwita, nedtill swarta. Ansigtet swartagtigt, brunludet. Ögonen bakåt

begränsade af ett hvitt streck. Mellankroppen gråagtigt brunluden. Abdomen ofwan brungrå, undertill hvitagtig. Bröfvet gråluoet. Fötterna hvitgrå.

Stanne: Wingarne småtandade med hwita, på de främre svartfläckiga fransar; ofwan gråagtigt bruna; de främre med 5, de bakre med 2—4 större och mindre swarta, ocelliska fläckar, hwardera omgifne af en gul ring. Wingarnes undre sida ljustare grå med en hvitagtig, aflång fläck i hwardera wingens distalt, och ett vinkeladt, hvitt, på framwingarne i gult stötande, på bakwingarne nästan afbrutet tverband närmare utkanterne, bakom hwilket finnas på de förra 5 stora oceller, som äro nästan lika öfre sidans, men hafwa hwardera en hvit pupill, och på de sednare 5—6 oceller, af hwilka de 2:ne, framkanten närmaste, äro skilda från de öfriga genom det hwita bandet, som här merendels förenar sig med en hvit fläck, kommande från framkanten och slutande wid 3:dje ocellen. Längs alla wingarnes utkanter löpa trenne mörkbruna linier, af hwilka den medlersta är bredast och tydligast.

Honan lifnar hannen, men har det hvitagtiga bandet på wingarnes undre sida merendels smalare och saknar oftast den hwita fläcken bakom ocellerne på bakwingarne, eller har den blott matt antydd.

Parven är sluluden, ljusgrön med mörkare linier längs kroppen och lefwer företrädeswis på Dårgräset (*Lolium temulentum*), ehuru den, såsom sina öfrige samsläktningar, äfwen tillgriper andra gräsarter.

A. *Antenklubban* äggformig, tydligt afskild från skäftet.

2. Svingelgräs-Fjärilen (*Pararga megæra*. Lin.)

Alis subdentatis fulvis fusco-fasciatis; anticis supra ocello, posticis supra ocellis 3—5, infra 6. L. al. exp. 45—49 millim.

Wingarne småtandade, rödgula med bruna tverband; de främre ofwan med en ocell; de bakre med 3—5 oceller ofwan, och 6 undertill. L. c. wingsp. $1\frac{13}{16}$ —2 t.

Syn. *Papilio megæra* Lin. S. N. 1. 2. 774. 142.
 Fabr. E. S. III. 1. 94. 222. Hübn. t. 39. f. 477. 478
 mas. Text. p. 29. 31. *Hipparchia* Ochs. Schm. I. 1. 235.
 IV. 24. 33. Treitsch. X. 1. 37. 226. *Erebia* Dalm.
 Pap. Sv. 79. 3. *Satyrus* Godart et Duponch. Lepid. I.
 460. pl. 7. sext. f. 3 fem. *Pararga* H—S. Text. I. p. 82.

Uti sýðligaste provinserne af Sverige är denna fläril om våren i Maj och sedan åter i Juli, men isynnerhet i Augusti månad icke sällsynt på för solen öppet liggande, stenbundna fält och platzar i skogarne. Mera sällan träffas den på ångar och släta, kala betesmarker eller åkrar. Uti Skåne t. ex. wid Gøphult, W. Wramb, Trolle Ljungby m. fl. st. och i Blekinge t. ex. wid Sölvesborg och Carlshamn är den temligen allmän. I Småland (Nidderb.), Halland, Bohuslän (Götheborg och Marstrand) och på Öland (Wahlb.) är den äfwen träffad, men blifwer derefter mycket sällsynt, så att den blott en eller annan gång i Juni månad förekommer wid Christiania i Norge. Således synes den stiga högre mot nordén på westerä än östra kusten, emedan den icke blifwit anmärkt i Östergötland eller wid det under ungefär samma parallellkrets med Christiania liggande Norberg i Westmanland, icke eller wid Stockholm. Mycket högre än till Christiania torde den dock icke eller i wester gå.

Artbessr. Antennerne mörkbruna med hwita ringar. Klubban mörkbrun, på ena sidan hwitgrå. Palperne gråagtige, med långa mörkgrå och brunagtige hår undertill. Ansigtet och mellanfroppen ludne af gulbrunt. Abdomen ofwan mörkbrun, undertill gråagtig. Bröflet mörkt gråludet. Fötterne bruna.

Naunc. Wingarne småtandade, ofwan rödgula, wid basen mörkare, isynnerhet de bakre, i framkanten och utkanten mörkbruna, med gråagtiga franfar. De främre med ett mörkbrunt tverband öfwer disken, hwilket går från framkanten, längs dissfältets twernery, wid hvars slut det delar sig, fäandande en smalare gren till wingens bakre hörn, der det innesluter en fläck af grundfärgen, och en bredare till infantens midt. Desutom finnas twenne korta och smala mörkbruna linier i dissfältet och en swart, hwit-pupillerad ocell i främre hörnet. Bakwingarne,

hvaras rödgula färg snarare bildar ett tverband, har wid utkanten 3—5 olifflora swarta oceller, hwardera med en hvit pupill. Undertill äro framvingarne blefware än på öfre sidan och i wingspetsen gråagtige, samt hafwa längs utkanten bleka parallela linier eller fläckar. För öfrigt äro de tecknade såsom på öfre sidan, men tverbandet saknar den indre bredare grenen, och ocellen, hwilken stundom framom sig har en mindre, är omgifwen af en brunagtig ring, som innesluter en annan rödgul. Bakvingarne äro undertill grå, mot basen mörkare och hafwa öfwer diffen twenne tandade bruna linier, som innesluta ett tverband af grundfärgen, och längs utkanten 6 smärre oceller, hwardera omgifne af twenne bruna och twenne röda ringar. Den indre ocellen är oftast dubbel. Längs den mörkare utkanten går en rad grå, halfrundformiga fläckar, hwilka likwäl stundom äro otydliga.

Honan är större än hannen med blefware grundfärg, och tverbandet på framvingarnes öfre sida saknar helt och hållet den indre grenen, hwilken ersättes genom en från diffen till indre kanten gående linea.

Parven är grön med 3:ne mörka linier, en längs ryggen och en längs hwardera kroppsida, och lesiwer på åtskilliga gräsarter, isynnerhet på svingelgräset (*Festuca elatior*). — **Puppan**, som är grå eller svartagtig med hufware små taggar, har twenne trubbiga spetsar på hufwudet och en trubbig tagg på ryggen.

3. **Berggräs-Fjärilen** (Pararga hiera Hübn.)

Alis subdentatis, fuscis; anticis utrinquo sesquicollo; posticis supra lineam transversa nigra, dentata, ocellisquo 3, infra 6. L. al. exp. 43—45 millim.

Wingarne småtandade, bruna; de främre på båda sidor med en större och antydning till en mindre ocell; de bakre ofwan med en övergående svart, tandad linea och 3 oceller, undertill med 6 tydliga. L. e. wingsp. $1\frac{3}{4}$ — $1\frac{13}{16}$ t.

Syn. *Papilio hiera* Hübn. Pap. t. 39. f. 176. sem. *Hipparchia* Ochs. Schm. IV. 135. Treitsch. X. 4. 36. *Satyrus* Godart et Duponch. Lepid. Suppl. 1. 286. pl. 46. f. 3—4. Boisd. Icon. p. 220. pl. 44. f. 1. 3. *Pararga* II—S. Text I. p. 89. *Satyrus mæra* var Godart. Encycl. method. tom. IX. 501. 86. Boisd. Ind. meth. 21.

Denna art tillhör mera Skandinaviska halföns medlemmar och norra landskaper, än de södra. Dock förekommer han äfwen, ehuru temligen sällsynt, i Skåne, Blekinge, Småland (wid Anneberg Bhm.) och i Östergötland (wid Hårabshammar Stenh.). Allmänare blifwer han omkring Stockholm, och är ganska allmän wid Norberg (Fredrich.) i Westmanland. I södra Norge finnes den icke sällsynt omkring Christiania, Kongewinger, wid Edsberg och i Odalen (Siebke). I de nordligaste landskaperna träffas den öfwer allt i bergskogarne och är högst allmän omkring Öfre Torneå (Wahlb.) Bergiga och stenrika stogtrakter är de egentliga tillhåll och flygtiden infaller i Maj, Juni och Juli månader.

Artbeskr. Antennerne swarta med hvita ringar. Klubbarna swartbrun, på ena sidan hvitpuddrad. Palperne brungrå, undertill med grå hår. Ansigtet och thorax brunhåriga. Abdomen ofwan brun, undertill gråagtig. Bröfvet brungrått, ludet. Fötterna bruna.

Stämne: Vingarne rundade, med bruna fransar; ofwan bruna; de främre med otydliga mörkare linier i difken och en rad rödgula fläckar i framhörnet och wid utkanten. I främre hörnet finnes uti en rödgul fläck en större svart ocellformig fläck med hvit punkt i midten och en annan dylik wid kanten; stundom finnes en hvit, med svart omgifwen, punkt närmare wingspetsen. Bakvingarne hafwa öfwer difken en svart, eller mörkbrun, tandad linea och längs utkanten en rad af 3:ne större oceller, hvardera omgifne af en rödgul ring och försedda med hvit pupill, samt utåt begränsade af en fin mörkbrun linea. Stundom finnes äfwen antydning till en eller annan mindre ocell. Undertill äro framvingarne sotigt bruna med rödgul anstrykning och med samma mörkare teckning som

megæra, samt hafwa i främre hörnet en stor, af rödgul ring omgifwen ocell, hwilken ofta har twenne mindre framom sig i wingspetsen. Bakvingarne äro undertill grå, mot basen mörkbruna; föröfrigt till teckning och oceller lifa dem hos megæra.

Nonan lifnar hannen, men har lifware grundfärg, och tydligare teckning ofwan.

4. **Ilvitgräs-Fjärilen** (*Pararga mæra* Lin.)

Alis subdentatis, obscuro fuscis; utrinque anticis susquicollo; posticis supra unicoloribus ocellis 3, infra 6. L. al. exp. 49—55 millim.

Wingarne småtandade, mörkt bruna, de främre ofwan med en större och anhöning till en mindre ocell; de bakre ofwan enfärgade med 3 oceller, undertill med 6. L. e. wingsp. $2-2\frac{1}{4}$ t.

Syn. *Papilio mæra* Lin. F. Sv. p. 275. 1049. Fabr. E. S. III. 1. 227. 744. Hübn. Pap. 1. 39. f. 174. 175. *Hipparchia* Ochs. Schm. 1. 4. 234. IV. 21. Treitsch. X. 4. 36. *Erebia* Dalm. P. Sv. 79. 2. *Satyrus* Zett. Ins. Lapp. 904. 4. *Pararga* H—S. Text I. p. 88. *Satyrus adrastus* Duponch. Lepid. Suppl. 1. 284. pl. 46. f. 1. 2.

Num. *Satyrus mæra* Godart Lepid. 1. p. 157. pl. 7. sext f. 2. är samma art som *Hipparchia adrasta* (Esp. Ochs. Schm. IV. 24. 137.) och icke Linnes *P. mæra*. Dock är den måhända blott en varietet af denna sednare.

Liksom föregående art egentligen tillhör de norra trakterne af vår halfö, så tillhör denna närmast de sydliga, der den förefommer under Maj och Juni, samt åter under Juli och Augusti månader mer eller mindre allmän uti skogstrakterne, på fält och ängar. Den synes i mängd aftaga mot nordn i samma mån som föregående tilltager, men huru långt den går i norr är likväl ännu icke utrönt. Vid Stockholm och i Westmanland finnes den och Prof. Zetterstedt uppför den såsom sällsynt i Lappmarkens skogar. I Norge förefommer den åtminstone ända till Trondhjem (Siebke).

Artbeskr. Denna lifnar så nära föregående art, att flera äldre Författare ansett dem båda såsom variationer af en och samma. Här är tillräckligt att angifwa skilligheterna:

Samme: Vingarnes öfre fläda är mörkare brun än hos *P. hiera*, utan alla spår till den mörkare teckning, som finnes hos nybnämnde. Framvingarne i främre hörnet tillspetsade med en större, af en smal rödgul ring omgifwen ocell, och framför denna en mindre, lifaledes omgifwen af en rödgul ring. Bakvingarne hafwa ocellerne såsom hos *P. hiera*, men utan mörk begränsning. Vingarnes undre fläda är äfwen lifa *P. hiera*, men framvingarnes ocell har oftast ännu en hwit fläck bakom den wanliga pupillen.

Honan, som har framvingarne mera rundade än hannen, är till färgen ljusare, än denne, men äfwenledes utan mörkare teckning och har ofta såsom *P. hiera*, några rödgula fläckar i framvingarnes yttre kant, bakom ocellen, hwilka hannen till denna art merendels saknar.

Varven är ljusgrön med en mörk rygglinea och hwita strimmor längs kroppslidorna samt bewuren med fina, hwita hår. Den lefwer på *Hordeum murinum*, *Poa annua*, *Festuca fluitans* m. fl. gräsarter. Puppen är trubbig, svartagtig eller blekgrön. (Ochs.)

5. Quickgräs-Fjärilen (*Pararga egeria* Lln.)

Alis dontatis, *olivaceo fuscis*, *luteo maculatis*; *utrinque anticeis ocello*; *posticis supra ocellis 3*, *subtus punctis 4—5 albis*, *fusco-circumcinctis*. L. al. exp. 42—46 millim.

Vingarne tandade, oliv-bruna, gulfläckiga; de främre på båda flidor med 1 ocell; de bakre öfwan med 3 oceller, undertill med 4—5 hwita punkter, omgifne af bruna ringar. R. e. wingsp. $1\frac{11}{16}$ — $1\frac{7}{8}$.

Syn. *Papilio egeria* Lln. S. N. I. 2. 774. 143. Fabr. E. S. III. 4. 94. 293. Hübn. Pap. t. 40. f. 184. 182 mas. Text. p. 30. n. 33. *Hipparchia* Ochs. Schm. I. 4. 238. IV. 24. Treitsch. X. 4. 37. *Erebia* Dalm. Pap. Sv. 79. 4. *Satyrus* Godart et Duponch. Lepid I. 163. pl. 8. secund. f. 4. *Pararga* H—S. Text. I. p. 89.

Denne fjäril, en af vår Gammas sällsyntaste arter, är, såwidt man wet, inom Sverige endast funnen i de medlersta landskaperna, såsom på Landtbruks-Akademiens experimentalfält wid Stockholm

(Bhm.), på Eibingön (Dalm.), wid Gusum i Östergötthland (Wahlb.), wid Borgholm på Öland (Zett.) samt wid Kapellshamn på Gotthland, der jag träffat den sommaren 1849. I Norge förekommer den wid Christiania (Siebke). Dess flygtid infaller i Juni och Juli månader, då arten isynnerhet bör sökas i barrskogar.

Artbeskr. Antennerne ofwan bruna med hvita ledafdelningar, undertill hwitagtige med rödgul anstrykning och bruna ledafdelningar. Klubban brunagtig med rödgul spets. Balperne grågula, med brunagtige hår undertill. Mellankropp och abdomen ofwan bruna, den förre luden. Abdomen undertill gråagtig, åfvensom det ludna bröstet.

Stann: Vingarne, isynnerhet de bakre, tandade; de främre med omkring 12 gula fläckar, och en svart, hwitpupillerad ocell, som utåt begränsas af en gul halscirkel; de bakre med 2:ne otydliga gula fläckar, den ena i framkanten, den andra emellan 4 och 5 wingnerverne, och längs utkanten 3:ne större svarta, hwitpupillerade oceller, hwardera omgifne af en gul ring. I rad med dessa finnes en gul fläck, som är försedd med en brun punkt. Undertill äro framwingarne blefare och i spetsen gulbruna, men för öfrigt tecknade såsom på öfre sidan. Bakwingarne äro nedantill gulbruna, längs utkanten flötande i grått och stundom der försedda med en mörkare linea. Öfwer disten gå twenne tandade, mer eller mindre tydliga bruna linier, mellan hvilka grundfärgen stundom är mörkare och då bildar ett tverband. Bakom detta synas twenne gulaktige fläckar, motsvarande öfre sidans. Längs utkanten finnes en rad hvita punkter (4—5), hwardera omgifna of en mörk, rödbrun ring. Fransarne ofwan och undertill gulagtige med bruna fläckar der nerverne utlöpa.

Honan liknar hannen, men har i allmänhet blefare färger.

Varven är hårig, på tweren frugig, mattgrön, längs ryggen mörkgrön, med gulagtiga eller hwitagtiga linier längs sidorne, och lesver på *Triticum repens* m. fl. gräsarter. **Pupau** är grön eller brunagtig, med twenne forta och trubbiga

taggar i hufvudets främre del, uppsvälld rygg och tvenne rader små fnappformiga utväxter längs åt den samma.

Släktet: *Aphantopus*. nov. gen.

(*Hipparchia* FABR. OCHS. *Satyrus* LATR. BOISD. ZETT. *Erebia*
DALM. *Epinephele*. HÜBN. H—S.)

Antennæ longiores, extrorsum haud crassiores. Clava indistincta.

Palpi longitudinem capitis vix superantes, subporrecti, compressi, triarticulati. Articulus medius reliquos conjunctos longitudine superans, basali fere latior, sed conformis, ad apicem haud attenuatus, apice subtruncato; ultimus basali longior, omnium gracillimus, cylindricus, apice acuminato. Articulus medius et basalis infra pilis longissimis, divaricatis dense instructus; ultimus tamen pilis adpressis, in pilositate reliquorum non latens.

Oculi nudi.

Pedes antichi brevissimi, in pilositate plane occulti, pilosissimi, incrassati; femora sat crassa; tibiæ tarsique etiam incrassati; hi arcuato-reflexi, biarticulati, articulo ultimo minuto, conico. Femora pedum reliquorum infra ad basin hirsuta. Calcaria tibiæ minuta. Articuli tarsorum fere ut in genere *Coenonympha*.

Alæ rotundatæ, integræ. Margo interior posticarum ad angulum ani haud excisus. Cellula discoidalis anticarum subaperta.

Costæ alarum ut in genere præcedento, sed costa transversa anticarum semper simplex, inter costam 4 et 5, huic tamen propius, abrupta, tantum tumiditate continuata, et inter costam 5 et 6 oblique subarcuata. Intervallum basale inter costas alarum anticarum 8 et 9 triplo majus, quam inter costam 7 et 8. Ramulus costæ primæ alarum posticarum tumiditate subquadrangulari, obtusa, indictus.

Antennæ temligen långa, utåt föga tjockare. Klubban omärklig.

Palperne knappt öfverstigande hufvudets längd, framåtrigtade, sammantryckte, treledade. Medlersta leden längre än de öfrige till sammantagne, nästan bredare än basleden, men för öfrigt lifformig, wid spetsen föga affsmalnande, trubbig; första leden längre än basleden, smalare än någondera af de öfrige, cylindrisk, till spetsad. Den medlersta leden jemte basleden undertill försedd med långa, utåtsperrade, tätta hår; den sista deremot med tilltryckta hår, icke dolda i de öfriges hårighet.

Ögonen nakna.

Fötterna: de främre högst korta, alldeles dolda i bröstets hårighet, starkt hårige, tjocka; deras lår temligen tjocka, äfwenfom tibberne och tarserne, hvilka sednare äro bågböjdt bakåtrigtade, tvåledade, yttersta leden liten och conisk. De öfrige fötternes lår undertill wid basen ludna. Tarsernes sporrar små. Tarsolederne nästan som hos släktet *Coenonympha*.

Wingarne rundade, helbräddade. De bakres indre kant wid analhörnet föga utskuren. De främres distfält halfföppet.

Nerverne på wingarne såsom hos föregående släkte, men distfältets tvärvannerv på framwingarne alltid enkel, emellan 4—5 wingnerven, närmare den sednare, afbruten, blott fortsatt genom en uppsvällning, och emellan 5—6 wingnerven snedt bågböjdt. 8—9 nerverne på framwingarne wid basen skilda från hvarandra genom ett tre gånger större mellanrum än 7—8 wingnerverne. Grenen till bakwingarnes första nerv antydd genom en nästan quadrangulär, trubbig uppsvällning.

Inom Skandinavien förekommer en enda art:

Luktgräs-Fjärilen (*Aphantopus hyperanthus* Lin.)

Alis integris, fuscis, subtus anticis ocellis 4—3, posticis 5 l. tantum punctis albis. L. al. exp. 35—38 millim.

Wingarne helbräddade, bruna undertill med 1—3 oceller på framwingarne och 5 på bakwingarne eller blott hvita punkter. L. e. wingsp. $1\frac{7}{16}$ — $1\frac{9}{16}$.

Syn. *Papilio hyperanthus* Lin. F. Sv. 273 4043.
Fabr. E. S. III. 4. 246. *Hipparchia* Ochs. Schm. I. 4.

225. IV. 21. 28. *Erebria* Dalm. Aap. Sv. 84. 8. *Satyrus* Zett. les. Lapp. 903. 8. *Godart et Duponch.* Lepid. l. 470. pl. 7. f. 3. *Epinephele* H—S. Text l. p. 84. *Papilio polymeda* Hübn. Pap. t. 38. f. 472. 473. Text. p. 28. n. 28.

Var. a. Vingarne ofwan mörkbruna, merendels ofläckade; undertill glänsande gulgrå; de främre med 1—3 af gula ringar omgifne oceller; de bakre med 5 på samma sätt prydde oceller (*P. hyperanthus* Auct.)

Var. b. Vingarne ofwan gråbruna, ofläckade, undertill glänsande gulgrå, de främre med 2, de bakre med 5 oceller. (*P. vidua* Auct.)

Var. c. Vingarne på båda sidor gråbruna, undertill de främre med 2, de bakre med 5 hvita punkter. (*P. arete* Ochs. l. 4. 228.)

Var. d. Lif föregående, men har ofwan på bakvingarne i vid analhörnet tvänne hvita punkter.

Stjärilen, som förekommer under alla sommarmånaderne, är allmän i hela Europa, särskild i skogsängar. Inom Skandinavien förekommer han öfver allt, likväl sällsyntare inom de nordligare landskaperna (Zett). Allmännaft äro varieteterne a och b; sällsynta deremot var. c och d. Juli och Augusti månader äro egentliga flygtiden.

Artbeskr. Antennerne svartbruna med whitagtiga ringar och ljusbruna spetsar. Balperne whitagtige, i undre kanten svartagtige och starkt ludna genom långa, bruna och svarta hår. Ansigtet och mellanroppen ofwan mörkbruna, hårige. Abdomen ofwan mörkbrun, undertill gulbrun. Bröfvet ljusbrunt, hårigt.

Hanne och Hona till färgen lifa hwarandra. Vingarne helbräddade, ofwan svart eller gråbruna med eller utan svarta punkter motjvarande undre sidans oceller. Fransarne hvita. Undertill är grundfärgen ljusare brunagtigt eller gulagtigt-grå, tillfölje af kort tilltryckt ludd. Framvingarne hafva mot utfanten 1—3 oceller, hwardera med whit pupill och omgifne af en gul ring. De bakre hafva fem dylika, af hvilka 2:ne sitta filda från de öfrige, närmare utfanten. Hos var. c och d äro ocellerne ersatte genom hvita punkter.

Varven är finluden, hvitgrå med en brun, smal linea längs ryggen, hvilken på de främre segmenterne är afbruten och otydlig. Den lefver på *Poa annua*, *Milium effusum* m. fl. andra grässlåg, och är i rörelse blott om aftenen och natten. Oftast öfvervintrar han och förpuppas följande vår. Puppen, som är kort och ljusbrun med mörkare streck, har långa wingslidor och kort abdomen.

Släktet: **Epinephele.** (HübN. H—S.)

(*Hipparchia* FABR. OCHS. *Satyrus* LATR. BOISD. ZETT. *Erebia* DALM.)

Antennæ longiores, extrorsum haud crassiores. Clava indistincta.

Palpi longitudinem capitis superantes, subadscendentes, apicibus subnutantibus, compressi, triarticulati. Articulus medius reliquos conjunctos longitudine superans, ad basin basali fere gracilior, in medio dilatatus, exinde subito attenuatus, apice subacuminato; ultimus cylindricus, gracilis, apice acuminato, basali longitudine æqualis. Articulus medius ut etiam basalis infra pilis longissimis, divaricatis dense instructus; ultimus pilis subdistantibus, in pilositate reliquorum non latens.

Oculi nudi.

Pedes antici breves, gracillimi, in pilositate pectoris haud occulti, nudi; femora, tibiæ et tarsi æquo graciles sunt; tarsi unarticulati. Femora reliquorum femine infra nuda; articuli tarsorum ut in genere præcedente, sed articulus quintus quartum longitudine haud superat. Calcaria tibiæ valida.

Alæ rotundatæ, dentatæ, præsertim posticæ. Margo interior posticarum ad angulum ani excisus. Collula discoidalis anticarum subaperta.

Costæ alarum ut in genere præcedente, sed costa transversa anticarum inter costam 5 et 6 exacto arcuata. Interval-

lum basale inter costas alarum anticarum 8 et 9 vix duplo majus, quam inter costam 7 et 8. Ramulus costæ primæ posticarum tumiditate rotundata indietus.

Antennerne temligen långa, utåt föga tjockare. Klubban omärlig. **Palperne** öfverfligande hufvudets längd, uppåt stigande med något lutande spetsar, sammantryckte, treledade: medlersta leden längre än de öfrige tillsammans, vid basen nästan smala än basleden, på midten bred, derefter hastigt afsmalnande, spetsig; sista leden cylindrisk, smal, spetsig, lifa lång med basleden. Den medlersta leden jemte basleden undertill förfedd med långa, utsperrade, täta hår; den sista, med något från hvarandra stilda hår, icke dold i de öfrigas hårlighet.

Honans nakna.

Fötterne: de främre korta, ganska smala, föga dolda i bröstets hårlighet, nakna; lår, tibier och tarser lita smala; tarserne enledade. De öfriges lår undertill hos honan nakna; tarserne såsom hos föregående släkte, men femte leden knappt längre, än den sjerde. Tibiernes sporrar starka.

Wingarne rundade, tandade, isynnerhet de bakre. Bakwingarnes indre kant vid analförnet utsturen. Framwingarnes distålt halföppet.

Nerverne på wingarne såsom hos föregående släkte, men framwingarnes tvärnerver emellan 5—6 wingnerven fullkomligt bågböjd. 8—9 nerverne på framwingarne vid basen stilda från hvarandra genom ett knappt dubbelt större mellanrum än 7—8 wingnerverne. Grenen till bakwingarnes första nerv antydd genom en rundad uppräckning.

Äf detta släkte finnes lifaledes blott en art inom vår halfös gränser:

Slåttergräs-Fjärilen (*Epinephelo janira* Lin.)

Alis dentatis, fuscis, anticis lominæ macula flava, in utroque sexu oculo; posticis subtus fusco-grisais, posterioribus pallidioribus, punctis 4—3 fuscis. L. al. exp. 45—52 millim.

Wingarne tandade, de främre hos honan med en gul fläck, hos båda könen med en ocell; de bakre undertill brungrå, utåt lufare med 1—3 bruna punkter. L. e. wingsp. $1\frac{3}{16}$ — $2\frac{1}{8}$ t.

Syn. *Papilio janira* Lin. F. Sv. 276. 1053. mas. *P. jurtina* Lin. F. Sv. 276. 1052. fem. *P. janira* Fabr. E. S. III. 4. 241. 572. *P. jurtina* Hübn. Pap. t. 36. f. 161. 162. *Hipparchia janira* Ochs. Schin. I. I. 218. *Erebia* Dalm. Pap. Sv. 83. 13. *Satyrus* Zett. Ins. Lapp. 904. 14. *Godart* et *Duponch.* Lepid. I. 451. pl. 7. sexl. I. 4. *Epinephele* H—S. Töxt I. p. 83.

Num. Pap. *jurtina* Hübn. I. c. I. 36. f. 160. tillhör, såsom Görf. sjelf i texten upplyser, *Pap. eudora* Fabr., hvilken icke förekommer i Sverige eller Norge.

Var. b. Bakwingarne ofwan och undertill hvitgula, på sednare stället med twenne mörka punkter, mas. (*E. janira* H—S. tab. 22. f. 104. 105.)

Var. c. Wingarne hvitgula; de främre ofwan med en ocell och der bakom 2—3 rödgula, aflånga fläckar, undertill i disten rödgula.

Syn. *Papilio brigitta* Ljungh. Act. Holm. 1799. p. 147. t. II. n. 3. l. 6. 7. (enl. original-exemplar, som förvaras på Entomologiska Museum i Lund). *Erebia janira* var. *Dalm.* P. Sv. 83. 13 obs.

Stärilen förekommer på ängar och betesmarker allmän i hela södra och medelsta Sverige och Norge. I nordligare delarne af vår halfö blifwer han sällsyntare (Zett.). Huru högt mot Norden han egentligen stiger är ännu ej afgjort. Dess flygtid infaller i Juli och Augusti månader.

Arbetsf. Antennerne bruna, i spetsen ofwan gråagtige, undertill stötande i gult. Balperne gråbruna, undertill ludna, med grå och swarta hår. Ansigtet och mellankroppen starkt bevarna med mörkbruna hår. Abdomen ofwan mörkbrun, undertill gulagtig.

Stämne: wingarne rundade, de bakre i utkanten starkare tandade. Granarne lufa. Alla wingarne ofwan mörkbruna med gulagtig glans mot utkanterne. De främre hafwa nära wingspet-

sen en svart, med hvit pupill försedd ocell, hvilken omgifves af en rödgul ring. Undertill äro de i hela disken ochragula, i framfanten och utfanten brunagtigt grå, samt prydd med ocell, motsvarande öfre sidans. Bakvingarne äro undertill från basen till midten mörkt brungrå, derestefr ljusare med 1—3 mörbruna punkter, hvardera omgifne med en gulagtig ring. (*P. janira* Lln. l. c.)

Donan liknar till grundfärgen hannen, men har i disken på framvingarnes öfre sida en större eller mindre rödgul, af grundfärgen belad fläck, och större ocell, hvilken ofta i bakre kanten är åtföljd af en mindre. Bakvingarne hafva undertill ett ljusare band, hvilket uppkommer derigenom att färgen nämare utfanten är mörkare, nästan lika mörk som vid basen. I detta band finnas mer eller mindre tydliga punkter liknande hannens. (*P. jurtina* Lln. l. c.)

Varven är finhårig, grön med hvit sidolinea och lefver på åtskilliga gräsarter. Efter att hafva öfvervintrat blir han följande vår, i Maj eller Juni, pupa, hvilken är gröngul med svartbruna streck på wingslidorne och tvenne spetsar i hufvudet.

Släktet: **Satyrus.** (LATR.) BOISD. H—S.

(*Hipparchia* FABR. OCHS. *Erebia* DALM.)

Antennæ longiores, clavatæ. Clava elongato-ovata, determinata, compressa, apice rotundata.

Palpi longitudinem capitis non superantes, compressi, subadscondentes, apicibus nutantibus, triarticulati. Articulus medius longissimus, longitudine reliquos conjunctos longo superans, subtumidus (ad basin nempe basali latitudine æquans, sed in medio lator, fere inflatus, et apicem versus attenuatus); ultimus non apice ipsa medii, sed lateri ejus antico propius insertus, reliquis gracilior, basali nonnihil brevior, ex-

acto oblongo-ovatus. Articulus medius et basalis infra pilis densis instructus; ultimus in pilositate eorum sero absconditus.

Oculi nudi.

Pedes autici breves, graciles, maris pilosissimi, feminæ pilis parcius ciliatis; tarsi uniarticulati. Femora reliquorum infra pilosa; tibiæ tarsique dentibus sat distinctis muniti; calcaria tibiærum valida; articulus tarsorum primus tribus sequentibus conjunctis longitudine æqualis, secundus tertio, hic tamen quarto, quinto sero æquanti, longior.

Alæ anticæ acuminatæ, integræ; posticæ rotundatæ, dentatæ, margine interiore integro, ad angulum ani rotundato.

Costæ alarum ut in genere præcedente, sed costa anticarum transversa inter costam 4 et 5 in medio sæpissime interrupta, tumiditate tantum connexa. Intervallum basalo inter costas alarum anticarum 8 et 9 æquo magnum ac inter costam 7 et 8. Ramulus costæ posticarum primæ tumiditate arcuata, acuminata, indictus.

Antennæ temligen långa, försedde med flubba. Denna är aflångt-åggformig, beständ, sammantrædt, i spetsen rundad.

Halperne icke öfverstigande hufvudets längd, sammantrædda, uppåtrigande med lutande spetsar, treledade: medlersta leden ganska lång, i längd vida öfvergående de öfrige tillsammans, något svålid (vid basen nemligen lika bred med basleden, men på midten bredare, nästan uppblåst, och mot spetsen afsmalande); den första icke infogad i sjelfwa spetsen af den medlersta, utan närmare dennes främre kant, smalare än de öfrige, kortare än basleden, fullkomligt aflångt-åggformig. Medlersta leden, jemte basleden, undertill försedd med tätsittande hår; den första nästan bult i de öfrigas hårlighet.

Ögonen nakna.

Fötterne: de främre korta, smala, hos hannen ganska hårige, hos honan försedde med gläfsare kanthår; tarfjerne enledade. De öfrigas låar undertill hårige; tibiae och tarfer utrustade med gan-

ffa tybliga tänder; tibiernes sporrar starka; tarsernes första led lika lång med de 3:ne följande tillsammans, den 2:dra längre än den 3:de och denna längre än den 4:de, hvarliden är nästan lika med den 5:te.

Wingarne: de främre spetsige, helbräddade; de bakre rundade, tandade, i indre fanten hela och wid anslörnet rundade.

Nerverne på wingarne såsom hos föregående släkte, men tvärnerven på framwingarne oftast midt mellan 4:de och 5:te wingnerven afbruten, blott sammanfuten genom en uppsvällning. Framwingarnes 7, 8 och 9 nerver wid basen fölida genom ett lika stort mellanrum och grenen till bakwingarnes första nerv antydd genom en höjd och spetsig uppsvällning.

Också detta släkte representeras inom Skandinavien af en enda art:

Sandgräs-Ljörilen (*Satyrus semele* Lin.)

Alis dentatis, fuscis fascia indeterminata maculari fulva; anticis utrinque ocellis duobus, posticis supra unico. L. al. exp. 52—55 millim.

Wingarne tandade, bruna med ett af fläckar bestående, gult tvärband, utan bestämd gräns; de främre på båda sidor med twenne oceller, de bakre ofwan med en. L. e. wingsp. $2\frac{1}{8}$ — $2\frac{1}{4}$.

Syn. *Papilio semele* Lin. F. Sv. 276. 1051. Fabr. E. S. III. 4. 232. 725. Hübn. Pap. t. 31. f. 143. 144. Text. p. 25. 15. *Hipparchia* Ochs. Schm. I. 4. p. 197. IV. 20. 6. *Erebia* Dalm. Pap. Sv. 79. 4. *Satyrus* Zett. Ins. Lapp. 901. 2. God. et Dup. Lepid. I. 439. pl. 7. tert. f. 4. II—S. Text I. p. 76. t. 40. f. 182 var.

På torra, sandiga och steniga ställen, isynnerhet uti och omfring bärfjogar, är denna art ganska allmän i södra och medelsta Sverige, åtminstone ända till Stockholm. I Norge förekommer den wid Christiania (Siebke). Redan i Westmanlands nordligare trakter börjar den blifva sällsynt (Fredrichs.) och aftager sedan i mängd så att den inom Lappmarkerne är ganska rar (Zett.). Dess flygtid infaller i Juli och Augusti månader.

Artbestr. Antennerne bruna. Palperne gråbruna, undertill med korta tätstående, grå, bruna och svartagtiga hår. Ansigtet och halsen brungrå, hårige. Mellankroppen brunluden, med mörk linea längs midten. Abdomen ofwan brun, undertill gråagtig. Bröfket mörkgrått, ludet. Fötterna bruna, tecknade med svart och grått.

Hanne: Bakvingarne tandade i yttre kanten. Framvingarne något tillspetsade. Grundfärgen ofwan smutsligt svartbrun, med ett ofragult genom de mörkare nerverne i flera fläckar deladt i verband nära utkanterna, hvilket inåt utan bestämd gräns öfvergår i grundfärgen, men utåt, liksomhet på bakvingarne, begränsas af en mörkare linea. Stundom är detta band mera otydligt och öfverdraget med brunt. I bandet hafva framvingarne tvenne vidt från hvarandra skilda oceller, af hvilka den främre är försedd med hvit pupill, och bakvingarne närmare anslörnet en mindre, äfven med hvit pupill försedd, hvilken likväl stundom är otydlig. Undertill äro framvingarne vid basen rödgula, mot utkanten ofragula, i framkanten och wingspetsen brungrå, marmorerade med svart, brunt och hvitt, och i utkanten bruna med en på flera ställen afbruten svart linea. Ocellerne äro såsom på öfre sidan, men stundom finnes den bakre blott antydd, eller saknas den helt och hållet. Bakvingarne äro marmorerade af svart, brunt och hvitt, dock löper öfver midten ett merendels renare hvitt, vågigt band. Vingsarnes fransar äro hvita med svartagtiga eller bruna fläckar.

Honan liknar hannen till färgen.

Släktet: Chionobas. BOISD. H—S.

(*Satyrus* LATR. ZETT. *Hipparchia* FABR. OCHS. *Erebia* DALM.)

Antennæ longiores, extrorsum sensim crassiores, clavam elongatam, gracilem, indeterminatam constituentes.

Palpi longitudinem capitis superantes, subadscendentis, triarticulati. *Articulus* medius longissimus, reliquis conjunctis lon-

gior, apicem versus sensim attenuatus, pilis brevibus divaricatis infra instructus; ultimus minutissimus, basali brevior, ovatus, apice rotundato, ad basin latitudine medio fere æqualis, in pilositate reliquorum vix absconditus.

Oculi nudi.

Pedes autici breves pilis longis divaricatis; femora nonnihil incrassata, semper tibiis tarsisque conjunctis breviora; tarsi tibiis aut longiores aut illis æquales, uniariculati, acuminati. Femora reliquorum infra hirta; tibiæ ut in genere præcedente, ut etiam articuli tarsorum; articulus quintus tamen tertio cum quarto longitudine fere æqualis.

Alæ integræ, posticæ vix dentatæ. Cellula discoidalis dimidiam partem alæ semper longo superat; anticarum clausa.

Costæ alarum ut in genere præcedente, sed costa tantum decima anticarum ad basin inflata. Costa transversa anticarum et inter costam 4 et 5 et inter 5 et 6 arcuata ut litteram S fere mentiet; ad 5 normalis. Ramulus costæ primæ posticarum brevis, fere rectus, apice abrupto obtuso.

Antennæ temligen långa, utåt småningom tjockare, bildande en lång, smal och obehållbar flubba.

Palperne öfvergående hufvudets längd, uppåttstående, treledade: medlersta leden ganska lång, längre än de öfrige tillsammans, mot spetsen småningom affmalnande, undertill försedd med korta, utsperrade hår; den sista ganska liten, kortare än basleden, äggformig, i spetsen rundad, vid basen nästan lika bred som den medlersta, knappt dold i de öfrigas hårlighet.

Ögonen nakna.

Fötterna: de främre korta, med långa utsperrade hår; låren något tjocka, alltid kortare än tibier och tarser tillsammans; tarserne antingen längre än, eller lika långa med tibierne, ensledade, spetsiga. De öfrigas lår undertill ludna; tibierne såsom hos föregående släkte, äfvenså tarsernes leder; den femte är likväl nästan likalång som den 4:de och 3:de tillsammans.

Wingarne helbräddade; de bakre söga tandade. Distfästet öfverflägar alltid wida wingens halwa del; de främres slutet.

Nerverne på wingarne såsom hos föregående slägte, men blott 10:de nerven på framwingarne wid basen uppblåst. De främres tverrnerv böjd både emellan 4 och 5 och emellan 5 och 6 nerverne, så att den liknar bokslafwen S; wid 5:te nerven normal. Grenen till första nerven på bakwingarne kort, nästan rät, i spetsen tvärt trubbig.

Med undantag af en enda art, som finnes på Alperne i södra Europa, tillhör detta slägte norra och nordligaste delarne af Europa, Asien och Amerika, der de lewa i fjelltraakternes skogar och fårr, och upplåga till och med ända till snögränsen. Skandinavien räknar till sin Fauna trenne arter, af hwilka ingen förekommer i södra och medlersta Sverige och knappt någon fliger betydligt nedom Dövre i Norge.

1. Gulbruna Gräs-Fjärilen (*Chionobas norna* Thbg.)

Alis subdentatis, fusco-testaceis, fascia dilutiora lata, anticis utrinque plerumque ocellatis, posticis sæpe oculo unico, infra cinereo fuscoque marmoratis, fascia dentata saturatiori. L. al. exp. 45—55 millim.

Wingarne småtandade, brungula, med ett bredt ljufare band; de främre på båda sidor merendels med oceller; de bakre ofta med en enda, undertill marmorerade med grått och brunt, samt försedde med ett mörkare tandadt band. L. c. wingsp. $1\frac{13}{16}$ — $2\frac{1}{4}$ t.

Var. a. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Alis anticis utrinque ocellis 3, posticis supra 1—2,} \\ \text{infra puncto minuto.} \\ \text{Framwingarne på båda sidor med 3 oceller, de bakre} \\ \text{ofwan med 1—2, undertill med en liten punkt.} \end{array} \right.$

Syn. *Papilio norna* Thbg. Diss. Ins. Sv. 2. p. 36. var. a. Hübn. Pap. t. 152. f. 765. 766. *Satyrus* Zett. Ins. Lapp. p. 901. 4. var. c. *Chionobas* Boisd. Icon. pl. 36. f. 4—6. *Satyrus* Godart et Duponch. Lepid. 1. 205. pl. 34. f. 4—5.

Var. b. { Alis anticis utrinque ocellis 3; posticis inocellatis.
 Framvingarne på båda sidor med 3 oceller; de bakre
 utan oceller.

Syn. *Satyrus norna* Zett. l. c. var. d.

Var. c. { Alis anticis utrinque ocellis 2, posticis supra unico.
 Framvingarne på båda sidor med 2 oceller; bakwin-
 garne med en.

Syn. *Papilio norna* Hüb. Pap. l. 452. f. 763.
 764. *Hipparchia* Ochs. Schm. l. 4. 204. 17. *Erebia*
Dalm. Pap. Sv. 80. 6. *Satyrus* Zett. l. c. var. a.
Chionobas II—S. p. 69.

Var. d. { Alis anticis utrinque ocellis 2; posticis inocellatis.
 Framvingarne på båda sidor med 2 oceller; de bakre
 utan ocell.

Syn. *Papilio norna* Thbg. l. c. var. b. *Satyrus*
 Zett. l. c. var. b.

Var. e. { Alis anticis utrinque ocello unico; posticis ocello
 aut unico aut nullo.
 Framvingarne på båda sidor med en ocell; de bakre
 antingen med en eller ingen.

Syn. *Papilio hilda* Quensel. Act. Holm. 1791. 272.
 l. 9. f. 7. 8. *Satyrus norna* Zett. l. c. var. e. (an
Chionobas oeno II—S. Text. p. 74. tab. 27. 123.
 124?)

Obs. *Chionob. oeno* Boisd. Icon. pl. 39. f. 4—6 a.
Ch. Oenone II—S. l. c. differo videtur. Vido
 infra syn. ad *Ch. bore*.

Var. f. { Alis supra inocellatis; anticis interdum infra ocello
 unico, absolute.
 Vingarne ofwan utan oceller; de främre underflundom
 undertill med en, otydlig ocell.

Syn. *Papilio norna* Thbg. l. c. var. g. *Satyrus*
 Zett. l. c. var. f.

Denna i anseende till storleken och ocellernes antal mycket va-
 rierande fjäril, förekommer i fårr och lägre belägna ängar uti Lappland
 och Norrsta Hjälsbyggarne. Der är han i Juni och Juli månader,

då hans flygtid infaller, allmän på flera ställen, såsom wid Umenäs och Brattisjället i södra Lappmarkerne (Zett.), emellan Arjeplog och Klappen i Viteå Lappmark (Wahlb.) och i Njunnaåsdalen nära Quikjock i Luleå Lappmark, men isynnerhet nedanom St. Diwe, norr om Karesuando, och wid Hietannenkosti wid Torneå elf (Wahlb.). Inom Norrige är han träffad så hybligt som wid Dowre (Bohem. Siebke). Lifsom Sandgräs-fjärilen hwilar han sig ofta på stenar och trädstammar.

Artbeskr. Antennerne ofwan rödagtigt bruna med hwita ledaf-delningar, undertill rödgulagtiga. Klubban rödgu'. Balperne hwitgula, undertill tätt bewuxna med svartbruna hår. Anslaget ludet af svartbrunt. Mellanfroppen bewuxen med längre, gulgrå hår. Abdomen ofwan brun, undertill gråagtig. Bröfket mörkt brun-ludet. Fötterne gulbruna.

Wingarne ofwan från roten utöfwer midten gulbruna med ett bredt rödgult, mörkare eller blefare band längs utkanterne, hwilka på framvingarne merendels äro enfärgadt gulbruna, men på bakvingarne ofta pryddes med rödgula åckar. Framvingarne undertill blekt rödgula med gulbrun anstrykning i disken eller brunsgula, så att öfre sidans tverband äfwen här synes tydligt, samt med brun och grå wattring längs framkant, utkant och i spetsen. Bakvingarne undertill marmorerade med brunt och hwitt, med ett tvergående, mer eller mindre tydligt, utåt och inåt starkt tandadt, mörkare band. Då detta är tydligt synes på hwardera af deså sidor wingens grundfärg mera hwitagtig, än annorstädes. Längs utkanten ett mer eller mindre tydligt brunt streck. Framsarne hwitgula med brunagtiga åckar. De med en hwit punkt förseddde ocellerne variera till antal, såsom ofwanföre blifwit wifadt.

2. Grågula Gräs-Fjärilen (*Chionobas bore* Esp.)

Alis vix subdentatis, griseo-ochraceis, anticis subtilis in disco fusco irroratis, posticis subtilis griseo fuscoq. marmoratis, fascia transversa saturatorio, plus minus distincta. L. al. exp. 45—50 millim.

Wingarne knappt småtanbade, grågula; de främre undertill i disten med bruna atomer: de bakre undertill marmorerade med grått och brunt, med ett mörkare, mer eller mindre tydligt tvärbånd L. e. wingsp. $1\frac{3}{16}$ — $2\frac{1}{16}$ t.

Syn. *Papilio bore* Esp. Schm. l. T. 400. cont. 55. f. 4. p. 37. Hübn. Pap. l. 29. f. 434—436. Text. 24. 43. *Hipparchia* Ochs. Schm. l. 4. 205. 49. (excl. syn. Thunb.) *Erebia* Balm. Pap. Sv. 80. 7. (excl. syn. Thunb.) *Satyrus* Zett. Ins. Lapp. 902. 7 Dup. Lepid. Suppl. l. 209. (excl. syn. Thunb.) pl. 32. f. 4—2. *Chionobas* Boisd. Icon. p. 493. t. 37. f. 4—3 (excl. syn. Thunb.) II—S. Text. l. p. 70. pl. 26. f. 419—422. *Papilio norna* Quens. Act. Holm. 4791. 274. t. 40. f. 42. *Pap. fortunatus* Fabr. E. S. III. 4. 214. 670. *Chionobas* Oeno Boisd. Icon. pag. 495. pl. 39. f. 4—6. *Satyrus oeno* Dup. Lepid. Suppl. l. 307. pl. 49. 4—3. *Chionobas taygete* II—S. tab. 24. f. 412—445.?

Obs. *Ch. oeno* Boisd. certe est eadem species ac *Ch. bore* Esp., colore obscuriore in pagina inferiore alarum posticarum tantum diversa, quod nullo modo speciem distinctam, sed varietatem tantum designat, ut e speciminis numerosis, eodum tempore et loco collectis et a me collatis, et ex analogia congenerum satis apparet. *Chionobas also* Boisd. Icon. p. 497. pl. 40. f. 4. 2. nec multum abluero videtur, sed a me non visum ad speciem eandem eum referre nolui. *Ch. oeno* II—S. l. c., ocello in apice alarum anticarum a specie ejusdem nominis Boisduvali sine dubio diversus varietati minori *Ch. nornæ* est simillimus, et ad illam speciem dubius relatus.

Denna art är en af Skandinavien's fåfhyntaste fjärilar och hittills endast funnen på bergsplateaun af St. Dirre emellan 68—69 gradens polhöjd, i Torneå Lappmark nära Torneå elf, der Prof. Wahlberg i Juli månad träffade honom i mängd. Deß åsigt är tung och owig, så att man utan swårighet kan bemäktiga sig hwarje exemplar, som man får se.

Artbestr. Antennerne hvitgrå med brunagtiga ledafdelningar. Klubban rödgul, ofwan brunsfuggad, i yttersta spetsen brunagtig.

Balperne hwitgrå, undertill bevarna med svartbruna hår. Ansligte och skuldror gråludne. Mellanfroppen gulbrun, luden. Abdomen ofwan svart, öfverpudrad med gulbrunt och bevarn med glesa hår; undertill blekt gulbrun. Bröflet svartbrunt, ludet. Fötterne hwitgrå med bruna atomer. Låren undertill ludne af tåta, svartbruna hår.

Saune: wingarne ofwan grågula, mer eller mindre stötande i brunt. Framwingarne ofwan från roten långs framkanten smalt gråagtige med bruna atomer, i wingspetsen och utkanten äfvenledes med bruna atomer; längs den sednare synas stundom äfven otydliga rödgula fläckar. Bakwingarne från basen utöfver midten mörkare brunagtige, förorsakadt af undre sådans mörkare färg, som der synes igenom; längs utkanten ett gulgrått, brunpudradt band och i selska kanten stundom otydliga, brunagtige, halfmånformiga fläckar. Framwingarne undertill gulgrå, längs framkanten och tvert öfver wingspetsen gråagtiga med bruna och svartagtiga atomer och småstreck; sådana finnas äfven i disken; wingbasen brunagtig. Bakwingarne hwitgrå, öfver hela ytan marmorerade med svart och brunt, hwilket är tätast mot basen; öfver wingarnes diff går ett af hopade swarta och bruna atomer bildadt, stundom med öfriga teckningen sammanflytande och derigenom otydligt, band, som utåt och inåt mer eller mindre begränsas af svart. Transarne hwitgrå med bruna fläckar wid nervernes utlopp.

Souan liknar hannen, men är i allmänhet större, ljusare gulgrå ofwan och har mera afrundade wingar. Stundom finnas på bakwingarnes öfre sida längs utkanterne spår till hwitgula fläckar.

Anm. Enligt *Boisduval* skall en annan, denna närstående art förefomma wid Nord-Cay. Ehuru detta namn af utländska författare ofta, såsom man kan finna, tages collectivt för alla nordligaste orter inom Europa, är det dock en möjlighet, att samma art finnes i Nertsja Ginnarken, oagtadt den hittills undgått de resande swenske Naturforskares uppmärksamhet, som besökt dessa trakter. Då den således icke ännu kan med säkerhet

råfnas till vår Fauna, uppföres här blott dess diagnos, utkastad efter exemplar från Grönland:

Nordiska Gräs-Fjärilen (*Chionobas bootes*. BOISD. *).

Wingarne ofwan gråagtigt brungula med en af fläckar bestående brun linea längs utkanterna; de främre undertill rödgula med en svartagtig, vinklad linea tvert öfver disken; de bakre undertill marmorerade med grått och brunt, med ett mörkare smalt tverband öfver disken, och en mer eller mindre tydlig, af fläckar bestående, brunagtig linea längs utkanten.

Syn. *CHIONOBAS bootes*. BOISD. Icon. p. 491. pl. 37. f. 4. 5. 6.
HIPPARCHIA TREITSCH. X. 4. 32.

Denna arts egentliga hemland är Grönland och Labrador, derifrån han eges i Scandinaviska samlingar. Enligt *Boisduval* skall den äfwen förefomma på Kamtschatka och Nord-Cap.

3. Gråbruna Gräs-Fjärilen (*Chionobas jutta* Hüb. n.)

Alis subdentatis griseo-fuscis serie macularum fulvarum, anticis utrinque ocellis 1—4, posticis 1—2; his infra cinerascens fusco irroratis, fascia obscuriore transversa, plus minus distincta. L. al. exp. 50—58 millim.

Wingarne småtandade gråbruna, med en rad rödgula fläckar; de främre på båda sidor med 1—4, de bakre med 1—2 oceller; de sednare undertill affegträ, brunmarmorerade med ett mörkare, mer eller mindre tydligt tverband. $\text{L. e. wingsp. } 2\frac{1}{16} - 3\frac{3}{8} \text{ t.}$

Syn. *Papilio jutta* Hüb. n. Pap. t. 420. f. 644. 645.
Hipparchia norna var. Ochs. Schm. I. 4. 202. *Satyrus jutta* Zett. Ins. Lapp. 902. 5. Godart et Duponch. Lepid. Suppl. I. 250. pl. 40. f. 3—5. *Chionobas* Boisd. Icon. 487 t. 38. f. 1—4. II—S. Text I 68. pl. 25. f. 146—148. (*Chionobas balder* Boisd. Icon. 489. t. 39. f. 4—3. II—S. 68. t. 79. f. 384—386. *Satyrus* Zett. I. c. 902. 6. Godart et Duponch. Lep. Suppl. I. 340. pl. 49. f. 4. 5. varietas haud distincta, secundum exemplaria nummerosa, a me collata).

*) Species tantum ut incola Groenlandiae nobis cognita; nec in Lapponia, nec in Finmarkia (ne ad Cap Nord) adhuc reperta, quantum mihi innotuit.

Denna fjäril är fjällhyntare än Gulbruna Gräs-Fjärilen, hvilken den närmast liknar och hvars varietet den af äldre författare blifwit ansedd wara. Så wäl till flygt som lefnadsfäit skiljer den sig dock från denna. Den flyger långsamt (Bohem.), men är lifwäl flegg och swår att fänga. Helst hwilar den sig på trädstammar. Den sydligaste orten inom Sverige, der den blifwit funnen är Dre i Dalarne under 61^o nordl. polhöjd. (Bohem.) I Umeå Lappmark finnes den mera talrikt nära Lycksele, uti ett fårr emellan allmänna vägen och Hellefors (Bett. Dahlb. Wahlb.). I Norge är den funnen sydligast wid Soløer (Siebke). Dess flygtid infaller i Juni och Juli månader.

Artbeskr. Antennerne ljusbruna, hwitringlade, i spetsen gulagtiga. Palperne mörkbruna, undertill swarthåriga. Ansigte och rygghöfd svartbruna, ludna. Abdomen ofwan mörkbrun, undertill asfegråagtig. Bröflet svartbrunt, ludet. Fötterne ljusbruna.

Naunc: Vingarne ofwan gråbruna; de främre något tillspetsade i främre hörnet, ofwan med 1—4 rundade, swarta fläckar i en rad andra rödgula; den medlersta stundom liten, stundom också alla otydliga. Bakvingarne ofwan med en rad pilformiga eller ovala, stundom otydliga rödgula fläckar längs utkanten, af hwilka 1—2 nära anahörnet hafwa hwardera en swart ocellformig fläck; dock är dessa stundom äfwen här otydliga. Framvingarne undertill längs framkanten och iwert öfwer wingspetsen asfegrå med swartagtiga eller bruna streck och atomer; i difsen blekt bruna med swarta, af gult omgifna, ocellformiga fläckar, belägna närmare utkanten och motsvarande öfre sidan, dock stundom i antal mindre än på denna. Bakvingarne asfegrå marmorerade med fina bruna eller swartagtiga streck; öfwer difsen ett mörkare tandadt band, stundom (när grundfärgen är mörkare än elseil) omärkligt; mot utkanten 1—2 swarta, runda ocelliska fläckar, motsvarande öfre sidan, hwardera otydligt omgifne af gult. Östa är äfwen här antalet en mindre än på öfre sidan.

Honan skiljer sig till färgen från hannen blott deri, att öfre sidan är något ljusare brungrå, och bakvingarnes undre sida stundom mörkare, så att tverbandet blir otydligt.

Anm. Den såsom särskild art ansedda varieten: *Chionobas balder*, skiljer sig från den af *Voisduval* antagna normala formen för *Chionobas jutta* blott genom olika antal af ocellerne. Den förra har på framvingarne 3 oceller ofwan och 2 undertill, samt på båda sidorne af bakvingarne blott en ocell. Den skulle också variera mera till antalet af framvingarnes oceller, men alltid på bakvingarnes öfre sida hafwa twenne, men på undre deremot endast en. Öfvergångar finnas från ytterligheterna, såsom ofwanföre i artbeskrifningen blifwit wisadt.

Släktet: **Erebia.** (DALM.) BOISD. H—S.

(*Satyrus* LATR. ZETT. *Hipparchia* FABR. OCHS.)

Antennæ longiores, extrorsum crassiores clavam crassam, oblongam, sat determinatam constituentes.

Palpi longitudinem capitis non superantes, subadscendentes apicibus nutantibus, pilosi, triarticulati, quoad forma articulorum pro specie variantes (articulus medius aut conformis, aut in medio latior; ultimus brevis l. longior, aut ovalus, aut conicus, aut cylindricus); ultimus tamen semper villosus a reliquis vix distinguendus.

Oculi nudi.

Pedes autici brevissimi, in pilositate pectoris plano occulti, tantum fore uno latero pilis longissimis, divaricatis, in mare densius quam in femina, instructi, nonnihil incrassati; femora maris æquo longa ac tarsi cum tibiis; tarsi brevissimi, conici l. ovati; femora tamen feminae tarsis cum tibiis longiora; tarsi longiores, graciles. Tarsi in utroque sexu uniarticulati. Pedes reliqui omnino ut in genere præcedente.

Alæ rotundatæ, integræ, posticæ rarius subdentatæ. Cellula discoidalis dimidiam partem alæ vix superat.

Costæ alarum ut in genere præcedente, sed costa anticarum transversa inter costam 4 et 5 recta, ad hanc plerumque evanescens, et inter 5 et 6 iterum recta l. parum arcuata; costa ipsa ad costam alæ 5 semper geniculata. Ramulus costæ primæ posticarum, brevis, curvatus, apice plerumque acuminato.

Antennæ temligen långa, utåt tjockare, bildande en tjock, af lång, temligen bestämd klubba.

Palperne icke öfverfligande hufvudets längd, uppåtsligande, med lutande spetsar, hårige, treledade, i anseende till lederens form hos species varierande (medlersta leden antingen lifformig eller på midten bredare; den sista kort eller längre, antingen äggformig, eller konisk, eller cylindrisk); den sista lifväl alltid hårig, knappt skillbar från de öfrige.

Ögonen nakna.

Fötterna: de främre gangsta korta, alldeles dolda i bröstets hårighet, nästan blott på ena sidan försedde med långa, utsperrade hår, hos hannen tätare än hos honan, något tilltjocknade; hannens lår lika långa med tarjer och tibier; tarjerne gangsta korta, koniska eller äggformiga; honans lar deremot längre än tarjer och tibier, tarjerne längre och smala. Tarjerne enledade. De öfrige fötterna såsom hos föregående släkte.

Wingarne rundade, hela, de bakre sällan småtandade. Diffältet öfverfliger knapt wingens halfta längd.

Nerverne på wingarne såsom hos föregående släkte, men de främres tvärvärd emellan 4 och 5 wingnerven rät, vid denna merendels försvinnande, och emellan 5 och 6 återigen rät eller föga böjd; hela tvärvärdem vid 5 wingnerven alltid vinkelad. Grenen till första nerven på bakwingarne kort, kraftig, merendels tillspetsad.

De till detta släkte hörande arter, förekomma med undantag af en enda, endast i norra trakterne af Sverige och Norge. En del

af dem fliga dock äfven ned i de medlersta delarne af landet. Dels fogar, dels fjärr äro deras wistelseort och de förekomma blott i en generation om året.

1. **Blodgräs-Fjärilen** (*Erebia medusa* Fabr.)

Alis integris brunneo-fuscis concoloribus, ocellis subquatuor in fascia maculari rufa. L. al. exp. 40—44 millim.

Wingarne helbräddade, svartbruna, enfärgade med omfring 4 oceller i en rad rödgula fläckar. L. e. wingsp. $1\frac{11}{16}$ — $1\frac{3}{4}$ t.

Syn. *Papilio medusa* Fabr. E. S. III. 4. 235. 734.

Hüb. Pap. t. 45. f. 103. 104. Text. 34. 47. *Hipparchia*

Ochs. Schm. I. 1. 273. IV. 22. *Satyrus* Zett. Ins. Lapp.

903. 9. Godart et Duponch. Lepid. II. 140. pl. 15. f.

5. 6. *). *Erebia* Dalm. Pap. Sv. 81. 9. II—S. Text. I. 66.

Alarum fascia maculari fulva nulla, ocellis
præsertim in alis posticis chsolutis.
Var. b. Wingarne utan rödgula fläckar, ocellerne isyn-
nerhet på bakwingarne omärkliga.

Satyrus medusa Zett. I. c. var. b.

Denna hos och sällsynta art finnes endast i de nordligaste delarne af Lappmarkerna och äfven der temligen sällsynt. Vid Karesuando i Torneå Lappmark är den funnen af Prof. Betterstedt, och wid Mortainen, 2 mil söder om Kautokino i Norrka Finmarken under 69^o polhöjd, fanns den på en äng temligen talrik af Prof. Wahlberg. Under mulna dagar, eller då moln en eljest klar dag bortstjummer solen, döljer den sig i gräset. Flygtiden inträffar i Juni månad.

Artbeskr. Antennerne ofwan svartbruna, undertill hwitagtige.

Klubban ofwan svartbrun, i spetsen rödgul, undertill hwitagtig.

Balperne, ansigtet och ryggstölden tät beväxne med svartbruna

*) Maculæ rufæ alarum anticarum sunt in speciminibus, a me collatis, exacte rotundatæ, nec ovato-oblongæ ut in figuris Godarti et Duponcheli, præterea sunt etiam ocelli duo in apice anticarum reliquis majores, nec iis æquales ut in figuris memoratis.

hår. Abdomen ofwan svart med svartbruna gläsa hår, under till ljusare mörkbrun. Bröfket svartbrunt, lubet. Fötterne hvitgula.

Hanne: Vingarne ofwan enfärgadt svartbruna; de främre med 2—4 (högst sällan 5) swarta oceller, hwardera belägne i en ringformig, rödgul fläck. Tvenne af dessa oceller äro störst, hwarandra närstående och belägna wid wingipetsen, samt stundom hwardera försedd med hvit pupill. Bakvingarne hafwa 1—4 blinda oceller, lifa framvingarnes. Undertill äro alla vingarne lifaledes svartbruna; de främre äro lifväl i disten rödagtigt anslupna, i wingipetsen med tvenne större, alltid hvitpupillerade oceller, motsvarande öfre sidan och bakom dessa andra mindre, till antalet varierande, men alltid belägne i rödgula fläckar, såsom på öfre sidan. Bakvingarne hafwa längs utkanten 1—4 smärre swarta oceller, hwardera omgifne af en rödgul, smal ring, och någre försedde med hvit pupill. Gransarne ofwan och undertill svartbruna.

Honan skiljer sig till färgen från hannen deri, att de rödgula ringarne omkring ocellerne äro på vingarnes båda sidor blefare, samt bakvingarne undertill, öftare än hos hannen, strax framom ocellerne och i utkanten mindre mörkbruna, än wid basen, hwarigenom ett ljusare band bildas, intagande bakre tredjedelen af wingen, deri också ocellerne äro belägne.

Parven, som lefwer på *Panicum sanguinale**) beskifwes vara ljusgrön med hwitagtiga och mörkgröna långstreck och fina hår. (Ochs.)

2. Skogsgräs-Fjärilen (*Erebia ligoa* Lin.)

Alis subdentalis, nigro-brunnei-, fascia rufo-terruinea; anticeis utrinquo ocellis 3—4; posticeis ocellis 3 et intra plerumquo maculis albis. L. al. exp. 43—47 millim.

*) Då lifväl detta gräs är inom Sverige ganska sällsynt och desutom icke, så widt man wet, finnes inom Lappmarkerne, måste Blodgräs-Fjärilens larv äfwen lefwa af andra gräsarter.

Wingarne småfandade, svartbruna med ett rostrodt band; de främre på båda sidor med 3—4 oceller; de bakre endast med 3 och undertill merendels försedde med hvita fläckar. L. e. wingsp. $1\frac{3}{4}$ — $1\frac{15}{16}$ t.

Syn. *Papilio ligea* Lin. F. S. 275. 1050. Fabr. E. S. III. 4. 234. 732. Hübn. Pap. t. 49. f. 225. 226. 227. *Hipparchia* Orhs. Schm. I. 1. 283. IV. 23. Treitsch. X. 1. 52. *Satyrus* Zett. Ins. Lapp. 903. 10. Godart et Duponch. Lepid. II. 96. pl. 13. f. 1. 2. *Erebia* Dalm. Pap. Sv. 81. 40. H—S. Text. I. 63.

- Var. a. { Alis posticis infra obscure-brunneis unicoloribus, ocellis 3—4 et striga alba brevi.
Bakwingarne undertill mörkbruna, enfärgade, med 3—4 oceller och ett kort, hvitt streck.
- Var. b. { Alis posticis infra obscure-brunneis, fascia fulva et striga albida longiore; Ocellis ut in priore.
Bakwingarne undertill mörkbruna med ett rödgult tvärband och ett längre hvitt streck. Ocellerne såsom hos föregående.
- Var. c. { Alis posticis infra obscure-brunneis, ad basin pallidioribus, fascia albida ornatis; ocellis obsoletis.
Bakwingarne undertill mörkbruna, wid basen blefare, tefsnade med ett hvitt tvärband; ocellerne omärkliga.
- Var. d. { Alis posticis ut in priore, sed fascia albida nulla.
Bakwingarne såsom hos föregående, men det hvita tvärbandet saknas.

Härilen förekommer i Juli och Augusti månader uti skogarne i hela Skandinavien från Skåne och sydliga Norge ända till Nord-Cap. Dock är han sällan synt i Skåne, men deremot i medelsta Sverige ganska allmän, såsom i Östergötland wid Gusum (Wahlb.) och wid Häradsåmmar (Stenhammar), äfvensom i Westmanland wid Norberg (Fredrichs.). I Wermland wid Leessjöfors (Wahlb.), och i Rappmarkerne, såsom wid Quicksjöf (Wahlb.) och omkring Torneå (Zett.) är han ganska talrik. I Norge finnes den genom hela landet såsom wid Christiania, wid Eidsberg, i

Gubbbrandsdalen, på Dovre, vid Trondhjem (Siebke) och i Finnmarken, såsom vid Alteidet, Talvig och Gamstenstind (Zett.).

Artbeskr. Antennerne ofwan ljusbruna, undertill gulagtigt grå. Palperne gulagtigt grå, undertill svartfåriga. Kroppen svart. Ryggskölden svartbrunt luden. Fötterna mörkbruna, på främre sidan gulagtigt grå.

Hanne: Vingarne svartbruna med hvita, brunnäciga fransar. De främre prydda ofwan, nära utkanten, med ett bredt, af nerverne beladt, rostrött band, hwari 3—4 oceller med eller utan hvita pupiller finnas. De twenne af dessa oceller äro hwarandra närstående, belägna i wingspetien och oftast nära det roströda bandets indre kant; de twenne öfrige, af hvilka den främre stundom saknas, stå närmare bandets yttre kant. Bakvingarne hafwa ofwan äfven ett rostrött band, hwari 3 oceller med hvita pupiller finnas; dock äro stundom twenne af dessa otidliga. Framvingarne äro undertill ljusare svartbruna, stundom med roströd anstrykning i disken och oftast hvitpudrade i främre kanten, midt för det roströda tverbandet. Detta har ocellerne såsom på öfre sidan. Bakvingarne variera såsom ofwanföre blifwit nämndt.

Honan liknar hannen, men är ljusare till färgen, och mera varierande till bakvingarnes undre sida.

Larven, som öfvervintrar och lefwer på hvarjehanda gräsarter, är kort och tjock, sammetelikt hårig, gulagtigt grå, med mörkbrun, ljust infattad rygglinea, och twenne ljusa sidolinier, samt svarta lufthål. Förvandlingen sker i Maj.

Puppen, som ligger fri på jorden eller bland gräsrötter, har svartbruna teckningar och stark punktering.

3. Gulringlade Gräs-Fjärilen (*Erebia embla* Thbg.)

Alis subdentatis, brunneo-fuscis, anticis supra ocellis 3—4 nigris, rulo circumcinctis, intra 2—4; posticis supra ocellis 3—4, rulo-circumcinctis, infra maculis duobus albis, punctisque 2—3 nigris, obsoletis, ad marginom cinereo-adpersum. L. al. exp. 50—55 millim.

Wingarne småtanbade, mörkbruna, de främre ofwan med 3—4 swarta oceller, omgifne af rödt, undertill 2—4; de bakre ofwan med 3—4 oceller, omgifne af rödt, undertill med 2 hwhita fläckar, och wid den med aftegrått pudrade utfanten 2—3 swarta, otydliga punkter. *l. c.* wingsp. $2\frac{1}{10}$ — $2\frac{1}{4}$ t.

Syn. *Papilio embla* Thunb. Diss. Ins. Sv. 2. 38. f. 8. 8. (fig. incorr.) *Quens.* Act. Holm. 1794. 4. t. 9. f. 4. 2. (fig. incorr.) *Hipparchia* Ochs. Schm. 1. 4. 287. IV. 23. *Treitsch.* X. 4. 54. (excl. syn. Auctor. Pap. grieca et disæ). *Erebia* Dalm. Pap. Sv. 82. 42. II—S Text 1. 64. *Satyrus* Zett. Ins. Lapp. 904. 12. *Papilio ethus* Fabr. E. S. III. 4. 247. 680. Pap. *dioxippe* Hübn. Pap. t. 105. l. 538. 539. *Satyrus* Godart et Duponch. Suppl. 1. p. 230. pl. 36. f. 4. 2.

Denna, så widt man hittills känner, för Sverige egenomliga art håller sig på lägre belägna trakter i de nordliga landskapernes nedre skogregion, men icke uti egentliga fjärr. Flygtiden infaller i Juni och Juli månader. Den sydligaste provins, hwarest arten förekommer, lär wara Dalarne, der den af Quensel blef funnen wid Serna och Elfdalen. I Lappmarkerne är den träffad på följande ställen: wid Bastu träsk nära Juktån (Wahlb.), och Lycksele (Zett.) i Umeå Lappmark; wid Jockmo och Storsand i Luleå Lappmark (Wahlb.); wid Jusfjärvi (Zett.) och Öfre Torned (Wahlb.) i Torned Lappmark. På sednare stället skall den wara ganska allmän. Den skall äfwen wara funnen wid Kareluando af Grape. Öfta hwilar den sig på trädstammarne.

Artbeskr. *) Antennerne ofwan bruna med hwhita ringar, undertill hwhitagtiga med bruna ringar. Klubban rödgul med brun-

*) *Descr.* Antennæ supra dilute brunneæ annulis albis, infra albidæ annulis brunneis. Clava fulva apice brunneo. Palpi, fascies et thorax dense brunneo-hirsuti. Abdomen supra obscurius, infra dilutius fuscum pilis brevibus obsitum. Pectus fusco-hirsutum. Pedes flavidi.

Mas. Alæ supra brunneo-fusæ, omnes prope marginem anteriorem circulis 3—4, invicem plus minus separatis, rufis-fulvis, in quibus ocelli nigri, alarum anticarum maximi, sæpissime albo-pupillati, adsunt; ocellus

agtig spets. Palper, antenner och ryggsköld starkt brunludna. Abdomen ofwan mörkare, undertill ljusare brun, forthårig. Bröfvet mörkbrunt ludet. Fötterna rödgulagtige.

Hanne: Vingarne ofwan mörkbruna, hvardera med 3—4, nära utfanten belägne, rödgula ringar, hwari finnas swarta, stundom på framvingarne hwitpupillerade oceller, af hwilka de som finnas på upprämnade wingar äro störst, isynnerhet den främsta, som har dubbel pupill. Framvingarne äro undertill lifaledest mörkbruna med 2—4 oceller, af samma form och färg, som öfre sidans; wingspetsarne pudrade med assegrått. Bakvingarne undertill mörkare bruna än framvingarne, i utfanten gråpudrade och med 2—3 otydliga swarta punkter, motsvarande lifa många af öfre sidans oceller; öfwer difsen går ett otydligt och matt vågigt, brunt streck, bakom hvilket en fläck finnes i wingens främre fant och en annan i difsen. Fransarne äro brunagtigt grå med bruna fläckar.

Honan skiljer sig från hannen deri, att grundfärgen är ljusare brun och bakvingarne på undre sidan längs utfanten mera gråpudrade. Stundom, ehuru sällan, hafva äfwen framvingarne på undre sidan en femte, liten och otydlig ocell nära infanten och bakvingarne på samma sida en tydlig rödgul ring omkring en eller annan af de swarta punkterna.

primus anticarum reliquis major, interdum pupillis duobus albis præditus. Alæ anticæ infra brunneo-fuscæ ocellis 2—4, ut in pagina superiore coloratis formatisque, et apicibus cinereo-adspersis. Alæ posticæ infra obscure brunneo-fuscæ margine exteriori cinereo-adperso, punctisque 2—3 nigris, ocellis paginæ superioris respondentibus; in disco striga obsoleta, undulata brunnea et pone illam macula alba ad marginem anticum et alia in medio. Fimbria brunneo-grisescens maculis fuscis.

Femina colore dilutior et margine exteriori alarum posticarum infra densius atque latius cinereo-adperso a mare differt. Alæ anticæ in pagina inferiore ocellum quintum minutum et obsoletum prope marginem interiorem, et posticæ in pagina eadem circulum rufo-sulvum obsoletum circum punctum unum l. alterum nigrum interdum, quamvis rarissime, gerunt.

4. Svartstreckade Gräs-Fjärilen (*Erebia disa* Thbg.)

Alis subdentatis brunneo-fuscis, anticis utrinque ocellis 4—5, rufo circumcinctis; posticis supra unicoloribus, infra griseo-einereis fascia media lata, dentata strigaeque arcuata fuscis. L. al. exp. 50—53 millim.

Wingarne småtandade, mörkbruna; de främre på båda sidor med 4 oceller, omgifne af rödt; de bakre ofwan enfärgade, undertill mörkt afsegrå med ett bredt, tandadt brunt band och ett höjdt streck af samma färg. L. e. wingsp. $2\frac{1}{16}$ — $2\frac{3}{16}$ t.

Syn. *Papilio disa* Thunb. Diss. Ins. Sv. 2. 37. *Satyrus* Zett. Ins. Lapp. 904. 43. *Erebia* H—S. Text. 1. 64. *Pap. griela* Fabr. E. S. III. 4. 236. 237. Hüb. Pap. t. 49. f. 228. 229. *Pap. steno* Hüb. t. 409. f. 561. 562. *Pap. gesion* Quensel. Act. Holm. 4794. 270. t. 9. f. 5. 6. (fig. incorr.) *Erebia embla* var. b. Dalm. Pap. Sv. 82. 42. *Erebia embla* Boisd. Icon. 462. p. 8. t. 33. f. 1—3. *Satyrus* Godart et Duponch. Lapid. Suppl. t. 232. pl. 36. f. 3. 4.

Denna art tillhör de stora färren och myrorna uti Sveriges nordliga landskaper, der den förekommer under Juni och Juli månader. I Umeå Lappmark är den funnen allmän emellan Sorsele och Moskenoie (Wahlb.) och wid Wosmsjön (Zett.), samt i Tornedå Lappmark wid Juckasjärwi och Enontekiö (Zett.). Den besöker ofta blommorna af *Rubus chamæmorus*.

Artbeskr. *). Antennerne ofwan bruna med hwhita ringar, undertill gulagtiga, äfvensom hela klubban. Palper, ansigte och

*) *Descr.* Antennæ supra dilute brunneæ annulis albis, infra flavidæ. Clava tota flava. Palpi, fascies et thorax dense brunneo-hirsuti. Abdomen supra obscurius, infra dilutius fuscum. Pectus fusco-hirsutum. Pedes flavo-albidi.

Mas. Alæ supra brunneo-fusæ, subnitentes; posticæ unicolores, sed anticæ in margine anteriore et in apice cinereo adpersæ et prope marginem exteriorem maculis 4—5 nigris, rotundatis, unaquaque circulo lato, rufo, cum proximo suo conjuncto, circumcincta. Harum macularum anticæ sunt approximatae; omnes tamen pupillis carent. Alæ anticæ ut in

rhggffölb tätt brunludna. Abdomen ofwan mörkare, undertill ljusare brun. Bröflet svartbrunt, ludet. Fötterne hvitgula.

Hanne: Vingarne ofwan mörkbruna, något glänsande; de bakre enfärgade, men de främre längs framkanten och i spetsen pudrade med grått, samt nära utkanten pryddes med 4—5 svarta fläckar, hvardera omglöven af en rödgul, bred ring, som sammanhänger med sin närmaste. De tvänne främsta af dessa fläckar äro hvarandra närstående, men alla utan pupiller. Undertill hafva framvingarne samma grundfärg och teckning som på öfre sidan, men äro snedt öfver wingspetsen och längs utkanten gråpudrade samt pryddes med mindre oceller. Bakvingarne äro på samma sida mörkt askegrå, eller på brun botten tätt gråpudrade, och hafva öfver disten ett brunt utåt och inåt mörkt begränsadt, tandadt band, samt midt emellan detta och utkanten ett vågigt tvärgående streck af samma färg. Granarne äro på båda sidor smutsfigt hvita med bruna fläckar.

Honan ställer sig från hannen genom ljusare brun färg ofwan och nedan, samt ljusgulare ringar omfring ocellerne på framvingarne.

5. **Fjellgräs-Fjärilen** (*Erobia manto* Fabr.)

Alis integris nigro-luscis, anticis supra fascia maculari ferruginea plus minus distincta, utrinque punctis 2—4 nigris; posticis supra aut unicoloribus, aut punctis 1—3 nigris, infra cinerascens fascia transversa, dentata saturatiori in disco.
L. al. exp. 43—49 millim.

pagina superiore, ita in inferiore coloratæ, in apice tamen et in margine exteriori cinereo adpersæ, et ocellos minores gerunt. Alæ posticæ in pagina inferiore sunt griseo-cinereæ l. in colore brunneo-fusco dense cinereo-adpersæ, et in disco fasciam latam, extra et intra obscure marginatam et dentatam, fuscam et in medio inter hanc et marginem anteriorem strigam, transversam arcuatam undulatamque ejusdem coloris gerunt. Fimbria utrinque sordide alba, fusco-maculata.

Femina a *mare* colore utrinque dilutiore et ocellis alarum anticarum circulis flavidioribus circumcinctis tantum differt.

Wingarne helbräddade, svartbruna, de främre ofwan med ett af fläckar bestående, mer eller mindre tydligt, rostfärgadt band och på båda sidor 2—4 svarta punkter; de bakre ofwan antingen enfärgade, eller med 1—3 svarta punkter; undertill gråagtige med ett mörkare, tandadt tverband öfver diffen. L. e. wingsp. $1\frac{3}{16}$ —2 t.

Syn. *Papillo manto* Fabr. E. S. III. 4. 234. 722. Hüb. Pap. 1. 45. f. 207. 208. t. 401. f. 542. 543. 544. *Hipparchia* Ochs. Schm. 1. 4. 296. IV. 23. *Erebia* Dalm. Pap. Sv. 82. 44. H—S. Text. 4. 59. *Satyrus* Zett. Ins. Lapp. 903. 41. God. et Dup. lepid. II. 425. pl. 47. f. 7. 8. *Pap. lappona* Thunb. Diss. Ins. Sv. 2. 37. f. 66. *Pap. erina* Fabr. E. S. III. 237. 739.

Denna art, som aldrig träffas i subalpinsta trakter, är allmän i hela Norrige och inom Sverige från och med norra Dalarne ända till Nord-Cap. På alla fjellplateauer i Lappland, serdeles wid Quicksjöck, är den ganska allmän i Juni och Juli månader. I Norrige går den ända ned till Christiania.

Artbeskr. Antennerne gråhvita med ljusbrun eller brungul flubba. Palperne ljusbruna, ludna. Bröst och mellanhugg framtill ljusbrunt, men för öfrigt mörkbrunt ludne. Abdomen ofwan mörkbrun, undertill gulagtig, eller hvitgrå, korthårig. Fötterna mer eller mindre gråagtige.

Samme: Wingarne helbräddade, ofwan svartbruna, glänsande, slundom, isphinnerhet hos sådana exemplar, som flugit en längre tid, ljusare bruna. De främre hafwa mot utkanten ett rostfärgadt, mer eller mindre tydligt, bredt band, deri vanligen 4, mera sällan blott 2, svarta med gulagtiga ringar omgifne, pupiller, saknande ocelliska punkter, finnas, hvaraf de twenne främsta äro hwarandra närstående. Bakwingarne hafwa slundom mot utkanten 2—3 svarta punkter, hvilka hwardera högst sällan är omgifne af en rostfärgad ring. Undertill äro framwingarne i hela diffen rostfärgade, i främre och yttre fanten blåagtigt grå, längs indre fanten brunagtiga, och hafwa svarta punkter motsvarande öfre sidan. Wingarnes fransar äro hvitagtiga. Bakwingarne äro undertill wid basen starkt grå

lubna, men till färgteckningen för öfrigt på följande sätt varierande:

1. Bakvingarne blåagtigt-afsegrå med ett af tvenne taggiga, mer eller mindre tydliga, bruna linier inneslutet mörkare band öfver diffen, och för öfrigt öfverströdda med brunagtiga atomer.
2. Lif föregående, men har wid httre kanten 1—3 swarta punkter.
3. Bakvingarne enfärgadt gråbruna med ett af tvenne taggiga, bruna linier inneslutet mörkare tværbånd öfver diffen, och wid roten hvitagtiga.
4. Lif närmast föregående, men med blott en taggig, stundom omärklig brun linie öfver diffen och 1—3 swarta punkter nära utkanten.

Sonau liknar till färgen hannen, utom deri, att bakvingarne öfver sidan är mera gulgrå. Dock är hon till desamma vingars teckning underkastad samma variationer som hannen.

II. Trib. Nymphalides. BOISD.

Pedes tantum quatuor postici gressorii, antici 2 spurii, breves, debiles, sæpius pilosi.

Cellula discoidalis alarum posticarum plano aperta l. costa transversa subspuria, tenui, aut abrupta aut continua clausa. Collula anticarum aut costa abrupta semiclausæ, aut costa tenuissima, spuria, plano clausa.

Margo anticus alarum anticarum costis 2 et ramulis duobus tertiæ, l. costis 3 et ramulo uno quartæ, nempe ramulis duobus l. tantum uno costæ alarum septimæ et costis 8—9, l. 8—10, exdantitur.

Costæ alarum posticarum semper 9; 4 o trunco communi cum 2—4 egrediens, ramulum breviorum l. longiorum, rectum l. arcuatum in lobum basalem emittens; 8—9 o basi egre-

dientes; anticearum aut 9 aut 10 (7 tri- l. quadri-ramosa)
ad basin semper invicem æquales; 4 o basi egrediens.

Alæ posticæ pro receptione abdominis canaliculatæ.

Larva cylindrica, aut ramoso-spinosa, aut tuberculis carnosus,
spinas mentientibus, obsita.

Pupa turborculata, apico anali suspensa.

Fötterne: blott de fyra bakre äro gångfötter; främsta paret korta,
rudimentära, oftast hårlige.

Distfäktet på bakvingarne alldeles öppet eller ock tillslutet af en
falsk, fin, antingen afbruten, eller continuerlig tververv. De
främre distfäkt antingen halsslutet genom en afbruten tververv,
eller ock fullkomligt slutet medelst en fin, falsk nerv.

Framkanten af framvingarne hålles utstränd genom 2 nerver och
2 grenar af en tredje eller genom tre nerver och en gren af
en sjerde, nemligen genom en eller två grenar af 7:de wing-
nerven och genom 8:de och 9:de eller 8:de—10:de nerverne.

Nerverne på bakvingarne alltid 9: den 1:sta utgående från gemen-
sam stam med den 2:dra—4:de och utsträndande en längre
eller kortare, rät eller krökt gren åt wingens rotlob; 8—9 ut-
gående från basen. De främre antingen 9 eller 10 (7:de tres-
eller ihrgrenig), wid basen finsemellan likformige; den 1:sta från
basen af wingen.

Bakvingarne för abdomens upptagande bildande en ränna medelst
indre kantens nedböjning.

Parven cylindrisk, antingen med greniga taggar, eller försedd med
föttiga utvexter, som lifna taggar.

Pupan kantig, fasthängande med analtaggen.

Största delen af hithörande arter hafwa en fladdrande och tem-
ligen snabb flygt, samt lefwa såsom larver på lägre dicotyledo-
ner. Högst få angripa trädens löf. Färgerne hos fjärilarne äro
hufvudsakligen svart och rödgult, sällan hvitt på wingarnes
öfre sida.

Gruppens till vår Fauna hörande genera funna på följande sätt följäs från hvarandra:

- A. { Cellula discoidalis alarum posticarum plano aperta.
 { Distfältet på bakvingarne alldeles öppet.
1. { Costæ alarum anticarum 10 } **Limenitis.**
 { Nerverne på framvingarne 10 }
2. { Costæ alarum anticarum 9. } **Melitæa.**
 { Nerverne på framvingarne 9. }
- B. { Cellula discoidalis alarum posticarum costa spuria clausa.
 { Distfältet på bakvingarne slutet genom en falsk tvärvärv.
1. { Costæ alarum anticarum 9—10; costa }
 { transversa sat distincta, subcrassa. } **Argynnis.**
 { Nerverne på framvingarne 9—10; tvär- }
 { nerven ganska tydlig, temligen stark. }
2. { Costæ alarum anticarum 10; costa trans- }
 { versa plus minus evanescens, tenuis. } **Vanessa.**
 { Nerverne på framvingarne 10; tvärvärv- }
 { ven mer eller mindre jörfvinnande, fin. }

Släktet: **Limenitis.** FABR. OCHS. H—S.

Antennæ longiores, rigidæ, extrorsum crassiores. Clava gracilis, oblonga, cylindrica, indeterminata, a scapo non distinguenda.

Palpi breves, longitudinem capitis vix superantes, supra et infra brevius pilosi, ad latera squamati, apicibus divergentibus, triarticulati. Articulus medius longissimus, compressus, latus articulus; ultimus haud angustior, brevissimus (primo brevior), conoideus apice obtuso.

Oculi nudi.

Pedes antichi graciles, feminae longiores nudi, maris pilis brevibus ciliati, tarsibus inarticulatis. Femora ceterorum, præsertim posticorum, infra propo basin brevo hirsuta; tibiæ

dentibus parvis et ad apicem spinis duabus brevibus instructæ; articulus tarsorum primus tertio et quarto conjunctis longitudine æqualis.

Alæ posticæ dentatæ. Cellula discoidalis alarum posticarum plane aperta, anticarum costa spuria clausa.

Costæ alarum posticarum 9: 1—4 e trunco communi superiori (prima ramulum longiorem, valde reflexum *) in lobum basalem omittens), 5—7 e trunco communi inferiori, 8—9 e basi egredientes. Cellulæ discoidalis exitus inter costam 4 et 5, vestigium costæ transversæ non ostendens. Costæ alarum anticarum 10 ut in genere *Vanessa*, costa tamen octava cum septima, triramosa, ex eodem loco anguli cellula egreditur. Cellula ipsa inter costam 4 et 5 costa spuria tenuissima clausa.

Antennerne långa, ihjwa, utåt tjofåre. Klubban smal, aflång, cylindrisk, obestämd, från fästet icke urfällbar.

Palperne korta, knappt öfvergående hufvudets längd, ofwan och undertill forthåriga, på fidorne fjälliga, med divergerande spetsar, treledade: medlersta leden längst, sammantryckt, bred; sista leden föga smalare, ganska kort (kortare än den första) konisk med trubbig spets.

Ögonen nakna.

Fötterna: de främre smala, hos honan längre och nakna, hos hannen cilierade med korta hår, tarserne oledade. De öfriges låra, isynnerhet de bakre, undertill nära basen forthåriga; tibierne försedde med korta tänder och tvänne korta sporrar i spetsen; tarsernes första led lifa lång med den 3:de och 4:de tillsammantagna.

Wingarne: de bakre tandade. Diffältet på bakwingarne alldeles öppet, på framwingarne slutet medelt en falsk tvärrerv.

Nerverne på bakwingarne 9: 1—4 utgående från öfre nervstammen (den första utgående åt rotloben en mycket bakåtböjd, längre gren), 5—7 från nedre nervstammen, 8—9 från wing-

*) Arcuatus, apice marginem anteriorem spectans.

basen. Utgången för distfältet är emellan 4—5 wingnerberne och visar ej spår till tvernerb. Framwingarne's nerber 10 såsom hos genus Vanessa, men den 8:de utgår från samma ställe i hörnet af distfältet som den 7:de, hwilken är tregrenig. Sjelfwa distfältet är slutet af en ganska fin, falsk, tvernerb.

Äf detta slägte finnes på vår halfö endast en art, hwilken isynnerhet har sitt tillhåll uti Åspångarne uti Sveriges medlersta och södra provinser:

Asp-Fjärilen (*Limenitis populi* Lin.)

Alis dentatis, supra nigro-fuscis, anticis albo maculatis, posticis albo fasciatis; infra luteis albo maculatis fasciatisque, marginibus coerulescentibus. L. al. exp. 75—85 millim.

Wingarne småtandade, ofwan svartbruna, de främre hvitfläckige, de bakre med ett hvitt tverband; undertill rödgula med hvita fläckar och band, äfvensom blåagtiga utfanter. L. e. wingsp. $3\frac{1}{16}$ — $3\frac{3}{8}$ t.

Syn. Pap. *Populi* Lin. F. Sv. 277. 4055. Fabr. E. S. III. 4. 444. 343. Hüb. Pap. t. 23. f. 108.—110. *Limenitis* Och. Schm. I. 4. 145. IV. 48. Dalm. Pap. Sv. 64. 1. *Nymphalis* God. et Dup. Lepid. I. 412. pl. 6. secund. f. 4. 2. *Limenitis* II—S. I. p. 43.

Denna vackra art, en af de största till vår Fauna hörande dagfjärilar, förekommer i Juni, Juli och Augusti månader i sådana trakter der aspträäd finnas i närheten af sumpiga ställen. Dock träffas den ingensstädes i synnerlig mängd. Inom Sverige är den funnen i Skåne wid Esperöd, Råsten m. fl. st.; i Westergöthland wid Gusum (Wahlb.); i Östergöthland wid Håradshammar (Stenb.); i Westmanland wid Norberg (Fredrichs.). Inom Norge är den blott träffad i de sydligaste orterne t. ex. wid Christiania, Tönsberg, Krogstad, Krydscherred m. fl. st. (Siebke). Således synes den upphöra omfr. 60 eller 61 grad. nordl. polhöjd.

Artbeffr. Antennerne svartbruna i spetsen rödgulgtiga. Palperne hvitgrå, långt öfre och undre sidan mörkbruna. Ögonen bruna. Ansigtet gråsludet. Hufsan och ryggskölden mörkt brunsludne; äfvenså abdomen ofwan, men undertill är den grå-

agtig. Bröflet grått. Låren hwitagtige. Tiblierne och tarferne ljusbruna.

Hanne : Wingarne ofwan svartbruna med obetydlig glans. Långs utfanterne löpa tvenne grönagtige eller blåagtige smala strimor, stilda genom en svartagtig. Närmast desä finnes på framwingarne en rad otydliga, men på bakwingarne starkare markerade och större swarta fläckar, i hvilka på de sednare stå rödgula halsmånar, som wända spetsarne mot utfanten. Otydligt rödgult finnes äfwen i framwingarnes swarta fläckar. Mot spetsen af sistnämnde wingar finnes en böjd rad af 3—4 hwita fläckar, och derpå följer twerä öfwer wingen en slingrande rad af 6 andra större och mindre fläckar, hvilka antingen äro rent hwita, eller ock mer eller mindre brunpuvade. I distfältet synes en mer eller mindre tydlig, aflång, hwit eller gråagtig fläck, som lifwäl stundom helt och hållet saknas. Öfwer bakwingarne går ett twerband af 7 hwita fläckar, stilda från hwarandra genom de bruna nerverne. Stundom äro desä helt små, stundom hafwa de anseelig storlek. Undertill äro alla wingarne rödgula; de främre lifwäl i indre hälften (närmast infanten) svartagtige. Utfanterne äro swarta med tvenne blåagtigt gröna band. De hwita fläckarne hafwa på framwingarne samma läge som på öfre sidan, men äro större och stundom stuggade med blå färg. Wingroten på samma wingar är blåagtigt grå och har swart gräns, lifsom den hwita distfläcken. Bakwingarnes rot och indre kant är bredt blågrå och en fläck af samma färg finnes i distfältet och nära utfanten. Det hwita twerbandet är större, än på öfre sidan, och inåt och utåt begränsadt med swart. Nära utfanten finnes en rad swarta fläckar.

Honan lifnar hannen, men har oftast det hwita twerbandet på bakwingarnes öfre sida bredare.

Larven, som lefwer af bladen på *Populus tremula*, har hårda tornar på kroppen, af hvilka tvenne närmast hufwudet äro längre än de öfriga. Hufwudet är swart med ett rödbrunt längstreck i midten. 4, 6, 8 och 9 kroppsringarne äro rödbruna, de öfriga

gröngula med brun och svart fluggning. 5 och 6 kroppsringar har på hvardera sidan en med svart afdelad fläck. Dupan är grön med brun fluggning och svarta punkter. Bafom bröstregionen finnes en bilformig, brungul utväxt.

Släktet: *Melitæa*. FABR. et AUCT.
(*Argynnis* LATR.)

Antennæ longiores, graciles. Clava subturbinata l. pyriformis apice rotundate, in speciminibus exsiccatis excavata.

Palpi capite plerumque longiores, adscendentes apicibus divergentibus, triarticulati. Articulus medius compressus, maximus, hirsutissimus; articulus ultimus basali longitudine æqualis, gracilis, brevius ac adpresse hirsutus.

Oculi nudi.

Pedes aulici tenuos, feminæ longiores nudiusculi, maris pilosi, tarsibus biarticulatis; femora ceterorum infra parco et breve pilosa; tibiæ dentibus rigidis instructæ et ad apicem spinis duabus longis, subvalidis armatæ; tarsi 5-articulati: articulus primus longissimus, secundo et tertio, etiam sæpe quarto conjunctis longitudine æquans; secundus et tertius invicem æquales, quartus brevissimus omnium, quintus tertio quartoque conjunctis æqualis unguibus 4 minoribus armatus.

Alæ subdenticulatæ. Cellula posticarum plano aperta, anticarum plerumque semiclausæ.

Costæ alarum posticarum 9: 1—4 o trunco communi superiore (costa prima ramulum aut rectum aut reflexum in lobum basalem emittens) 5—7 o trunco inferiori, 8—9 o basi egredientes. Cellulæ exitus inter costam 4 et 5. Costæ alarum anticarum 9: 1:ma o basi, 2—4 o trunco communi in-

teriore, 5 o costa transversa, 6—8 e trunco superiori (6 et 7 e angulo cellulae, haec quadriramosa) et 9 o basi egredientes. Costa transversa, cellulam discoidalem claudens, inter costam 4 et 5 plerumque abrupta, rarius continua tenuissima, vario tamen modo formata *).

Antennerne långa, smala. Klubban pärenformig, (inåt spetsig, utåt bred) med afrundad spets, hos torfade exemplar urhollad.

Palperne merendels längre än huvudet, uppåtsligande, med divergerande spetsar, treledade: medlersta leden hoptryckt, störst, ganfsta hårig; sista leden lika lång med första, smal, kort och tilltryckt hårig.

Ögonen nakna.

Fötterna: de främre smala, hos honan längre och nästan nakna, hos hannen ludna, tarfene tvåledade; de öfrigas låar undertill sparsamt förhåriga; tibiaerne försedde med utsperrade tänder och i spetsen beväpnade med 2:ne långa, temligen starka sporrar; tarfene femledade: 1:sta leden längst, lika lång med 2:dra och 3:dje, ofta äfwen med 4:de tillfammantagne; 2:dra och 3:dje flödemellan lika, 4:de kortast, 5:te lika lång med 3:dje och 4:de tillfammantagne och beväpnad med 4:ra mindre flor.

Wingarne: obetydligt tandade. De bakres diffjäلت alldeles öppet, de främres merendels halfslutet.

Nerverne på bakwingarne 9: 1—4 utgående från öfre nervstammen (1:sta sändande åt rotloben en rät eller bakåtböjd gren), 5—7 från nedre nervstammen, 8—9 från basen. Diffjäلتets utgång är emellan 4—5 nerven. Framwingarnes nerver 9: 1:sta, utgående från basen, 2—4 från nedre nervstammen, 5:te från tvvernerven, 6—8 från öfre nervstammen (6 och 7 från hörnet af diffjäلتet, den sednare fyrgrenig), 9:de från basen. Tvvernerven, som tillsluter diffjäلتet, är merendels afbruten emellan 4:de och 5:te nerven, sällan continuerlig och ganfsta fin, men på olika sätt formad *).

*) Tabula formam costarum transversarum alarum anticarum exhibens:

A. Cellula discoidalis alarum anticarum clausa; costa transversa inter costam 4 et 5 continua etsi tenuissima M. *matura*.

De flesta till detta slägte hörande arter föredraga öppna ängar, isynnerhet jädane, som äro af mera sbländt bestäffenhet. Några så träffas på torrare lokaler och endast en i stogarne. De förekomma blott i en generation om året och hafwa temligen snabb flygt. Larven är beklädd med kottiga, tornlika utvexter och lefwer på lägre wexter, sällan på träd; alltid i större eller mindre sällskap.

1. Boke-Nätsjärilen (*Melitæa maturna* Lin.)

Alis supra fuscis maculis flavis et fulvis, proprio marginem exteriorum fasciam formantibus; anticis infra fulvis maculis albis evanescentibus; posticis infra fasciis tribus flavido-albis, media linea nigra longitudinali divisa. L. al. exp. 45—50 millim.

Wingarne ofwan mörkbruna med ljustgula och rödgula fläckar, hvilka nära utfanten bilda ett tverband; de främre undertill rödgula med hvita försvinnande fläckar; de bakre undertill med trenne hvitgula tverband, det medlersta beladt medelst en långgågående svart linea. R. e. wingsp. 1^{13}_{16} — 2^{1}_{16} t.

Syn. *Papilio maturna* Lin. F. Sv. 280. 1062. Ochs. Schm. I. 4. 18. IV. 13. *Melitæa maturna* Dalm. Pap. Sv. 74. 4. Boisd. Leon. p. 410. pl. 23. f. 3. 4. Zett. Ins. Lapp. 809. 4. Godart et Duponch. Lepid. Suppl. I. 135. pl. 22. f. 1—3. II—S. Text. I. 20. t. 29. f. 132. *Pap. cynthia* Hübner. Pap. t. 1. f. 1. 2. et *mysis* Text. p. 5. n. 1.

Obs. *M. maturna* i Suecia inferiore (Scania et Blekingia) non in Lapponia occurrit, qua de causa figuræ Hübneri 598—601 ad eam referri non possunt, ut voluerunt Auctores.

B. Cellula discoidalis alarum anticarum semiclausæ: costa transversa (plerumque inter costam 4 et 5) abrupta.

1. Costa transversa inter costam 5 et 6 fortiter arcuata *M. iduna*.

2. Costa transversa inter costam 5 et 6 acute angulata *M. artemis*.

3. Costa transversa inter costam 5 et 6 recta l. $\left\{ \begin{array}{l} M. delia \\ M. athalia \\ M. dictynna \end{array} \right.$
modice arcuata

Denna fjäril är en af våra sällsyntare och tillhör så widt hitills med säkerhet blifwit utrönt endast Sveriges sydligaste provinser, der jag träffat honom i Skåne wid W. Wramb i Juli och i Blekinge wid Sölvesborg i Augusti månad. På båda dessa ställen förefinner han i boskott. Ofta hwilar han sig på bokarnes blad, helst de buskartades. Wid Lund är han af Prof. Zetterstedt funnen i Nästen. På Gottland skall han också wara träffad (Vyth. Zett.). I Norge finnes han icke, så widt jag wet.

Artbeskr. Antennerne bruna, undertill rödgulagtiga, ofwan fint hwitringlade. Klubban med gul spets. Palperne ofwan svartbruna, undertill hwitgult ludne. Naggskölden, äfvensom abdomen ofwan, svart med bruna, på den sednare glesa hår. Abdomen undertill hwitgul. Analborsten hos hannen rödgul. Fötterne rödgulagtiga.

Hanne: Vingarne ofwan mörkt bruna, nästan swarta; de främre med ett bredt tverband af 3:ne rader olivflora, ljuëgula och rödgula fläckar nära utkanten och andra fläckar af samma färg spridda i diffen. De fläckar som bilda medlersta raden i tverbandet äro störst och alla rödgula; de öfriga äro till större eller mindre antal ljuëgula. Såsom förhöjning af framvingarnes tverband går ett dylikt öfver bakvingarne och består af tvenne rader fläckar, af hvilka de som tillhöra indre raden äro störst och alla rödgula, de öfrige ljuëgula. Merendels finnes innanför detta tverband anordning till en tredje rad. I diffen af bakvingarne finnas äfvenledes spridda rödgula och ljuëgula fläckar. Undertill äro framvingarne rödgula eller orangevärgade med svart teckning i diffen och tverstreck af samma färg; nära vingspetsen och längs utkanten finnas ljuëgula eller hwitgula fläckar, af hvilka de sednare inåt begränsas af svart. Bakvingarne äro undertill rödgula med 3:ne hwitagtiga tverband: det första närmast roten afbrutet och bestående af 3—5 med svart omgifne olivformige fläckar; det 2:dra öfver midten, inåt och utåt svart begränsadt och på längden deladt genom en afbruten svart linea; det 3:dje nära utkanten, bestående af halfmånformiga, svart be-

gränssade fläckar. Längs fransarne, som äro hvita med svarta fläckar, löper på wingarnes undre sida en svart linea.

Honan är större än hannen och har wanligen tverbandet på wingarnes öfre sida bredare än denne.

Parven, som har på kroppen föttiga utväxter, lifnande tornar, är svart med en dubbel rad gula punkter längs ryggen och en annan enkel längs hvardera sidan. Han lefwer företredelvis på boketrädets blad, samt på åtskilliga pilarter. Med *Plantago* och *Scabiosa* låter han äfwen uppsöda sig. I slutet af Maj eller början af Juni blir han pupa, sedan han öfvervintrat. Denna är grönagtigt hvit med svarta punkter och streck samt har på abdominalregionen 7 rader gula, knappformiga taggar.

2. Lappska Nätfjärilen (*Melitæa iduna* Dalm.)

Alis supra nigro fuscis, fasciis maculariis albis et obscure fulvis; anticiis infra ut in parte superiore coloratis, posticiis fasciis tribus albis maculariis nigro-marginatis, omnibus impunctatis. L. al. exp. 35—40 millim.

Wingarne ofwan svartbruna med hvita och mörkt rödgula fläckar, som bilda tverband; de främre undertill lifa öfre sidan, de bakre med 3:ne tverband af hvita, svartbegränsade fläckar, och sakna svarta punkter. L. e. wingsp. $1\frac{7}{16}$ — $1\frac{5}{8}$ t.

Syn. *Melitæa iduna* Dalm. Pap. Sv. 75. 2. Zett. Ins. Lapp. 900. 2. Godart et Duponch. Lepid. Suppl. I. 300. pl. 48. f. 3. 4. II—S. Text. I. p. 21. Pap. *maturna* Hübn. t. 117. f. 598. 599. 600. 601. Text. p. 5.

Denna sällsynta och för vår Fauna egenomliga fjäril finnes endast i nordligare delar af Sveriges Lappmarkerne, der den i närheten af Quicksjöfved näst blifvit i mängd funnen af Prof. Wahlberg på en med fort gräs bevuxen ångskulle uti Njunnas dalen. Den iblgitid infaller i medio (omkring den 18:de eller 20:de) af Juli månad,

Artbeskr. *). Antennerne ofwan swarta med hwhita lebasdelningar; undertill rödgulagtige. Klubban swart mot spetsen rödgul. Palperne rödgula, undertill med swarta och rödgula hår. Kroppen swart, med längre och kortare hår af samma färg. Abdomen undertill wid anus rödgul. Fötterna rödgula.

Saune: Vingarne ofwan swarta, med fyra af fläckar bestående tverband, af hwilka hwarannat är rödgult och hwarannat hwhitt, dock så att ett rödgult är närmast utfanten. Emellan det indre hwhita tverbandet och diffäktet på framvingarne finnes en hwhit, stor fläck, som delas genom nerverna; emellan diffäktet och indre kanten finnes en annan af samma färg; i sleswa diffäktet synas tvenne rödgula och merendels lika många hwhita fläckar. I midten af bakvingarne finnas äfwen rödgula fläckar. Framvingarne, som wid basen äro swarta, hafwa undertill

***) Descr.** Antennæ supra nigræ articulis albis; infra fulvidæ. Clava nigra, versus apicem fulva. Palpi fulvi, infra nigro fulvoque barbati. Corpus nigrum, pilis longioribus et brevioribus ejusdem coloris obsitum. Abdomen infra versus anum fulvum. Pedes fulvi.

Mas. Alæ supra nigræ l. nigro-fascæ; fasciæ quatuor maculares, alternatim fulvæ et albæ; fascia fulva tamen margini proxima. Inter fasciam internam alarum anticarum albam et cellulam discoidalem est macula magna alba, costis transeuntibus nigris divisa; inter cellulam et marginem anteriorem macula altera ejusdem coloris; in cellula ipsa maculæ duæ fulvæ et plerumque totidem albæ observantur. In medio alarum posticarum maculæ fulvæ etiam adsunt. Alæ anticæ, quæ ad basin sunt nigræ, fasciam latam albam per medium et fascias duas fulvas tenuiores, nigro-marginatas, atera alba interjecta, infra versus marginem gerunt; cellula ipsa maculas ut in parte superiore habet. Alæ posticæ sunt fulvæ maculis albis 3—4 irregularibus, nigro marginatis, ad basin, fascia alba maculari ejusmodi nigro-marginata (rarius linea longitudinali subtilissima, subfusca divisa) in medio et altera, lunata ejusdem coloris ad marginem. Costæ alarum omnium sunt in parte inferiore nigræ. Fimbriæ fuscæ.

Femina, quæ plerumque est major, a mare maculis albis in parte superiore alarum minoribus distinguitur.

Hab. rarius in Lapponia; ad Quickjock mense Julio.

öfver midten ett bredt, hvitt tverband och närmare utkanten tvänne andra smalare, rödgula och svartkantade, mellan hvilka ligger ett hvitt; distiktet har fläckar såsom på öfre sidan. Bakvingarne äro rödgula med 3—4 oregelbundna, svartkantade, hvita fläckar wid basen, ett af fläckar bestående hvitt, lifaledes svartkantadt band (sällan längs midten deladt medelst en fin brunagtig linea) öfver midten och ett annat af samma färg wid utkanten. Alla vingnerverne äro på undre sidan svarta. Gransearne bruna.

Honan är merendels större än hannen och stlser sig från honom deri, att öfre sidans hvita fläckar äro mindre.

3. Ärenpris-Nätfjärilen (*Melitæa artemis* W. V.)

Alis supra fuscis maculis flavis fulvisquo; posticis infra fasciis tribus maculariis albido-flavis, utrinquo in fascia fulva serie punctorum nigrorum, subtus luteo-marginatorum. L. al. exp. 31—45 millim.

Wingarne ofwan bruna med ljusgula och rödgula fläckar; de bakre undertill med 3:ne af fläckar bestående hvitgula tverband, och på båda sidor med en rad svarta, undertill gulskantade punkter uti ett rödgult tverband, *L. e. wingsp.* $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{13}{16}$ t.

Syn. Pap. artemis W. V. 322. *Fabr. E. S.* III. 4. 255. 790. *Hüb. Pap.* t. 4. f. 4—6. t. 129. f. 653. *Text. p.* 6. 4. *Melitæa* Ochs. *Schm.* l. 4. 24. IV. 43. *Godart et Duponch. Lepid.* l. 71. pl. 4. secund. f. 3. pl. 4. tert. f. 3. *Dalm. Pap.* Sv. 75. 3. *Zett. Ins. Lapp.* 900. 3. *H—S. Text.* l. 22. *Pap. matutina* Thunb. *Diss. Acad.* Vol. III. 45. *Pap. maturna* Esp. *Schm.* l. t. 46. f. 2. p. 209.

Arten förekommer sporadiskt inom Sverige ända upp i Dalarne, der den i Serna socken blifwit tagen af Prof. Boheman. I Westmanland är den ej sällsynt omkring Norberg; i Östergötland är den anmärkt uti Huseby socken (Stenh.); i Småland finnes den wid Anneberg (Wm.) och på Stånes ångar är den icke sällsynt, isynnerhet i skogsstrakterne. Dess flygtid infaller i Maj och början af Juni månader. I Norrige är den icke mig weterligen träffad.

Artbeskr. Antennerne bruna med hwhita ringar. Klubban under till rödgul; spetsen ofwan af samma färg. Palperne rödgult håriga. Nyggskölden och abdomen ofwan med rödgulagtiga hår. Abdomen undertill hwhitgulagtig. bröstet gulgrått. Fötterne rödgulagtiga.

Hanne och hona: Vingarne ofwan röd- eller svartbruna med många rödgula och ljustgula, tätstående, oliformiga fläckar; de bakre med trenne af fläckar bildade tverband nära utkanten, af hvilka det indre och yttre hos hannen, men blott det sednare hos honan är hwhitgult; det sednare derjemte alltid bildadt af trefantiga, inåt något afrundade fläckar; det medlersta och bredaste är deremot hos båda könen rödgult och utgöres af fläckar, som stillas från hwarandra blott medelst de mörka nerverne och hafwa hwardera i midten en svart punkt. På undre sidan äro vingarne rödgula; de främre med talrika ljustgula, serdeles mot wingspetsen tätstående fläckar; de bakre hafwa trenne ljustgula tverband, af hvilka det första (vid roten) utgöres af 3—5 olifforma, svart omgifna fläckar; det andra, som går öfver difsen, delas genom wingnerverne i oliformiga fläckar, hvilka inåt, och mer eller mindre tydligt äfwen utåt, begränsas af svart, och det tredje, närmast utkanten, bildas af trefantiga, inåt afrundade fläckar. Mellan 2:dra och 3:de bandet finnes en tvergående rad af swarta punkter, som motsvara öfre sidans och omgifnas hwardera af en större ljustgul flek.

Varven, som är svart med ett af små hwhita punkter bestående band längs ryggen och ett annat delikt längs hwardera sidan, har förtiga tornar, af hvilka 6 stå i tverrader på de 2:ne första kroppringarne, 4 stå i fyrkant på sista, och 7 i tverrader på hwardera af de öfrige; den medlersta af dessa sednare tornar står något framom de öfriga. Näst sista kroppsringen har ännu en torne, som står midt emot den medlersta och strax bakom denne. Kroppen är undertill grå med röda fulhåfar. Längden $1\frac{1}{4}$ t. Varven, som träffas på *Scabiosa*

och *Veronica* öfvervintrar och blir på våren en ljusgul Pupa med svarta punkter och streck.

4. Hökblomster-Nätsjärilen (*Melitæa delia* W. V.)

Alis supra fulvo nigroque reticulatis; posticis subtus fasciis tribus flavo-albidis, nigro maculatis marginatisque, et duabus fulvis; posteriore nigro punctata. L. al. exp. 40—44 millim.

Wingarne ofwan nätformigt rödgula och svarta; de bakre undertill med 3:ne gulhvita, svartfläckiga och svartkantade, samt 2:ne rödgula tverband, af hvilka sednare det bakre är svartpunkteradt. L. c. wingsp. $1\frac{5}{8}$ — $1\frac{13}{16}$ t.

Syn. Pap. *delia* W. V. 179. Hüb. Pap. t. 2. f. 7. 8. Text. 6. 5. Fabr. E. S. III. 4. 251. 779. (var. *Cinxia*). *Melitæa* Dalm. Pap. Sv. 76. 4. Zett. Ins. Lapp. 900. 4. Pap. *cinxia* De Geer II. 4. 141. t. 4. f. 13—18. Ochs. Schm. I. 4. 27. IV. 13. God. et Dup. Lepid. I. 73. pl. 4. quart. f. 4. II—S. Text. I. 25. t. 56. f. 269. var. Pap. *pilosellæ* Esp. Schm. I. t. 25. suppl. 4. f. 2. p. 3. 2. *M. phæbe* God. Lepid. I. pl. 4. quint. f. 3. (Pap. *cinxia* Lin. F. Sv. 280. 1063. non certe ad hanc speciem appartenet, quamquam hoc mihi verisimile videtur).

Var. b. Alis supra fulvis maculis nigris basalibus marginalibusque; posticis parte anteriore fulvis nigro maculatis, parte posteriore flavo-albidis macula nigra inter costam 2 et 3, fascia tenuissima fulva, nigro-maculata, transversa, media, et serie nigra linearum punctorumque ad marginem.

Wingarne ofwan rödgula med svarta fläckar vid basen och i utfanten; de bakre undertill till indre hälften rödgula med svarta fläckar, till yttre hälften gulhvita med en svart fläck emellan 2—3 vingnerven, ett smalt rödgult, svartfläckigt tverband öfver midten och en rad svarta streck och punkter längs utfanten.

Syn. *Melitæa fulla* Dalm. Pap. Sv. 77. 8. secundum specimen originarium in Museo Paykullii adservatum. Pap. *fulla* Quens. Act. Holm. 1791. 279. n. 4.

Hjärilen förekommer på torra ängsbackar och beteskäld i södra och medlersta Sverige, der den tillhörer de allmännare arterne. I Skåne är han under Juni och Juli månader icke sällsynt; i Småland, Östergötland och Uppland träffas han der och hvar. Den synes icke gå så högt upp mot nordn att den träffas i Dalarna eller i norra delen af Westmanland. I Norge är den funnen wid Christiania (Siebke). Var. b. är mycket sällsynt.

Artbeskr. Antennerne bruna, hwitringlade. Klubban ofwan brun, i främre kanten och i spetsen rödgul, undertill rödgul och hwitagtig. Palperne hvita, i spetsen rödgula, undertill med grå och bruna hår. Hufvud, ryggsköld och abdomen ofwan swarta med rödgul ludd, som på de tvenne förnämnde kroppsdelarne är längst. Abdomen undertill hwitagtig. Bröflet grålubet. Fötterne rödgula. Hannens analborste rödgul.

Stämme: Vingarne ofwan rödgula med swarta vingnervver och talrika swarta, af fläckar bestående tverband, så att den swarta färgen lift ett nät intager wingarnes hela yta. Längs utkanterna är en swart borda intill de hvita och svartfläckiga fransarne. Bakwingarne hafwa uti andra raden (från utkanten räknadt) af de rödgula fläckarne swarta punkter, som likna oceller. Undertill äro framwingarne rödgula med några få swarta fläckar; wingspelsarne äro hwitgula, affskilda från grundfärgen genom en swart vågformig linea, samt hafwa innansför denna i främre kanten en fläck af samma färg; längs utkanten går en rad swarta, små punkter. Bakwingarne hafwa undertill 3:ne hwitgula, svartbegränsade och svartpunkterade, vågige tverband, samt 2:ne andra rödgula; neml. ett hwitgult med swarta punkter wid basen, dernäst ett rödgult; åter ett hwitgult öfwer midten, hwilket långsamt är teckadt med swarta fläckar; närmast detta ett rödgult, som i midten har en rad swarta punkter, motsvarande öfre sidans; slutligen wid utkanten ett hwitgult, som består af sammanhängande, halsmånformige fläckar med hwardera en swart punkt. Analhöinet är hwitgult.

Souan liknar hannen, men har den swarta färgteckningen på vingarnes öfre sida merendels gröfre och mera sammanflytande, stundom så sammanflytande, att grundfärgen synes swart.

Parven, hvilken har tornar, såsom föregående art, är swart med blåhwita, af punkter bestående ringar omkring ledafdelningarne. Hufvudet och sulhafarne äro rödbruna. (Stübner.) Den lefwer på Hieracium pilosella, Veronica och Plantago, samt öfvervintrar. Dupan har orangegula taggar och punkter.

5. Grod-blads-Nätfjärilen (*Melitæa athalia* Esp.)

Alis supra nigro-fuscis fasciis maculisque fulvis; posticis subtus fasciis tribus flavis l. flavo-albidis, impunctatis, fasciisque tribus fulvis; posteriore arcubus nigris. L. al. exp. 37—40 millim.

Wingarne ofwan swartbruna med rödgula tverband och fläckar; de bakre undertill med 3:ne ljusgula eller hwitagtige, ofläckade tverband och 3:ne andra rödgula, af hvilka sednare det baksta har en rad swarta båggar. L. e. wingsp. $1\frac{9}{16}$ — $1\frac{5}{8}$ t.

Syn. Pap. *athalia* Esp. Schm. I. t. 47. cont. 23. f. 4. a. b p. 377. *P. maturna* Esp. t. 30. Suppl. 6. f. 2. p. 325. var. Fabr. E. S. III. 1. 254.} 787. Hübner. Pap. t. 4. 17. 18. Pap. *athalia* Freyer Beitr. II. 9. p. 4. t. 49. *Melitæa* Ochs. Schm. I. 4. 44. IV. 44. et 108. Treitsch. X. 4. 7. Dalm. Pap. Sv. 76. 6. Zett. Ins. Lapp. 900. 5. Godart et Duponch. Lepid. I. p. 78. pl. 4 quart. f. 2. pl. 4 tert. f. 6. H—S. Text. I. p. 23.

Var. b. Alis posticis subtus fasciis nigro inductis; forma minor. L. al. expl. 32—35 millim.

Bakvingarnes tverband undertill något flötande i svart; mindre form. L. e. wingsp. $1\frac{6}{16}$ — $1\frac{7}{16}$ t.

Syn. Pap. *parthenie* Borkh. Schm. I. 53. 5. II. 194. 5. *Melitæa* Dalm. Pap. Sv. 77. 9. Ochs. Schm. I. 4. 48. God. et Dup. Lepid. II. pl. 9. f. 7. 8. H—S. t. 30. f. 136. 137? *P. athalia* Hübner. Pap. t. 4. 19. 20. *P. aphæa* Hübner. t. 147. f. 783. 739. *M. athalia* H—S. t. 57. f. 270—274. Zett. Ins. Lapp. 900. 5. var. b.

Var. c. Alis posticis infra basi nigro-maculatis, fascia media lineaque marginali flavis.

Bakvingarne undertill wid basen svartfläckiga med ett gult tverband öfver midten och en linea af samma färg längs utkanten.

Syn. *Melitæa hertha* Dalm. Pap. Sv. 77. 7. Zett. Ins. Lapp. 900. 6. *Papilio* Quensel. Act. Holm. 1791. 280. 8. 1. 40. f. 9. 40. (secundum specimen originarium in Museo Schönherri adservatum).

Denna är den allmänaste arten i släktet och finnes öfver allt i Sverige och Norge på fuktiga ängar under Juni och Juli månader. Var. b., som af flera Författare anses såsom en egen art, träffas, ehuru sparsamt, både i södra och norra Sverige tillsammans med den vanliga formen. Var. c. är deremot ganska sällsynt, men har blifvit funnen både i Westmanland, på Gotland och i Uppland.

Artbeskr. Antennerne ofwan mörkbruna, undertill hvitagtiga eller rödgulagtiga, oftaft otydligt hvitringlade. Palperne hvitgula med bruna spetsar, undertill brun- och gråludne. Ryggskölden med mörkbrun ludd. Abdomen ofwan svart med svarta hår, undertill hvitgulagtig. Bröfket grått. Fötterna rödgula. Hannens analborste rödgul.

Till färgteckningen på vingarnes öfre sida varierar denna fjäril betydligt, så att knappt twenne exemplar af hundra de äro hwarandra fullkomligt lika. Vingarne äro ofwan ljusare eller mörkare svartbruna med flera eller färre rödgula fläckar och i fläckar upplösta tverband. Undertill hafva framvingarne rödgul färg, dels med tydlig, dels med otydlig svart teckning, bestående af streck, punkter och fläckar. 3 wingspetsarne och stundom äfven längs hela utkanten finnas gula, genom de här svarta nerverne skilda fläckar, af hvilka de som följa kanten äro kegelformiga och inåt svartbegränsade; längs yttersta kanten löpa 2:ne svarta linier, af hvilka den indre är vågformig och mer eller mindre tydlig. Bakvingarnes undre sida, som är minst underkastad förändringar, upptages af 3:ne ljusgula och

lifa många rödgula tverband, hvilka alla sakna swarta punkter eller fläckar. Af dessa finnes ett rödgult band wid sjelfwa roten, dernäst ett ljusgult eller hwitagtigt, bestående af 3—4 med swart omgifna fläckar; närmast nyhnämnde går ett rödgult, i hvilket finnes en hwitagtig, swart begränsad fläck; derefter öfwer diffen åter ett ljusgult eller hwitagtigt, wågigt, inåt och utåt begränsadt med swart och oftast genom en swart längsgående linea deladt i twenne olifa hälfter; dernäst ett rödgult, i hvilket finnas en rad swarta haljbågar, och slutligen ett ljusgult af inåt afrundade, swart begränsade fläckar, öfwer hvilka, närmast utfanten, löpa twenne parallela swarta linier. Fransarne äro hwitagtigt gula med swarta fläckar.

Var. b. är betydligt mindre med smälare och mera långsträckt framvingar, men föröfrigt till färgteckningen alldeles lik föregående, utom deri, att undre fhdans rödgula tverband äro mörkare, öfwerdragne med swart, så att de stöta i brunt.

Var. c. Wingarne ofwan mörkbruna med ett af större rödgula fläckar bestående tverband nära utfanten och stundom med en och annan rödgul fläck i diffen. Framwingarne undertill rödgula med twenne olifflora swarta fläckar i distfältet (stundom desutom med en eller annan mindre), samt twert öfwer wingen en rad långa, swarta streck, och längs utfanten otydliga triangelformiga fläckar af samma färg. Bakwingarne undertill rödgula med fyra swarta fläckar wid basen; öfwer midten ett tverband af ljus ochragula fläckar, hvilka på indre och yttre fhdan begränsas af ett bredare swart streck; bakom detta band är wingen swartbrun med en rad halfmånformiga, rödgula fläckar och i utfanten en rödgul linea. Bakwingarne äro underkastade förändringar till undre fhdans färgteckning. Så är hos några exemplar dessa wingars yttre hälft hwitgul med en matt och otydlig rödgul strimma och längs utfanten finnes antydning till ett swartagtigt tverstreck.

Parven till den egentliga *M. athalia* Esp. är swart med twenne rader hwita punkter på hwarje kroppsring samt tornar

såsom hos föregående. Larven till varieteten b skall hafwa de hwhita punkterne knapt märkbara och en rad blekgula fläckar längs hwardera froppsidan. Den lefwer på arterne af släktet *Plantago* och *Valeriana* samt öfwerwintrar. Pupan är till förre formen gråbrun med svart teckning på wingslidorna och swarta samt röda punkttrader på abdominalregionen, men till den sednare formen skall den wara asfegrå med 2:ne rader rostfärgade punkter på abdominalregionen. (Schf.)

6. Kohvete-Nätsjärilen (*Molitæa dictynna* Esp.).

Alis supra nigris fulvo maculatis; posticis infra fasciis tribus albidis, impunctatis, et totidem fulvo-brunneis, posteriore arcubus nigris, maculis flavis punctisque nigris adjacentibus.
L. al. exp. 34—37 millim.

Wingarne ofwan swarta med rödgula fläckar; de bakre undertill med 3:ne hwhitagtiga tverband utan swarta punkter, och lika många andra rödbruna, af hwilka sednare det bastersta har en rad swarta halfbågar, intill hwilka ligga gula fläckar och swarta punkter. L. e. wingsp. $1\frac{3}{8}$ — $1\frac{9}{16}$ t.

Syn. Pap. *dictynna* Esp. Schm. l. t. 58. suppl. 24. f. 2. a. b. t. 91. cont. 41. f. 1. p. 180. Fabr. E. S. III. 4. 253. 785. *Molitæa* Ochs. Schm. l. 4. 42. IV. 44. Dalm. Pap. Sv. 76. 5. God. et Dup. Lepid. l. 80 pl. 4. f. 3. pl. 4 quint. f. 4. H—S. Text. l. 24. Pap. *corithalia*. Hübn. t. 3. f. 45. 46. Text. 7. 40.

Denna art, som träffas i Juni och Juli månader på flbländta skogsängar, tillhör endast södra Sverige och Norrige. I Skåne är den på flera ställen allmän, såsom wid Trolle Ljungby, Gephult och W. Wramb. I Blekinge har jag tagit den wid Eölsvedborg och Carlshamn. I Småland är den träffad wid Anneberg (Wm.). Åfven på Öland är den anmärkt (Bett.). I Norrige är den funnen mid Sandesfjord (Siebke).

Artbeskr. Antennerne mörkbruna och hwhitringlade. Klubban ofwan brun, östa i bakre kanten hwhit, undertill och i spetsen rödgul. Palperne hwhitgula, undertill brunhåriga. Ryggskölden

rödbbrunt hårig. Abdomen ofwan svart med korta hår af samma färg, undertill hwitgul. Bröfvet gråubet. Fötterne rödgula.

Huue och houe : Wingarne ofwan swarta med flere eller färre rödgula, mindre fläckar; de bakre hafwa sällan mer än 3:ne rader sådane fläckar. Undertill äro de främre mörkt rödgula med swarta fläckar; längs utkanten löpa tvenne swarta streck, af hvilka det indre är mer eller mindre vågigt och utgör yttre gränjen för en rad trekantiga ljustgula, inåt lifalebes swart begränsade fläckar; inom dessa synas stundom andra ljustgula fläckar, som försvinna mot wingens indre kant. Bakwingarne hafwa på undre sidan 3:ne ljustgula eller snarare hwitagtiga och lifa många brungula band, af hvilka de förra sakna swarta punkter. Dessa band hafwa följande ordning: närmast basen ett brungult, i hvilket wid fjelfwa rotloben finnes en hwitagtig fläck; derefter ett hwitagtigt, som består af olifflora svartbegränsade fläckar; sedan åter ett brungult med en hwit, af svart omgifwen fläck; dernäst ett hwitagtigt, som inåt och utåt begränsas af en svart linea, och delas genom ett svart långsgående, afbrutet streck i tvenne hälfter, af hvilka den indre, som är minst, ofta har gulagtigare anstrykning än den yttre; närmast detta åter ett brungult, som har en rad swarta halvbågar, hwardera omslutande en ljustgul fläck jemte en svart punkt; ytterst finnes ett hwitagtigt, stundom swagt lifswerglänsande band af halvmånformiga, inåt svart begränsade fläckar. Längs utkanten löpa tvenne parallela swarta linier, hvilkas mellanrum är rödgult. Nerverne äro på bakwingarnes undre sida swarta. Bransarne hwita med swarta fläckar.

Älwen denna fläril är underkastad variationer, dock ej till den grad som föregående. Fläckarne på wingarnes öfre sida äro än ofragula, än ljustgula eller hwitagtige, än flere och än färre. Stundom äro bakwingarne nästan enfärgadt swarta.

Varven är rödagtigt violett med ljustblå punkter och 3:ne swarta långsgående streck; hufwudet har tvenne ljustblå fläckar

och tornarne, som hafwa samma beskaffenhet, som hos närmast föregående, äro i spetsarne swarta. Den lefwer på *Melampyrum nemorosum* och *Valeriana officinalis*.

Släktet: **Argynnis**. FABR. et AUCT.

Antennæ longiores, graciles. Clava brevis, ovalis l. suborbiculata, in speciminibus exsiccatis excavata, compressa.

Palpi capite longiores, adscendentes, apicibus divergentibus, triarticulati. Articulus medius maximus, tumidus, infra hirsutissimus, ad latera fere nudus; ultimus minutissimus (basali brevior), compressissimus, nudus apice acuminato.

Oculi nudi.

Pedes antici breves, feminæ minus, maris tamen magis pilosi, tarsibus inarticulatis; ceteri ut in genere præcedente, armati et instructi; femora infra aut nuda aut pilosa; articuli tarsorum ut in genere præcedente, rarius ut in sæquente.

Alæ subdentatæ. Cellula posticarum costa spuria tenuissima, anticarum sat distincta, clausa.

Costæ alarum posticarum 9: 1—4 o trunco communi superiori (prima ramulum reflexum l. rectum in lobum emittens), 5—7 o trunco inferiore, 8—9 o basi egredientes. Cellula discoidalis inter costam 4 et 5 costa tenuissima transversa clausa. Costæ alarum anticarum 9—10: 1 o basi, 2—4 o trunco communi inferiori, 5 o costa transversa cellulæ, 6—8 o trunco communi superiori (7 quadrimosa), 9 o basi egredientes; sunt tamen costæ alarum 10, costa 6—9 o trunco superiori (7 triramosa) et 10 o basi egrediuntur. Cellula discoidalis costa transversa inter costam 4—5 sat distincta clausa.

Antennæne långa, fina. Klubban kort, oval eller något rundad, hos torfede exemplar urhållad och sammantråft.

Palperne längre än hufvudet, uppåtslående, med divergerande spetsar, treledade: medlersta leden störst, uppblåst, nedtill ganfka lunden, på fdborne nästan bar; sista leden ganfka liten (fortare än basleden), ganfka sammantryckt, naken och tillspetsad.

Ögonen nakna.

Fötterna: de fränare korta, hos honan glesare, hos hannen längre lubne, med olebade tarfer; de öfriga såsom hos föregående slägte beväpnade; låren antingen nakna eller lubna; tarfernes leder såsom hos föregående, sällan såsom hos följande slägte.

Wingarne småtandade. De bakres diffält slutet genom en fin, sällst twernerv, de främres genom en temligen tydlig.

Nerverne på bakwingarne 9: 1—4 utgående från öfre nervstammen (den 1:sta utsändande åt rotloben en bakåtböjd eller rät gren), 5—7 från nedre nervstammen, 8—9 från basen. Diffältet slutet genom en fin twernerv emellan 4—5 wingnerverne. Framwingarnes nerver 9—10: 1 utgående från basen, 2—4 från nedre nervstammen, 5 från diffältets twernerv, 6—8 från öfre nervstammen (7:de fyrgrenig), 9 från basen; men äro nerverne 10, så utgå 6:te—9:de nerverne från öfre nervstammen (7 tregrenig) och den 10:de från basen. Diffältet slutet genom en ganfka tydlig twernerv emellan 4—5 wingnerverne.

Detta artrika slägte har representeranter både i Skandinavien's sybbligaste och nordligaste delar. Några arter utbreda sig öfver hela halfön, andra äro deremot inskränkt till wisfa provinser. Somliga älska flogarne med desfas torra marker, andra deremot ängarne och färren. En del hafwa twenne generationer om året, en del tyckas deremot blott ega en. Larven, som är beklädd med hårda, greniga, i sex rader ställda tornar, bland hwilka merendels twenne större och längre finnas på första kroppsringen, lesiwer på lägre dicotyledona växter, men aldrig på träd, och träffas icke i sällskap, utan alltid enslig.

I. Subdiv. Åtminstone medlersta fotparets lår undertill tätt ludne*).

1) Framvingarnes nerver 9.

a) Första nervens på bakvingarne gren rät.

1. Svartringlade Perlemorfjärilen

(Argynnis aphirape Hübner.)

Alis supra fulvis nigro maculatis; posticis infra fulvis fasciis flavo-albidis, interdum argenteis, macula media fasciæ discoidalis linea nigra transversa divisa, serieque marginali punctorium ocellarium. L. al. exp. 37—40 millim.

Wingarne ofwan rödgula med svarta fläckar; de bakre undertill rödgula med hvitgula, stundom perlemorfärgade tverrbånd, af hvilka det medlersta medlersta fläcket är på tvären delad genom ett svart streck; nära utfanten en rad ocell-lika punkter. L. e. wingsp. $1\frac{9}{16}$ — $1\frac{5}{8}$ t.

Syn. Pap. *aphirape* Hübner. Pap. t. 5. f. 23—25. t. 463. f. 811. Argynnis Ochs. Schm. I. 4. 52. IV. 14 & 409. Treitsch. X. 1. 8. Dalm. Pap. Sv. 69. 6. Zett.

*) Tabula subdivisionum hujus generis:

A. Femora pedum saltem inter-mediorum infra dense hirsuta:

1. Costæ alarum anticarum 9:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| a) Ramulus costæ primæ alarum posticarum rectus: | } <i>Aphirape. Selene. Freja. Polaris.</i>
<i>Pales. Frigga. Thore.</i> |
| b) Ramulus costæ primæ alarum posticarum arcuatus reflexus: | |
| | } <i>Euphrosyne.</i> |

2. Costæ alarum anticarum 10; ramulus costæ primæ alarum posticarum rectus:

} *Ino.*
} *Lathonia.*

B. Femora pedum infra nuda; costæ alarum 10; ramulus costæ primæ alarum posticarum reflexus:

} *Niobe.*
} *Adippe.*
} *Aglaja.*
} *Paphia.*

Ins. Lapp. 895. 6. God. et Dup. Lepid. II. pl. 9. f. 3.
4. II—S. Text. 4. 34. Pap. *thomyris* Herbst. Schm.
t. 270. f. 6. 7.

Var. b. { Fascia media alarum posticarum ut etiam maculis ba-
seos infra argenteis.
Middelbandet på bakvingarnes undra sida, äfvensom fläc-
sarne wid basen petlemorfärgade.

Syn. Pap. *ossianus* Herbst. Schm. t. 270. f. 4. 5.
Hüb. t. 446. f. 734. 735. *Argynnis* God. et Dup.
Lepid. Suppl. I. 429. pl. XX. f. 5. 6. Bois. Icon.
94. pl. 49. f. 4—3. = II—S. Text. 4. 34. t. 67. f.
322. 323.

Arten tillhör egentligen myrtrafterna i norra delarne af vår
halö, der båda varieteterne träffas tillsammans med hvarandra och äro
temligen allmänna. Dock förekommer sjärilen någon gång äfwen i
medlersta Sverige. Så har den blifwet funnen wid Norberg i West-
manland af Målaremästaren Fredrichsön, som benäget sändt
exemplar till påseende. I nordn är den träffad wid Lycksele och
Umenäs i Umeå Lappmark (Zett.); wid Quickjock i Ruled Lappmark
(Wlm.) och wid Öire Tärneå i Tärneå Lappmark (Wahlb.).
Likaledes finnes den wid Nord-Cap. Dess flygtid infaller i Juni
och Juli månader. Utom Scandinavien finnes den i alla nordliga län-
der af Asien och Amerika, äfvensom på åtskilliga ställen i Tyskland,
såsom wid Augsburg m. fl. st.

Artbeskr. Antennerne ljusbruna, ofwan med breda hvita ringar,
undertill rödgula. Klubban brun i spetsen och undertill rödgul.
Palperne rödgula, undertill brunhåriga. Nyggfölbden med röd-
gulagtigt bruna hår. Abdomen ofwan svart, forthårig, un-
dertill rödgul. Bröfket brungrått. Fötterne rödgula, med brun-
agtiga lår.

Stanne: Wingarne ofwan rödgula, wid basen mer eller
mindre bruna, med swarta streck, tverlinier och fläckar, de sed-
nare nära utkanterna rundade. Utkanterne, som äro swarta,
åtskildas af en rad swarta trianglar, som hwardera innesluta en
ljusgul fläck. Granarne ljusgula med bruna fläckar. Fram-

wingarne undertill rödgula, men längs utkanten samt i wingspetsen ljusgula, med samma swarta teckning som oswan, men den är här finare och utkantens trianglar sammanhånga icke med hwarandra. Bakwingarne brungula med 3—4 olifstora, swartkantade ljusgula eller hwitagtiga fläckar wid basen, ett band af bhlifa fläckar öfwer biffen och en rad trekantiga altid perlemorfärgade, inåt och utåt swartbegränsade fläckar längs utkanten. Midtelbandet, som är swartbegränsadt, har den stora midtelfläcken, hwilken merendels är perlemorfärgad, belagd genom en sneddående swart linea. Emellan samma band och utkanten finnes en rad af ljusgula eller hwitagtiga, ocell-lika punkter omgifne med en swart ring, och intill dessa gränisar en rad ljusgula fläckar.

Sonan liknar hannen, men har grundfärgen oswan mera odragul och utkanterne ljusare.

Var. h, som af några anses, ehuru säkerligen utan skäl, såsom egen art, skiljer sig från nu beskrifna veri, att det swarta wid wingbasen oswan är mindre utbredd; fläckarne och midtelbandet på bakwingarnes undre sida perlemorglänsande och att stundom, ehuru sällan, fläckarne längs utkanten på samma sida af bakwingarne äro ej triangulära, utan snarare rectangelformiga.

Varven fort och tjock, ljus silfwergrå med ganska korta tornar och utan halstornar. Hufvudet brungrått. Wid hwarje torne finnes på ryggen en swart streck, och inwid denna en ljusare linea. Nedanför lufthålen synes en hwit sidolinea. Puppan ljusgrå med ljusare och mörkare strimmor, som utlöpa i en spets. På ryggen finnas flera silfwerfläckar och wingslidorna äro starkt indöjda. (Freyer.) Varven öfwerwinttrar och undergår sin metamorphos i Maj månad följande året.

2. Brunfläckiga Perlemorfjärilen

(Argynnis selone Fabr.).

Alis supra sulvis nigro maculatis; posticis infra flavis brunneo maculatis, fasciis brunneo-sulvis et flavis, his plus minus

argenteis, macula intermedia fasciæ mediæ argentea, indivisa, serieque marginali punctorum nigrorum cæcis. L. al. exp. 40—43 millim.

Wingarne ofwan rödgula, svartfläckiga; de bakre undertill ljusgula med brungula fläckar, samt brungula och ljusgula tverband, af hvilka de sednare äro mer eller mindre silfverglänsande; midtelbandets medlersta fläck silfverglänsande och odelad; nära utfanten en rad swarta enfärgade punkter. *E. e.* wingsp. $1\frac{5}{8}$ — $1\frac{3}{4}$ t.

Syn. Pap. *selene* Fabr. E. S. III. 4. 447. 454. Hübner. Pap. t. 5. f. 26. 27. et figg. 732. 736. 738. Argynnis Ochs. Schm. I. 4. 55. IV. 44. 109. Treitsch. X. 4. 8. Dalm. Pap. Sv. 69. 7. Zett. Ins. Lapp. 896. 7. Godart et Duponch. Lepid. I. 64. pl. 4. tort. f. 4. II—S. t. 33. f. 150. 151. t. 34. f. 152. 153. (var.).

Var. b. Alis supra fulvis macula rotundata costali prope basin limboque exteriori nigris; hic serie punctorum fulvorum; anticis infra fulvis macula ocellari strigaeque brevi ad marginem anticum nigris; posticis infra flavis costis punctoque basali nigris, maculis brunneis in parte posteriori.

Wingarne ofwan rödgula med en rundad svart kantfläck nära basen; öfre kanten af samma färg, men derjemte rödgult fläckig; de främre undertill rödgula med en svart ocellformig fläck och kort strimma af samma färg wid främre kanten; de bakre undertill blekgula med swarta nerver och en öflit fläck wid basen, samt bruna fläckar i wingarne öfre hälft.

Syn. Arg. *selene* var. b. Zett. I. c.

Var. c. Alis supra fere ut in priore; anticis posticisque infra serie macularum brunnearum, his flavo alboque lineatis, costis punctoque nigris.

Wingarne på öfre sidan nästan som hos föregående; undertill med en rad bruna fläckar; de bakre desutom linierade med hvitt och blekgult, samt försedde med en svart punkt och nerver af samma färg.

Syn. Arg. *selene* var. c. Zett. I. c.

Var. d. Alis supra nigro-fuscis maculis fulvis, ad marginem posteriorem seriatim dispositis; anticis supra disco interiori macula fulva, rotundata, costali, prope basin nigra; omnibus infra ut in var. c pictis, sed maculis brunneis longitudinalibus, venas cingentibus.

Wingarne ofwan svartbruna med rödgula fläckar, som lida en tverrad nära utfanten; de främre ofwan med en rundad rödgul fläck vid infanten, hvilken närmare basen är svart; alla wingarne undertill färgade såsom hos var. c, men de bruna fläckarne äro långsgående och omgifwa nerverne.

Syn. *Arg. selene* var. d. Zett. l. c. *Pap. rinaldus* Herbst. t. 271. f. 4. 2. 4.

Var. e. Alis supra nigro-fuscis maculis rarioribus flavis; anticis infra fulvo nigroquo maculatis; posticis infra fulvo fuscoquo variegatis, fasciis 2 serieque punctorum marginalium flavis.

Wingarne ofwan svartbruna med färre rödgula fläckar; de främre undertill svart och rödgult fläckige; de bakre på samma sida marmorerade med rödgult och brunt och äga 2 rödgula tvärbånd samt i utfanten fläckar af samma färg.

Syn. *Arg. selene* var. e. Zett. l. c. *Pap. marphisa* Herbst. t. 270. f. 8. 9.

Var. f. Alis ut in prioro, sed posticis supra nigro-fuscis unicoloribus.

Wingarne såsom hos föregående, men de bakre ofwan enfärgadt svartbruna.

Syn. *Arg. selene* var. f. Zett. l. c.

Var. g. Alis supra sericeo-brunneis, unicoloribus; posticis maculis 3—4 minutis fulvis ad angulum ani; infra omnibus ut in var. e.

Wingarne ofwan fllesbruna, enfärgade; de bakre med 3—4 små, rödgula fläckar i anahörnet; alla undertill såsom hos var. e.

Syn. *Arg. selene* var. g. Zett. l. c.

Denna fläril, en af de allmänna i inom släktet, träffas (äminstone i S. Sverige i tvenne generationer om året — på alla sankängar öfver allt på vår halfö, de nordligaste trakterne ej undantagne. Från Tromsö har den blifwit hemförd af Adj. Viljeborg i Lund. Dess flygtid infaller i Maj och Juni, samt sedan åter i Augusti. Sednare generationen är ej så talrik som förra. Varieteterne, som alla förvaras uti Schönherrss samling i Stockholm, äro till största delen från Lappland och Österbotten. Dock förekommer en eller annan af dem äfwen i södra och medlersta Sverige. De äro lifwäl alla sällsynta.

Artbeskr. Antennerne bruna, otydligt hwitringlade. Klubban brun, i spetsen rödgul. Palperne på färdne hwitagtiga, ofwan och undertill rödgulagtiga, ludna. Ryggskölden luden af rödgult. Abdomen ofwan svart med rödgula fläckhår, undertill hwitagtig. Bröfket brungrått, ludet. Fötterne ljusbruna gråpudrade.

Hanne och hona lifna hwarandra, men variera betydeligt till färgtefningen. Den wanliga formen har wingarne ofwan rödgula: de främre med swarta fläckar i distfältet, ett svart, på flera ställen afbrutet tverband öfver midten från framkanten till infanten, och en rad runda, swarta fläckar närmare utkanten, hwilken är svart med större eller mindre, rundade eller trefantige rödgula fläckar; de bakre, som wid basen äro swarta med en rödgul ring, omgifwande en svart rundad fläck, hafwa öfver midten ett svart, afbrutet tverband, dernäst en rad fläckar, som lifnar framwingarne, hwilket äfwen är förhållandet med utkanten. Undertill äro framwingarne blefve rödgula med finare svart teffning och gulagtige wingspetsar, hwarest finnas några rödbruna fläckar. Bakwingarne äro ljusgula med ett af 3—4 aflångt-rundade, hwitgula eller ljusgula, mer eller mindre fllfwerfärgade fläckar bestående band wid basen, ett annat dyligt af 9 olifflora, merendels svart begränsade, fläckar öfver disten, och ett tredje af 7, inåt svartbegränsade, trefantige fläckar i utkanten, hwilka ofast alla äro fllfwerglänsande. Emellan

basens och bliskens ljusgula tverband går ett rostbrunt band, i hvars midt finnes en större, rundad, svart fläck, och emellan bliskens och utkantens tverband finnas 2—3 stora, obegränsade rödbruna fläckar, äfvensom en rad swarta, enfärgade punkter, framom hvilka synes en hwitgul, stundom matt silfverglänsande flamma, som på midten är afbruten. Midtelbandets medlersta fläck (wid bliskältets slut) är alltid silfverglänsande och ständigt odelad (utan tydlig svart snedstreck). Granarne äro ljusgula med bruna fläckar.

Parven beskriswes svart med mörkgrå strimmor, och rostgula, glest swarthåriga tornar, af hvilka de två första äro rigtade utåt. På första kropspringen finnas twenne hwita punkter på hvarje sida. Dess näringsplantor äro arterne af släktet *Viola*. Pupau är gulbrun, med swarta fläckar och taggar. (Treitsch.)

Anm. Till Sveriges Fauna har äfwen, ehuru orätt, blifwit räknad en art, som förefommer i Finland och annorstädes, neml.:

***Argynnis amathusia* (FABR.)**

Alis fulvis nigro-maculatis; posticis infra variegatis, fasciis duabus dentatis, altera flava, altera rosea, punctis 5—6 posticis ocellatis, et uno basali nigris.

Wingarne rödgula, svartfläckiga; de bakre undertill marmorerade med twenne tandade tverband, det ena gult, det andra rosenfärgadt, samt 5—6 swarta, ocellformiga punkter nära utkanten en dylik wid basen.

Syn. PAP. *amathusia* Fabr. E. S. III. 1. 255. 791. ARGYNIS OCHS. I. 4. 75. DALM. Pap. Sv. 74. 9. ZETT. Ins. Lapp. 897. 9. GOD. et DUP. Lepid. II. 65. pl. 8. f. 5. 6. H—S. Text. 4. 35. HÖBN. Pap. Text. II. 44. PAP. *diana* HÖBN. t. 10. f. 54—54. PAP. *tithania* HÖBN. t. 9. f. 47. 48.

Dess hemland äro Alperne i Schweiz och Schwaben; äfwen träffas den i Ryssland och Finland, på sednare stället 5 mil från Åbo wid Mälne Nygård, men har ännu icke hittills blifwit funnen uti Sverige eller Norge.

3. Frejas Perlemorfjäril (*Argynnis freja* Thbg.)

Alis supra fulvis basi maculisque nigris; posticis infra ferrugineis albo fuscoque variis, fascia transversa media lunulisque

marginalibus flavo-albidis, puncto discoidali nigro, albo circumcincto, serieque postica punctorum nigrorum. L. al. exp. 35—40 millim.

Wingarne ofwan rödgula med swarta fläckar och bas; de bakre undertill rödbruna, marmorerade med hvitt och brunt, med ett hvitgult, twergående midtelband och i utfanten fläckar af samma färg, samt i bliffältet en swart, af hvitt omgifwen punkt, äfwenfom en rad swarta punkter öfwer wingens bakre hälft. L. e. wingsp. $17\frac{1}{16}$ — $1\frac{5}{8}$ t.

Syn. Pap. *freja* Thunb. Diss. vol. III. p. 49. t. 5. f. 14. Quens. Act. Holm. 1791. p. 276. 6. t. 10. f. 5. 6. Hüb. Pap. t. 10. f. 54. 55. t. 11. f. 56. t. 154. f. 771. 772. *Argynnis* Ochs. Schm. I. 1. 78. IV. 15. Dalm. Pap. Sv. 71. 10. Zettl. Ins. Lapp. 897. 10. God. et Dup. Lepid. Suppl. I. 122. pl. 19. f. 6. 7. Boisd. Leon. p. 102. pl. 19. f. 4. 5. II—S. Text. I. 36.

Denna art tillhör egentligen fjellplatauerne i Lappmarkerne, der den isynnerhet finnes talrik omkring Quicksjock, men den nedstiger äfwen på låglandet, såsom i Finmarkerne. Uti Norrbotten är den träffad wid Säfwaß och Råbäck af Prof. Wahlberg. Prof. Zetterstedt, har funnit den wid Lycksele och Stensele i Umeå Lappmark. Prof. Boheman har hemfört den från Dowre. Flygtiden infaller i Juni och Juli månader.

Artbeskr. *) Antennerne bruna med hvitagtiga ringar. Klubban brun, i spetsen rödgulagtig. Balperna gulagtiga, undertill

*) *Descr.* Antennæ fusæ annulis albidis. Clava fusca, apice fulvido. Palpi fulvi, infra fulvo pilosi apice fusciscentis. Caput et thorax fulvo-hirsutissimus. Abdomen supra nigrum, breve fulvo-pilosum, infra flavo-albidum l. fulvidum. Pectus hirsutum, fulvum. Pedes dilute fulvi.

Mas. Alæ supra fulvæ, ad basin nigræ, præsertim posticæ. Maculæ nigræ ordinariæ rudiores quam in speciebus præcedentibus. Alæ anticæ infra ochraceæ, ita maculatæ in disco ut in parte superiore, apicibus tamen flavidis et lineolis longitudinalibus ejusdem coloris in margine intra costas. Alæ posticæ infra ferrugineæ maculis 3—4 flavo-albidis basalibus, et macula altera in cellula discoidali puncto minuto nigro instructa. Per

rödgult håriga, i spetsen brunagtiga. Hufvud och ryggsköld starkt lubna af rödgult. Abdomen ofvan svart, forthårig af rödgult; undertill hvitgulagtig eller stötande i rödgult. Bröfvet rödgult lubet. Fötterne ljust rödgula.

Hanne: Wingarne ofvan rödgula, wid basen svarta, hvilket isphnerhet är förhållandet på de bakre, der det svarta sträcker sig utöfver midten. De wanliga svarta teckningar äro gröfre än hos föregående arter. Undertill äro framwingarne ochragula med samma svarta teckning i disken som på öfre sidan, men wingspetsarne äro ljusgula och långs utkanten stå emellan nerverne en rad ljusgula längsstreck. De bakre äro undertill rödbruna med 2—3 hvita fläckar wid basen och i diskfältet en annan, mindre, af samma färg, i midten försedd med en svart punkt. Öfver midten går ett hvitgult, med rödbrunt der och hwar öfverpudradt, af oliformiga fläckar bildadt tverband, som utåt och inåt begränsas med en rad svartbruna, pilformiga fläckar, hvilka wända spetsarne mot hwarandra. Detta bands medlersta fläck (wid diskfältets slut) är på tverren delad genom en svart streck. Emellan samma band och utkanten synes en hvitagtig, i gult stötande strimma, bakom hvilken finnes en rad svarta, slundoni omärkliga punkter. Långs utkanten går en

medium fascia flavo-albida, hinc inde brunneo adspersa, e maculis difformibus composita, utrinque sagittis nigro-fuscis, apicibus sibi invicem speculantibus, marginato, se extendit. Macula media (ad apicem cellulæ discoïdalis) hujus fasciæ linea transversa nigra divisa. Inter fasciam jam memoratam et marginem anteriorem altera est fascia indeterminata medio interrupta, albida, in flavedinem vertens, post quam series punctorum nigrorum, plus minus distinctorum, observatur. In ipsa margine maculæ flavo-albidæ, ovatæ l. trigonæ, intus angulis fuscis marginatæ, adsunt. Fimbriæ flavidæ, fusco-maculatæ.

Femina mari est similis, sed maculus flavas supra in margine geret.

Hab. in Lapponia, ad Quickjock frequens; ad Sälvast et Råbacken, Lycksele et Stensele, Muonioniska, Karesuando, et Juckasjärvi rarius.

rad hjrtlighula, inåt med bruna vinklar begränsade, ovala eller trefantiga fläckar. Gransarne äro ljusgula med bruna fläckar.

Sonan liknar hannen, men har osvan i utfanten ljusgula fläckar.

4. Nordiska Perlemorfjärilen

(*Argynnis polaris* Boisd.).

Alis supra fulvis maculis nigris; posticis infra fusco-ferrugineis maculis fasciisque transversis et lunatis T-formibus marginalibus ut etiam puncto discoidali lacteis, serieque postica punctorum nigrorum. L. al. exp. 40—45 millim.

Wingarne osvan rödgula med swarta fläckar; de bakre undertill svartagtigt rödbruna med fläckar, tverband, och T-lika kantfläckar af mjölkhvit färg, samt en hvit punkt i diskfältet, äfvensom en rad af swarta punkter öfver wingarnes bakre hälft. R. e. wingip. $1\frac{5}{8}$ — $1\frac{13}{10}$ t.

Syn. *Arg. polaris* Boisd. Ind. meth. I. 45. Icon. 104. pl. 20. f. 1. 2. God. et Dup. Lepid. Suppl. I. 125. pl. 20. f. 1—3. Zett. Ins. Lapp. 897. 11. II—S. Text. I. 32.

Denna art, som mycket liknar föregående, träffas wid samma tid som denna i Sveriges nordligaste länsskaper. Wid Quickjock äfvensom i Finmarken är den tagen af Prof. Wahlberg *).

Artbeskr. Antenner, palper, hufvud, ryggsköld och abdomen lifna till färgen samma partier hos föregående art. Fötterna och bröstet äro brunagtiga, det senare starkt ludet.

Sonnens wingar osvan ljus rödgula, wid basen af framwingarne söga brunagtiga; honans deremot mörkt rödgula, wid basen svartagtiga. För öfrigt stiles arten från föregående genom följande kännetecken, hämtade af bakwingarnes undre sida:

*) Hab. in terris Scandinaviciis maxime borealibus cum præcedente, ut ad Quickjock et in Finmarkia.

Arg. polaris.

Bakwingarnes undre sida svartagtigt rödbrun från basen wida utöfwer midten.

Wid basen af bakwingarnes undre sida 3—4 smärre mjölkhwita fläckar.

I diffältets midt på samma sida af bakwingarne finnes en hwit fläck utan svart punkt.

Öfwer diften ett tverband af mjölkhwita, med brunt der och hwar öfwerpubrade fläckar, hwilket inåt och utåt begränsas endast af den svartagtigt rödbruna grundfärgen.

Samma bands midtelfläck delad på tverren af en fin, brun streck.

Wid slutet af den bruna grundfärgen går tvers öfwer wingen en sammanhängande, hwit, af halfmånsformiga fläckar bestående strimma, intill hwilken den swarta punktstraden befinner sig.

I utkanten finnes en rad af mjölkhwita fläckar, som hafwa likhet med bokstafwen T och inåt begränsas af den svartagtigt rödbruna grundfärgen, som här intager utkanten och framom fläckarne bildar andra trekantiga fläckar *).

Arg. freja.

Bakwingarnes undre sida rödbrun utöfwer midten.

Wid basen af bakwingarnes undre sida 3—4 större hwitgula fläckar.

I diffältets midt på samma sida af bakwingarne finnes en hwitgul fläck, i hwars midt står en svart punkt.

Öfwer diften ett tverband af hwitgula med rödbrunt der och hwar öfwerpubrade fläckar, hwilket inåt och utåt begränsas af en rad svartbruna, pilformiga fläckar, som wända spetsarne mot hwarandra.

Samma bands midtelfläck delad på tverren af en grof, svart streck.

Wid slutet af den rödbruna grundfärgen går tvers öfwer wingen en afbruten hwitgulagtig strimma, från hwilken punktstraden bestunnes skild genom grundfärgen.

I utkanten finnes en rad af hwitagtiga fläckar, som äro till formen ovala eller trekantiga, och inåt begränsas af swarta vinklar, hwilka tydligen skilja sig från den rödbruna grundfärgen.

*) Descr. Antennæ, palpi, caput, thorax et abdomen ut in priore. Pedes et pectus fusco-ferruginei; hoc dense hirsutum.

5. Gulfläckiga Perlemorfjärilen

(*Argynnis pales* W. V.).

Alis supra fulvis nigro maculatis; posticis infra rufo-brunneis maculis basalibus fasciaque media maculari flavis, et maculis marginalibus, macula oblique trigona fasciæ mediæ punctoque discoidali minuto argenteis, et macula flava intra-marginali, supra seriem punctorum fuscorum adscendente. L. al. exp. 35—48 millim.

Maris alæ sunt in parte superiore dilute fulvæ, anticæ ad basin haud fuscescentes; feminæ tamen obscure fulvæ, ad basin nigrescentes. Præterea hæc species parte alarum posticarum inferiore a priore, ut sequitur, facillime dignoscitur:

Arg. polaris.

Alis posticis infra fusco-ferrugineis a basi longe supra medium.

Ad basin 3—4 maculis minoribus et lacteis.

In medio cellulæ discoidalis macula alba impunctata.

Per medium fasciæ transversa maculata lactea, hinc inde brunneo adspersa, utrinque fundo fusco-ferrugineo marginata.

Macula mediæ fasciæ memoratæ linea tenuissima, fusca, transverse divisa.

Ad finem fundi fusco-ferruginei striga transversa lactea, a maculis lunatis composita, continua, ad quam series punctorum nigrorum adest.

Ad marginem exteriorem maculis lacteis, litteram T. mentientibus, intus fundo fusco-ferrugineo, angulos formante, marginatis.

Arg. freja.

Alis posticis infra ferrugineis longe supra medium.

Ad basin 3—4 maculis majoribus et flavo-albidis.

In medio cellulæ discoidalis macula flavo-albida puncto nigro.

Per medium fasciæ transversa maculata flavo-albida, hinc inde brunneo adspersa, utrinque sagittis nigro-fuscis, apicibus sibi invicem vertentibus, marginata.

Macula mediæ fasciæ memoratæ linea rudi, nigra, transverse divisa.

Ad finem fundi ferruginei striga transversa interrupta, flavida, a qua series punctorum nigrorum colore fundi sejuugitur.

Ad marginem exteriorem maculis ovalis l. trigonis, flavo-albidis, intus angulis fuscis marginatis.

Wingarne ofvran rödgula, firartfläckiga; de bakre undertill rödbruna med följande teckning: fläckarne wid basen och ett af fläckar bestående band öfver midten gula; fläckarne i yttre kanten, midtebandets snedt triangulära fläck och en liten punkt i distiklet silfverhvita; wid utkanten en gul fläck, som uppligger öfver en rad bruna punkter. *L. e. wingsp.* $1\frac{7}{16}$ — $1\frac{15}{16}$ t.

Syn. Pap. pales W. V. p. 177. *Fabr.* E. S. III. 4. 257. 797. *Hüb.* Pap. t. 7. l. 34. 35. t. 124. f. 617. 618. *Argynnis* Ochs. Schm. I. 4. 63. IV. 45. & 110. *Treitsch.* X. 4. 11. *Dalm.* Pap. Sv. 72. 44. *Zett.* Ins. Lapp. 897. 12. *God. et Dup.* Lepid. II. 68. pl. 9. f. 4. 2. *Pap. pales* Thunb. Diss. vol. III. 48. cum varr.

Var. b. *Alis latioribus rotundatis; posticis infra ut in priore, sed macula intramarginali flava ad seriem punctorum fuscorum adseudento.*

Wingarne bredare, afrundade; de bakre undertill såsom hos föregående, men med en gul fläck i utkanten, som endast uppligger till en rad bruna punkter.

Syn. Pap. arsilache Esp. Schm. I. t. 56. cont. 6. f. 45. *Hüb.* Pap. t. 7. l. 36. 37. *Argynnis* *Treitsch.* Schm. X. 4. 12. II—S. Text I. 36. t. 55. f. 259—262. *Arg. carichlea* *God. et Dup.* Lepid. Suppl. I. 344. pl. 48. f. 4. 2. (excl. synonym.)? *Arg. pales* var. *Dalm.* et *Zett.* I. c.

Obs. Varr. *Isis* et *Napoea* *Hüb.* in Scandinavia non occurrunt, quantum novimus.

Denna art tillhör egentligen flögskärren och bergshöjderne i Norrige och Lappmarkernes fjelltrakter, der den icke är sällsynt. Mera sällan träffas den i södra och medelsta Sverige. I Norden förekomma varieteterne tillhuggan med hvarandra, men i sydligare provinser af vår halfsö träffas endast var. *b.* Denne sednare är funnen wid Anneberg (Whm.) och Hamneda (Zett.) i Småland; i Trpsferums socken af Kalmare Län (Wahlb.); på Öland (Zett.); wid egendomen Ringstad i W. Gneby socken nära Norrköping (Stenh.), och i Westmanland, såsom i den så kallade Munkstikten nära Norberg och wid byn Fragg (Fredrichs.). Desutom förekomma

båda varieteterna i Serna Socken m. fl. st. i Dalarne (Bhm.); i Vermland (Wahlb.); wid Skallstugan, Salltsjårnstugan och Mullsfjellet i Jemtland (Zett.); wid Quickjock (Bhm.), Kengis, Karefuando och Lycksele (Zett.) i Lappmarkerne, samt i Österdalen, Gudbrandsdalen, på Dovre (Siebke. Bhm.) och wid Tromsö (Frigelius) uti Norrige. Flygtiden infaller i Juli och Augusti månader.

Artbeskr. Antennerne ofwan gulbruna, undertill hwitagtiga.

Klubban brun, i spelsen rödgul. Balperne gulagtiga, ofwan och nedan rödgula, ludna. Ryggskölden rödgult luden. Abdomen ofwan med rödgula, korta, glesta hår, undertill gulagtig med tätare ludd. Bröfket rödgult, ludet. Fötterna rödgula.

Hanne: Wingarne ofwan rödgula med svart, af rödgult öfverpubrad bas, och samma svarta teckningar som hos samfläktingarne; likwäl äro de här betydligt finare, så att det öfwer diffen gående, wågiga och på flera ställen afbrutna tverbandet är smalare, isynnerhet på bakvingarne. Undertill äro de rödgula wingarne försedda med mycket finare, stundom knappt märkbar svart teckning; wingspetsarne ljusgula med en eller flere rödbruna, utåt något greniga fläckar. Bakvingarne, hwilka i främre hörnet äro skarpt winklade, hafwa på undre sidan rödbrun grundfärg. Närmast basen finnas 3—4 aflångt-rundade fläckar, af hwilka endera är silfwerhvit och de öfrige merendels gula. I det derpåföljande tverbandet af grundfärgen finnes i distäktet en liten, stundom omärklig, silfwerhvit punkt. Öfwer midten går ett af oliformiga fläckar sammansatt tverband, hwilket är gult; den breda, snedt triangelformiga fläck, som afstilles genom distäktets tvernerw är silfwerhvit. Stundom äro också den ytterste och innerste af dessa fläckar silfverfärgade, oftast likwäl blott till indre hälften. Längs utkanten finnas 7 silfverfärgade, inåt brunkantade, trubbiga fläckar och emellan dessa samt midtelbandet finnes en rad bruna punkter, stundom omgifne hwardera med en gul ring och försedde med pupill, och inom dessa synes en silfwerhvit, på midten afbruten tverstrimma. Wid utkantens fjunde silfverfärgade fläck finnes

en konist gul fläck, hwilken sträcker sig inåt wingen långt fram-
om den bruna punkttraden, så att den ena bithörande punkten
kommer att ligga uti selswa fläcken, der den äfwen ofta synes
otpbilig. Fransarne äro gula med bruna fläckar.

Sonan lifnar hannen, men har dystrare grundfärg och
den swarta teckningen på wingarnes undre sida gröfre.

Var. b. Lifnar föregående, men har bredare och mera af-
rundade wingar samt är större. Desz swarta teckning ofwan
och undertill är något gröfre, och den konista gula fläcken på
halwingarnes undre sida sträcker sig merendels ej så långt inåt win-
gen, som hos föregående, utan slutar oftast innan den hinner den
mörkbruna punkttraden. Lifväl äro desza karakterer ej constanta,
utan öfvergångar finnas, så att man ofta befinner sig i villrå-
dighet till hwilkendera ett erhållet exemplar skall föras, hwar-
före man ej kan med åtskilliga Författare anse denna varietet
för egen art.

Varven *) — — — — —

Anm. Uti medlersta Europa förekommer en art, som äfwen blif-
wit räknad till Sveriges Fauna, men då, så widt jag wet, ingen nu lef-
wande swenskt Entomolog har sig någon local inom vårt land bekant, der
den skulle finnas, uppföres här tills widare blott desz diagnos, utkastad efter
exemplar från Tyssland:

*) Treitschke anför p. a. st. Olibners beskrifning af en larv, som anses
tillhöra denna art. Beskrifningen återgifwes här i öfversättning:

"Den fanns af Schiffermüller i öfra Österrike på bladen af *Viola
montana*. Desz huswud war hjertformigt, utan märkbara tornar, korthårigt
och swart. Desz kropp hade på halöringen längre eller trubbigare tornar,
än på de öfrige kroppöringarne. På den 1:sta, 2:dra, 3:dje och 11:te sak-
nades sidotornarne. Den war glänsande sammetswärt, blott ryggtornarne
stodo alla på citrongula fläckar och woro äfwen till deras midt af samma
färg; öfwer ryggen syntes en bredare, på sidorne brunagtig strimma. Göt-
terne woro mörkt rödbruna. Den förpupades den 23 Maj, men förderf-
wades medan den ännu war mjuk."

Argynnis dia LIN. *)

Alis supra fulvis, nigro maculatis; posticis infra fusco-purpureis, basi flavo argenteoque maculatis fascia obsoleta maculisque marginalibus argenteis, puncto flavo, nigro circumcincto in disco, serieque postica punctorum fuscorum subocellatorum.

Wingarne ofwan rödgula, svartfläckiga: de bakre undertill brunt purpurfärgade, med gula och silfverfärgade fläckar wid basen, ett otydligt silfverfärgadt tverband öfver disken och fläckar af samma färg wid utfanten, och en gul med svart omgifven punkt i disken, samt nära utfanten en rad bruna, till en del ocellulika punkter.

Syn. PAP. *dia* LIN. S. N. II. 725. 207. FABR. E. S. III. 4. 255. 792. ARGYNNIS OCHS. Schm. I. 4. 64. GOD. et DUP. Lepid. I. p. 66. pl. 4 secund. f. 4. pl. 4. quint. f. 4. DALM. Pap. Sv. 72. 42. ZETT. Ins. Lapp. 898. 43. II—S. Text. 4. 32.

Deß flygtid infaller i Maj, Juni och Augusti månader. Utan närmare nyvgift af local anføres den såsom Lappst af Dalman och Zetterstedt, på Schönherr's och Gyllenhaals auctoritet. Den sednare skulle hafwa funnit den någonstädes i Lappmarkerne.

6. Friggas Perlemorfjäril (Argynnis frigga Thbg.)

Alis supra fulvis basi maculisque distinctioribus nigris; posticis infra basi brunneis, postice testaceo-purpurascens; fascia media macularum fulvarum albarumque, serie punctorum fuscorum, linea maculari submarginali ejusdem coloris, mar-

*) Intra limites Scandinaviæ non occurrit quantum mihi innotuit. A peregrinatoribus hujus ævi in Lapponia non reperta. In collectionibus Entomologorum Suecorum et in Museo Academiæ Scien. Reg. Holm. specimina quidem plura exstant, indicatum tamen non est si suecana nec ne. — ARGYNNIS *carichlea* HERBST — (OCHS. Schm. IV. 444. DALM. P. S. 72. 43. ZETT. Ins. Lapp. 898. 44. ARG. *arctica* ZETT. I. c. 899. 48. ARG. *Boisduvali* SOMM. BOISD. Icon. t. 20. f. 5. 6.) in Lapponia Scandinavica non est reperta. A Dom. QUENSEL tantum collecta, ut videtur in Lapp. Rossica I. in Finlandia. Nec in Finmarkia Norvegiæ occurrit. Specimen, e Groenlandia ortum, a Celeberr. ZETTERSTEDT descriptum et a me in museo ejus ditissimo collatum, est ARG. *carichlea* et cum ARG. *Boisduvali* sat bene convenit, quare hoc nomen in synonymia citare non læsitavi.

ginequo immaculato; macula ovata discoidali fasciæ lineæ nigra obliqua subdivisa. L. al. exp. 40—43 millim.

Wingarne ofwan rödgula med swart bas och swarta, större fläckar; de bakre undertill wid basen bruna, bakåt blekt rödgrå, med ett band af gula och hwhita fläckar öfwer midten, en rad, bruna punkter, och närmare utkanten en af fläckar bestående linia med samma färg; fjelfwa utkanten ofläckad och medlersta fläcken i midtelbandet äggformig, delad genom en inad swart streck. L. e. wingsp. $1\frac{5}{8}$ — $1\frac{3}{4}$ t.

Syn. Pap. *frigga* Thbg. Diss. vol. III. 47. Hüb. Pap. t. 9. f. 49. 50. Argynnis Ochs. Schm. I. 4. 74. IV. 45. Dalm. Pap. Sv. 73. 44. Zett. Ins. Lapp. 898. 45. God. et Dup. Lepid. Suppl. I. 420. pl. 49. f. 3—5. Boisd. Icon. 400. 4. pl. 49. f. 6. 7. H—S. Text. I. 32.

Denna fällsynta fjäril tillhör sanka ångar uti vår halfös nordliga provinser, der den sparsamt förekommer under Juni och Juli månader. Utan att stiga högt upp på fjellen, föredrager den sådana ställen der widet och andra pilbuskar wexa. Uti Öre Socken i Dalarne är den funnen af Prof. Boheman, hwilken äfwen träffat den wid Quickjock i Luleå Lappmark. Wid Öfre Torneå är den funnen af Prof. Wahlberg. Ehuru det är troligt att den äfwen träffas i Norrsta Finmarken, känner jag ej detta med säkerhet.

Artbeskr.*) Antennerne ljusbruna med hwitagtiga ringar. Klubban brun, i spetsen gulagtig. Palperne gulagtige med bruna hår. Ryggskölden och abdomen swart. Fötterna ljusbruna.

*) *Descr.* Antennæ fuscæ albido annulatæ. Clava fusca apice fulvido. Palpi fulvidi pilis fuscis. Thorax ut et abdomen fuscus. Pedes dilute fuscæ.

Mas. Alæ supra fulvæ, ad basin nigro-fuscæ, maculis nigris ut in congeneribus; prope marginem anteriorem immaculatum adest lineæ transversa nigra. Alæ anticæ infra pallide fulvæ, ita maculatæ ut in parte superiore, sed apicibus ferrugineo-maculatis. Alæ posticæ a basi usque ad medium ferruginæ macula alba ad basin fasciæque macularia, arcuata, in medio. Macula fasciæ, margini antici proxima, alba, cum macula basali fere connexa, quo fit ut area triangularis ferruginea includatur; macula discoidalis fasciæ (ad apicem areolæ locata) ovata, alba, lineæ transversa nigra oblique divisa; maculæ omnes reliquæ fasciæ hujus fulvæ,

Samme: Vingarne ofwan rödgula, wid basen swarta, tecknade med swarta fläckar såsom hos samslägtingarne; nära utkanten, hwilken för öfrigt är ofläckad, finnes en sammanhängande swart tverlinia. Framvingarne undertill bleft rödgula med samma swarta teckning som på öfre sidan, men med brunfläckiga spetsar. Bakvingarne från basen, utöfwer midten, rödbruna med en hwit fläck wid basen och ett af fläckar bestående, båg böjdt band öfwer midten. Tverbandets, wid framkanten belägna fläck, hwit, nästan sammanhängande med basens fläck, hwari genom ett triangelformigt, rödbrunt fält inneslutes; tverbandets distfläck (belägen wid distfältets slut) äggformig, hwit, delad genom en tvergående, sned, svartagtig linia; tverbandets öfriga fläckar rödgula, merendels öfverpudrade med mörkare färg. I distfältet finnes ofta en swart punkt, som omgifwes af en gul cirkel. Bakwingarnes yttre hälft bleft rödgrå med en hwitagtig, oregelbunden fläck i främre kanten och en rad bruna, stundom ocellformiga punkter. Nära yttre kanten finnes en tvergående, mörkbrun linia, sammansatt af aflånga fläckar. Yttre kanten ofläckad (utan de wanliga hwita fläckarne). Transarne hwitagtiga med bruna fläckar.

Honan skiljes från hannen genom mörkare färg ofwan och renare tverband på bakwingarnes undre sida.

colore obscuro plerumque adpersæ. In areola discoidali punctum nigrum, flavo circumcinctum, sæpe adest. Pars posterior alarum posticarum est testaceo-purpurascens macula irregulari albida ad marginem anticum, serieque punctorum fuscorum, interdum subocellatorum. Prope marginem anteriorem est linea fusca, transversa, ex maculis oblongis composita. Margo exterior immaculatus (absque maculis ordinariis albis). Fimbriæ albæ, maculis fuscis.

Femina a mare differt colore supra obscuriore et fascia puriore in parte inferiore alarum posticarum.

Hab. ad Ore Dalecarliæ; ad Quickjock et Öfre Torneå Laponiæ mensibus Junio et Julio, rarius.

7. Gråkantade Perlemorfjärilen

(Argynnis thore Hüb.)

Alis supra fulvis basi maculisque majoribus nigris; posticis intra basi fulvo-testaceis fascia maculari media flava, ad extremum ferrugineis maculis fusco-ferrugineis subocellatis maculisque marginalibus roseo-albescentibus; macula oblonga discoidali fasciæ lineæ obscuriore transversa tenui in maculas duas inæquales divisa. L. al. exp. 45—50 millim.

Wingarne ofwan rödgula med svart bas och större svarta fläckar; de bakre undertill gulbruna med ett af fläckar bestående gult band öfver midten, i öfre hälften rostbruna med mörkt rostbruna, något ocell-lika fläckar och i utkanten med rosenfärgadt hvita fläckar; medlersta fläcken i midtelbandet aflång och delad genom en mörk och fin tverlinea i tvänne olifstora fläckar. R. e. wingsp. $1\frac{3}{16}$ —2 t.

Syn. Pap. thore Hüb. Pap. t. 444. f. 574—573. Argynnis Ochs. Schm. I. 4. 74. anm. IV. 45 et 444. Treitsch. X. 1. 14. Dalm. Pap. Sv. 74. 46. Zett. Ins. Lapp. 899. 17. Boisd. Icon. 96. pl. 20. f. 3. 4. God. et Dup. Lepid. Suppl. I. 448. pl. 49. f. 4. 2. H—S. Text. I. 34. t. 30. f. 438. 439.

Denna är en af Scandinaviens sällsyntare fjärilarter och tillhör blott fjelldalarna uti de nordligare landskaperne, der den träffas i Juli månad. Hittills är den endast funnen i fjelldalarna norr om Dovre i Norge (Vhm.) och uti en dalsträckning vid Balisjellet nära Quicksjök i Lappmarkerne (Wahlb.).

Artbeskr. Antennerne ofwan bruna med whitagtiga ringar, undertill rödgulagtiga. Klubban mörkbrun med rödgul spets. Balverne gulagtiga, undertill med rödgula, ofwan med brunagtiga hår. Ryggskölden svart med mörkt rödgul ludd. Abdomen ofwan svart med gläsa rödgula hår, undertill gulagtigt grå. Bröfvet rödgult, ludet. Fötterne rödgula.

Stämme: Wingarne ofwan rödgula, vid basen (i ömhet de bakre) svarta med de vanliga svarta teckningarne, hvilka likväl hos denna art äro gröfre, än hos samsläktningarne. Utsanternes äro svarta med otydliga rödgula fläckar. Undertill äro

framvingarne i disken rödgula och i wingspetsarne blekgula med smärre rostbruna fläckar och fluggningar. För öfrigt hafwa de nästan samma swarta teckning som oswan. Bakvingarne äro wid basen gulbruna, utan bestämda, gulagtiga fläckar; öfver midten går ett af fläckar bestående gult tverband, som bakåt begränsas af en svartagtig, tandad linia; medlersta fläcken af nämnde tverband är aflång och närmare indre kanten delad genom en böjd, brunagtig, fin linia, hwilken, äfwen gående öfver den närmaste fläcken, utmärker diskfältets tvärvägar. Öfre hälften af bakvingarne är rostbrun med följande märkbara teckning: i framkanten och i indre kanten nära avallhörnet finnes på hvardera stället en blåagtigt hvit, i rosenrödt stötande fläck, hwilken på förstnämnde ställe är störst; derefter synas 5—6 runda, i rad ställda, mörkt rostbruna fläckar, hwilka till större eller mindre del något lifna oceller; 2:dra eller 3:de af dessa (från infanten räknadt) ligga uti en gulagtig större fläck; långs utkanten finnes ett blåagtigt hvit, i rosenrödt stötande, af aflånga fläckar bildadt tverband, som är mer eller mindre tydligt och inåt begränsas af ett rostbrunt fläckband. Fransarne hwitgula med bruna fläckar.

Honan är oswan ljusare och undertill på bakvingarne mörkare än hannen, men har likväl på sednare stället tydligare teckning än denne.

b) Första nervens på bakvingarne gren krökt, utåtböjd.

8. Prydliga Perlemorfjärilen

(*Argynnis euphrosyne* Lln.).

Alis supra fulvis nigro maculatis; posticis infra ferrugineis maculis basalibus fasciaque media maculari flava; macula basali, macula intermedia fasciæ indivisa, maculisque marginalibus argenteis, serieque marginali punctorum nigrorum subocellatorum. L. al. exp. 45—50 millim.

Wingarne ofwan rödgula, svartfläckiga; de bakre undertill rost-röda med gula fläckar wid basen, och ett af lifsfärgade fläckar bestående band öfver midten; en fläck wid basen, medlersta fläcken af midtelbandet och fläckarne i utkanten lifsfärgade; derjemte nära utkanten en rad swarta, något ocellformiga punkter. L. e. wingsp. $1\frac{13}{16}$ —2 t.

Syn. Pap. *euphrosyne* Lin. F. S. n. 1069. Fabr. E. S. III. 4. 447. 450. Hüb. Pap. t. 6. f. 28—30. Argynnis Ochs. Schm. I. 4. 58. IV. 44. Treitsch. X. 4. 10. Dalm. Pap. Sv. 70. 8. Zett. Ins. Lapp. 896. 8. God. et Dup. Lepid. I. 61. pl. 4. f. 4. pl. 4. tert. f. 2. H—S. Text. I. 33.

Var. b. { Minor: marginibus exterioribus alarum supra nigris
fulvo-maculatis.
Mindre: wingarne utkanter ofwan swarta med rödgula fläckar.

Var. c. { Alis supra nigro-fuscis maculis fulvis.
Wingarne ofwan svartbruna med rödgula fläckar.

Syn. Pap. *pingal* Herbst. t. 270. f. 4—3. Arg. *Nepele* H—S. t. 76. f. 371. 372.

Churu denna art icke kan räknas bland våra allmänaste fjärilar, finnes den dock spridd öfver hela vår halfö ända upp i Lappmarkerne. På sanka ängar i fogstrakter träffas den twenne gånger om året. Första gången i Maj och Juni samt andra gången i Augusti. Var. b är af Prof. Zetterstedt hemförd från Lappmarkerne, men förekommer äfwen i de södra provinserne. Var. c har Prof. Boheman träffat wid Serna Sothen i Dalarne och på Dovre i Norge.

Artbeskr. Antennerne bruna med hvita ringar. Klubban brun, i spetsen rödgul. Palperne ljusgula, med rödgula, i spetsen brunagtiga hår. Ryggförliden rödgul, luden. Abdomen ofwan med rödgula, glefa hår, undertill gulgrå. Bröfvet gulrött, ludet. Fötterna rödgulagtiga.

Samme: Wingarne ofwan rödgula med de wanliga swarta teckningarne; utkanterne swarta med en rad swarta finnemellan fliska fläckar. Framvingarne undertill i biffen rödgula med samma swarta

teckning som osvan; wingspetsarne blekgula med roströda fläckar. Bakwingarne undertill roströda med gula fläckar wid basen och ett tverband af på lifa sätt färgade, olifformiga fläckar öfver midten. Indre fläcken wid basen, midtelfläcken af tverbandet, hwilken är odelad, och 7 trekantiga, inåt med rostbrunt begränsade fläckar i utkanten silfwerfärgade, glänsande. Emellan midtelbandet och utkanten är wingens roströda grundfärg delad af gula flammor, af hwilka en uppgår från utkanten, en annan går inåt wingen från framkanten och åter en annan från infanten. På nämnde del af wingen finnes äfwen en rad svartbruna punkter, som något lifna oceller. I diffältets midt finnes en liten, svart, med rödgult omgifwen punkt. Fransarne hwitgula med bruna fläckar.

Donan liknar hannen.

Var. b. är mindre än föregående och skiljer sig från denne blott deri, att de swarta fläckarne i utkanterna på wingarnes öfre sida sammanhånga stösemellan och med utkantens swarta färg, så att rödgula fläckar af grundfärgen derigenom inneslutas.

Var. c. har framwingarne osvan i diffen rödgula med oredig, sammanflytande svart teckning. Utkanten är svartbrun med en rad ljusgula fläckar. Bakwingarne äro osvan svartbruna med en rad rödgula fläckar i utkanten och blekgul infant. Undertill äro de främre från roten, utöfver midten, längs infanten svartbruna, därefter rödgula med oredig svart teckning; utkanten och wingspetsen hwitgul, den förra med otydliga spår till de wanliga swarta vinkelfläckarne. Bakwingarne svartbruna med rödgula flammor; för öfrigt lik föregående.

Varven är svart med svartbruna tornar och tvenne små hwhita streck på hwarje kroppsring, hwilka bilda en rygglinia. Lufthålen äro belägne uti en hwitgrå linia. Sulshafarne äro rödbruna. Den öfverwintrar och lefwer på arterne af släktet *Viola*, såsom öfrige larver till perlemorffjärilarne. **Dupan** är brungrå, trubbig, och har flera silfwerfärgade punkter på bröst- och abdominal-regionen. (*Treitsch*).

- 2) Framvingarnes nerver 10. Första nervens på framvingarne gren rät.

9. Orangefärgade Perlemorfjärilen

(Argynnis ino Esp.)

Alis supra fulvis nigro-maculatis; posticis infra flavis maculis basalibus fasciaque media maculari testaceis, serie punctorum ocellatorum in fascia interrupta rubescente; macula discoidali fasciæ mediæ linea transversa fusca in maculas duas fere æquales divisa. L. al. exp. 35—40 millim.

Wingarne ofwan rödgula, svartfläckiga; de bakre undertill gula med ljusgula fläckar wid basen och ett af lifa färgade fläckar bestående tverband öfver midten samt en rad ocell-lifa punkter i en afbruten rödaktig bindel; medlersta fläcken i midtelbandet genom en tvergående brun linia delad i twenne nästan lifa stora fläckar. *l. e.* wingsp. $1\frac{7}{16}$ — $1\frac{5}{8}$ t.

Syn. Pap. ino Esp. Schm. I. 76. c. 26. f. 1. a. b. p. 125. Argynnis Ochs. Schm. I. 4. 69. IV. 45. et 110. Treitsch. X. 1. 44. Dalm. Pap. Sv. 73. 45. Zett. Ins. Lapp. 898. 16. God. et Dup. Lepid. II. 63. pl. 8. f. 3. 4. II—S. Text. I. 34. Pap. dictynna Hüb. Pap. t. 8. f. 40. 41.

Denna fjäril är en af de allmänaste arterne inom släktet och förekommer i alla provinser, såväl af Sverige som Norge, de nordligaste ej undantagne. I Juni och Juli månader är den allmän på alla ångar, isynnerhet i skogstrakterne, och träffas äfven i Augusti. I västra och södra Europa finnes den ej.

Artbeskr. Antennerne ljus bruna, undertill rödgulagtiga. Klubban svart, i spetsen rödgul. Palperne blekgula med mörka spetsar och rödgula hår. Huggfölden rödgult luden. Abdomen ofwan svart med forta, glefa rödgula hår, undertill gulagtigt grå. Bröfset gulagtigt, ludet. Fötterne rödgula.

Sanne: Wingarne ofwan rödgula, med swarta teckningar såsom hos samsläktningarne; uitanten bredt svart med en rad swarta, merendels stilda fläckar derinnansför. Undertill äro framvingarne tecknade nästan såsom på öfre sidan, men hafwa ljus-

gula spetsar med rostfärgade fläckar. De bakre äro undertill gula med rostgula fläckar wid basen och ett dylikt af fläckar bestående band öfver midten, hwilket wid infanten ofast är betäckt med mörka atomer. Midtelfläcken af detta band är delad i twenne nästan likstora hälfter genom en fin, brun linia, motsvarande distfältets tvernerb. Emellan midtelbandet och utfanten äro wingarne gula med rödbrun fluggning, hwilken på midten är afbruten af grundfärgen och uti hwilken finnes en rad gula punkter, hwardera omgifwen af en swart ring. Nära midtelbandet finnes i samma fluggning ett afbrutet, hwitagtigt, mer eller mindre violett tverband. I utfanten går en swart linia och innanför denna twenne andra, rödbruna. Fransarne hwita med bruna fläckar.

Honan liknar hannen.

Varven har på hwitgul grund bruna tornar med swarta hår, långstrimmor och enskilda streck af samma färg. Hufvudet är brunt, hjertformigt, beladt genom en blekgul strimma. Den skall lesa på *Urtica urens*. Pupan är gulbrun med gula spetsar.

10. Lilla Perlemorfjärilen (*Argynnis latonia* Lin.)

Alis anticis margine exteriori exciso, supra omnibus sulvis nigro maculatis; posticis infra ochraceis maculis magnis, minoribus interjectis argenteis serieque postica ferruginea ex ocellis argenteo-pupillatis. L. al. exp. 40—50 millim.

Gramwingarne i yttre fanten utskurna; alla wingarne ofwan rödgula, svartfläckiga; de bakre undertill ochragula med stora och mellanliggande mindre silfverfärgade fläckar, samt en rad rostbruna oceller med silfverfärgade pupiller. L. c. wingsp. $1\frac{5}{8}$ — $2\frac{1}{16}$ t.

Syn. Pap. *latonia* Lin. F. S. n. 1068. Fabr. E. S. III. 4. 146. 449. Hübn. Pap. t. 44. f. 59. 60. t. 120. l. 643. var. Text. p. 44. 44. *Argynnis* Ochs. Schm. l. 1. 80. IV. 45. & 117. Dalm. Pap. Sv. 69. 5. Zett. Ins. Lapp. 895. 5. God. et Dup. Lepid. l. 59. pl. 3. f. 3. pl. 4. tert. f. 4. II—S. Text. l. 29.

Denna wackra art är på åkrar och ängar i södra Sverige ganfka allmän under Maj och Juni, samt derefter ämho under Augusti och September månader. Sednare generationen synes wara talrikare än den första. I nordligare landskap af medlersta Sverige tyckes arten deremot wara sällsyntare, såsom förhållandet är omkring Norberg i Westmanland (Fredrichs.), och träffas den inom egentliga Lappmarkerne, så är den der åtminstone högst rar. I Norrige förekommer den med säkerhet ända till Trondhjem (Siebke).

Artbeskr. Antennerne bruna. Klubban brun, i spetsen rödgul. Palperne ofwan rödgula, undertill hwita, ludna. Hufswud och ryggsköld med rödgul ludd. Abdomen ofwan swart med glesa rödgula hår, undertill hwitgul. Bröfket hwitludet. Fötterne gulagtigt hwita.

Stämne och hona. De främre wingarne i utkanten utskurna; de bakre i samma kant småtandade. Alla wingarne ofwan rödgula, wid roten mörkare, med strödda runda och aflånga fläckar. Längs utkanterne löpa twenne parallela swarta linier, innanför hwilka i framwingarnes spetsar stå på swart grund twenne smärre, merendels blekt rödgula fläckar. Undertill äro framwingarne rödgula, tecknade med swarta fläckar såsom på öfre fidan, men i wingspetsarne finnes en rostgul flamma, hwaruti fem större, silfwerfärgade fläckar äro belägna, jemte twenne mörka silfwerpupillerade punkter. Bakwingarne äro undertill flammigt odragula med mörkare utkanter, längs hwilka finnes en rad af 7 större silfwerfärgade fläckar och innanför dessa lika många rostfärgade punkter, hwardera försedd med en silfwerfärgad pupill. För öfrigt finnas spridda på hwardera bakwingen 9 större silfwerfärgade fläckar, af hwilka den störste, som är oval, är belägen i wingens midt. Emellan dessa finnas flera eller färre mindre af samma färg.

Barven är brunagtigt grå med hwitagtig linia längs ryggen, twenne brungula sidolinier och segmentkanter af samma färg. Tornar och fötter äro odragula. Den lefwer af *Primula*, *Anchusa* och *Viola*. Pupen är mörkbrun med en gul linia längs

ryggen, en hvit fläck wid ändan af wingsliborne, hvita tverband på abdominalregionen och flera, något upphöjda gulda och silfverpunkter.

II. Subdiv. Fötternes lår undertill nakna. Vingnerverne 10. Första vingnervens på bakvingarne gren krökt, utåtböjd.

11. Bastard-Perlemorfjärilen (*Argynnis niobe* Lin.)

Alis anticis margine exteriore fere recto; omnibus supra fulvis nigro maculatis; posticis infra ferrugineo variegatis maculis subquadrangularibus flavis (aut argenteis), ocellis ferrugineis argenteo-pupillatis lineisque posticis duabus approximatis, parallellis fuscis. L. al. exp. 50—55 millim.

Mas nervis alarum anticarum 2 et 3 supra vix incrassatis.

Femina alis ad basin nigro-fuscis, nervis alarum anticarum aequalibus maculisque apicis pallide flavis.

Framvingarne i httre fanten nästan rätta; alla wingarne ofwan rödgula, svartfläckiga; de bakre undertill rostfärgadt flammige med gula (eller silfverfärgade), fjärfviga fläckar och rostfärgade, silfverpupillerade oceller, samt i utfanten tvänne närstående mörkbruna, parallela linier. L. e. wingsp. $2\frac{1}{16}$ — $2\frac{1}{4}$ t.

Hannen har 2 och 3 nerverne på framwingarne's öfre sida föga tjockare än de öfrige.

Honan, hvar's wingar äro wid basen nästan svartbruna, har wingnerverne lifformige, men i framwingarne's spetsar blekgula fläckar.

Syn. *Pap. niobe* Lin. F. S. n. 1067. *Fabr.* E. S. III. 1. 147. 452. *Hüb.* Pap. t. 12. f. 64. 62. t. 194. f. 964. 962. (var.) *Text.* 12. 17. *Argynnis* Ochs. Schm. I. 4. 83. IV. 15. & 148. *Treitsch.* X. 1. 16. *Dalm.* Pap. Sv. 67. 4. *Zett. Ins.* Lapp. 895. 4. *God. et Dup.* Lepid. II. pl. 7. f. 3—5. II—S. *Text.* I. 36. t. 32. f. 142—146. (var.).

Var. b. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Alis posticis infra maculis argenteis.} \\ \text{Bakwingarne undertill silfverfläckade.} \end{array} \right.$

Isfrågawarande art förekommer i nästan alla krogstrakter, på torra backar och betesmarker, hwarest den isynnerhet besöker der växande arter af Thymus och Viola. Sällan finner man den på ängar och sanke ställen. Den är allmänare i södra Sverige, än i medlersta och norra, ehuru den likväl äfwen blifwit anmärkt inom Rappmarkerne, såsom wid Quidsof (Bhm.). I Norge finnes den åtminstone wid Christiania (Siebke). Dess flygtid infaller i Juli och Augusti månader.

Då denna fjäril så liknar följande art, att den blott föga skiljes derifrån, är det öfverflödigt att lemna en omständligare beskrifning, utan uppföres här endast en jemförelse mellan de partier, hwaruppå båda arterne lättast skiljas från hwarandra:

Arg. niobe.

Fjärilen i allmänhet mindre. Kroppen föga större än hos *Arg. latonia*.

Framwingarne i utfanten rundade, eller nästan rätta, knapt märkbart inswängda.

Färgen ofwan dystrare rödgul, isynnerhet hos honan.

Wingarne ofwan wid basen mörkbruna, hos honan nästan swarta.

Bakwingarne undertill oftast med gula, sällan med silfverfärgade fläckar.

Bakwingarne undertill (isynnerhet hos var. b.) utöfver midten skarpt rostfärgadt flammiga på

Arg. adippe.

Fjärilen i allmänhet större. Kroppen af nästan samma storlek som hos *Arg. aglaja*.

Framwingarne i utfanten merendels temligen tydligt inswängda.

Färgen ofwan lifligt rödgul.

Wingarne ofwan wid basen mörkare, men likväl icke bruna.

Bakwingarne undertill oftast med silfverfärgade, sällan med gula fläckar.

Bakwingarne undertill blott wid basen och utmed infanten rostfärgadt flammiga, men matt

blekgul botten, så att fjärilen här är mörkare, än *Arg. adippe*.

Längs utkanten af bakvingarnes undre sida löpa nära hwarandra tvenne parallela mörkbruna, tydliga streck.

Hannens 2 och 3 nerver på framvingarnes öfre sida löpa med, eller söga tjockare än de öfriga.

Framvingarnes spetsar hos honan osvan merendels ljusgulfläckiga.

Fläckarne på bakvingarnes undre sida merendels mindre.

Det svarta streck, hvarmed de fläckar, som bilda midtelbandet på bakvingarnes undre sida, inåt begränsas, ofta också det streck, hvarmed samma fläckar utåt begränsas, tydligt och skarpare markeradt än hos *Arg. adippe*.

och blekt, så att fjärilen här är ljusare än *Arg. niobe*.

Längs utkanten af bakvingarnes undre sida löpa tvenne, temligen vidt från hwarandra fläda rostbruna parallela streck, af hvilka det indre är mätt och otydligt.

Hannens 2 och 3 nerver på framvingarnes öfre sida starkt tilltjocknade, upphöjdt fjälliga.

Framvingarnes spetsar hos honan osvan med rödgula fläckar, såsom grundfärgen.

Fläckarne på bakvingarnes undre sida merendels större.

Det svarta streck, hvarmed de fläckar, som bilda midtelbandet på bakvingarnes undre sida, inåt begränsas, och oftast det streck, hvarmed samma fläckar utåt begränsas, otydligt och mattare än hos *Arg. niobe*.

Hannen är till vingarnes öfre sida ljusare rödgul än honan och ej så mörkt brun, som denna. Var. b. stljer sig endast derigenom att bakvingarne på undre sidan hafva flsiverfärgade i stället för gula fläckar. Den är sällsyntare, än den normala formen.

Varven är brunagtig med en hvit, svartkantad linia längs ryggen och en svart längs hvardera sidan. Emellan ryggen och sidans linier står på hvarje kroppsring en trekantig hvit fläck. Tornarne äro hvitagtiga. Liksom de samsläktningar lefwer den företrädesvis på arterne af släktet *Viola*.

12. Allmänna Perlemorfjärilen

(*Argynnis adippe* Lin.).

Alis anticis margine exteriore nonnihil exciso; omnibus supra fulvis nigro maculatis; posticis infra virescenti-flavis maculis subquadrangularibus argenteis (aut flavis), ocellis ferrugineis argenteo-pupillatis lineisque posticis duabus distantibus ferrugineis, interiore obsoletiore. L. al. exp. 55—65 millim.

Mas: alis anticis nervis 2—3 in medio valde incrassatis.

Femina: alis anticis nervis inter se æqualibus maculisque apicis fulvis.

Framvingarne's öfre kant något utfuren; alla wingarne ofwan rödgula, svartfläckiga; de bakre undertill grönagtigt gula med silfverfärgade (eller gula), fyråbida fläckar och rostfärgade, silfverpupillerade oceller, samt i utkanten twenne vidt från hvarandra stilda, rostbruna linier, af hvilka den indre är otydligare. L. e. wingsp. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{11}{16}$ t.

Hannen har 2 och 3 nerverne på framvingarne's öfre sida starkt tilljocknade.

Honan har wingnerverne stämellan lika och i framvingarne's spetsar rödgula fläckar.

Syn. Pap. *adippe* Lin. S. N. I. 2. 786. 245. Fabr. E. S. III. 1. 446. 448. Hübn. Pap. t. 12. f. 63. 64. t. 174. f. 859. 860. t. 180. f. 888. 889. Text. 12. 16. *Argynnis* Ochs. Schm. 1. 1. 88. IV. 15. & 118. Treitsch. X. 1. 16. Dalm. Pap. Sv. 67. 3. Zett. Ins. Lapp. 895. 3. God. et Dup. Lepid. 1. 57. pl. 3. f. 2. pl. 3 secund. f. 2. II—S. Text. 1. 37. Pap. *Cydippe* (laps. calam.) Lin. F. Sv. 1066.

Var. b. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Alis posticis infra maculis flavis.} \\ \text{Bakwingarne undertill med gula fläckar.} \end{array} \right.$

Denna art, som öfver allt i södra och medlersta Sverige och inom Norge ända till Trondhjem är allmän på betesmarker och ängar, såväl i skogstrakter som på slättbygd, blir inom nordligare provinserne temligen sällsynt, men huru högt den egentligen stiger

mot norden är ännu icke utrönt. Dock synes den gå längre mot norr än föregående. Prof. Zetterstedt anför den såsom sällan förekommande i Lappmarken. Dess flygtid infaller i Juli och Augusti. Stundom träffas arten äfven i slutet af Juni.

Utbeffr. Antennerne bruna, undertill stötande i rödgult. Balperne hvitagtiga, ofwan rödgula och i spetsen brunagtiga. Hufwud och ryggsköld rödgula, tätt ludna. Abdomen ofwan svart, der och hwar med rödgult puder och ludd; undertill rödgulagtiga. Bröflet hvitgulagtigt, ludet. Fötternes lår af nyhnämnde färg, men tibier och tarser rödbruna. Framvingarne i yttre kanten märkbart inswängda; de bakre i samma kant småtandade.

Sanne: Wingarne ofwan rödgula med samma swarta teckning som hos samslägtingarne, utkanterna med tvenne, hvarandra närstående swarta streck och innanför dessa en rad swarta halfrånar, som sammanhånga med hvarandra och med närande swarta streck, så att derigenom fläckar af grundfärgen inneslutas. Undertill äro framvingarne såsom på öfre sidan, men wingspetsarne äro ljust gulagtiga med grönagtiga, understundom fliswerfärgade fläckar. Bakvingarne äro undertill blekgula med mörkare nerber och hafwa närmare basen blekgröna, sammanflytande flammor. Deras framlob är stundom flisweroglänfande och wid basen stå 3—4 smärre fliswerfärgade fläckar, derefter uti en tverrad 3:ne större, af hvilka den medlersta är störst och inåt och utåt begränsad af en svart linea; derpå följer ett vågigt band af fliswerfärgade, inåt och utåt svart eller mörkbrunt begränsade fläckar, hvilka gå från framkanten till anahörnet och äro af olika storlek. Längs utkanten går en rad af trubbigt trekantiga, inåt med rostbrunt begränsade, fliswerfärgade fläckar, och emellan dessa och midtelbandet finnas 4—5 rostfärgade fläckar, till större eller mindre antal försedde hwardera med en fliswerfärgad pupill. I utkanten går närmast fransarne ett svartagtigt streck och innanför detta, wid perlemorfläckarnes yttre kant, ett annat blekare rostbrunt; stundom ganfka otydligt. Fransarne äro blekgula med bruna fläckar.

Honan är ofwan af blystrare färg och har alla nerverne på framvingarne normala. För öfrigt lifnar hon hannen.

Var. b. lifnar förut beskifvna normala form och är sällsyntare än denna. Bakvingarnes undre sida hafwa blekgula fläckar i stället för de silfverfärgade. Endast de rostfärgade fläckarnes pupiller äro silfverfärgade.

Larven är brungrå med hwit, afbruten rygglinia, svartagtiga snedstreck på sidorna och lufware tornar. Dess moderplantor äro arterne af släktet *Viola*. Pupan är brungrå med blåagtiga eller silfverfärgade fläckar. Larven öfvervintrar.

13. Stora Perlemorfjärilen (*Argynnis aglaja* Lin.)

Alis anticis margine exterioro rotundato; omnibus supra fulvis nigro maculatis; posticis infra flavis, viroscanti obductis, maculis 21 ovatis argenteis. L. al. exp. 55—60 millim.

Framvingarne i yttre kanten rundade; alla vingarne ofwan rödgula, svartfläckiga; de bakre undertill blekgula, öfverdragne med grönt, och prydda med 21 ovala silfverfläckar. L. e. wingsp. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ t.

Syn. *Pap. aglaja* Lin. F. Sv. 1065. Fabr. E. S. III. 1. 144. 142. Hübn. Pap. t. 13. f. 65. 66. Text. 12. 15. *Argynnis* Ochs. Schm. I. 1. 91. IV. 18. & 119. Treitsch. X. 1. 18. Dalm. Pap. Sv. 66. 2. Zett. Ins. Lapp. 895. 2. God. et Dup. Lepid. I. 54. pl. 3 secund. f. 3. II—S. Text. I. 37.

Var. b. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Alis supra fusco inductis.} \\ \text{Wingarne ofwan öfverdragne med svartbrunt.} \end{array} \right.$

Syn. *Papilio æmilia Acerbi* Voy. au Cap. Nord. Vol. III. 175. pl. 15. f. 1. 2.

Stora Perlemorfjärilen är ganska allmän på vår halfö, såväl i södra som norra provinserne, likväl allmänast i de förra. Prof. Bettersedt har hemfört honom från Torneå Lappmark, der äfwen Prof. Wahlberg träffat varieteten b wid sjället Ballastunturi. Bestämmer och stogsångar, till och med de sankare af dessa, är artens egentliga wisselsort. Flygtiden infaller i Juli och Augusti månader.

Artbeskr. Kroppsbelarnes färg är lif föregående art. Framwingarnes yttre kant är rundad och bakwingarnes småtandad.

Hanne: Wingarnes färg osvan och framwingarnes undertill är lif Allmänna Perlemorfjärilens, endast med det undantag, att i framwingarnes spetsar undertill, längs utkanten, finnes alltid en rad matta silfverfärgade fläckar. Bakwingarne äro undertill blef-gula, men från basen, widt utöfver midten, öfverdragna med blef-grönt, så att grundfärgen blott der och hvar är synlig. Uti detta gröna fält finnas i samma ordning som hos föregående och i öfver-rader ställda silfverfärgade fläckar, af hvilka största delen äro äggformiga, widt från hwarandra stilda och sakna märkbarare mörkbrun eller svartagtig begränsning. Längs utkanten finnes en rad silfverfärgade, liksom ovals fläckar, som begränsas utåt af en grönagtig linia och inåt af fläckar med samma färg. I sjelfwa utkanten går ett svartagtigt streck. Gransarne äro ljust gula med mörkare fläckar.

Honan lifnar till färgen hannen.

Varven är svart med svarta tornar, gul rygglinia och röda fläckar. Såsom de samsläktningar lefver den på Viola och öfverwintrar. Pupen är mörkt rödbrun utan märkbara taggar. (Schf.).

14. Silfverstreckade Perlemorfjärilen

(*Argynnis paphia* Lin.)

Alis supra fulvis nigro-maculatis; posticis infra virescentibus fasciis transversis subinterruptis argenteis. L. al. exp. 60—65 millim.

Wingarne osvan rödgula, svartfläckiga, de bakre undertill grönagtiga med tvärgående, der och hvar afbrutna, silfverfärgade tvärband. L. e. wingsp. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{11}{16}$ t.

Syn. Pap. *paphia* Lin. F. Sv. 4064. Fabr. E. S. III. 1. 442. 438. Hübn. Pap. t. 14. f. 69, 70. t. 490. f. 935. 936. var. Text. 13. 19. *Argynnis* Ochs. Schm. I.

4. 96. IV. 15. & 187. Treitsch. X. 4 18. Dalm. Pap. Sv. 66. 1. Zett. Ins. Lapp. 895. 1. God. et Dup. Lepid. 1. 51. pl. 3. f. 1. pl. 3. secund. f. 1. II—S. Text. 1. 30.

Ghuru denna stora och prygliga art icke kan räknas bland våra allmännaste fjärilar, förekommer den likväl ej sällsynt der och hvar på vår half öfynnerhet i skogstrakterne. I Skåne träffas den hmnigt uti Nästen nära Lund (Zett.), wid B. Wramb (Viljeb.), wid Sjöbo (Bhm.), wid Håkanryd och Leingerud nära Skvetofsa, och den är äfwen en och annan gång funnen wid Trolle Hjungby. I Blekinge har jag träffat den wid Sölvesborg och Carlshamn. I Småland finnes den wid Anneberg (Bhm.) och wid Ufna i Tjust Härad af Calmare Län (Stenh.). I Östergötland wid Gottenwif af Zonsbergs Församling (Stenh.) förekommer den. Likaså wid Stockholm. Inom Norrige har den blifwit anmärkt wid Christiania, Drammen och Edsberg (Siebke). Hwarest den mot nordn upphör är obekant, men i norra delen af Westmanland träffas den ej (Fredrichs.). Prof. Bettersstedt upptager den bland Lappiska insekter såsom sällsynt. Flygtiden inträffar i Juli och Augusti.

Artbeskr. Kroppsdelenes färg är såsom hos Allmänna Perlemorffjärilen. Framvingarne äro i utfanten utskurne; bakvingarnes utfant småtandad.

Hanne: Vingarne ofwan af hög rödgul eller mörkeröf färg med de wanliga swarta teckningarne. De fyra första nerverne på framvingarne äro starkt tillstjofnade och swartfjällige; den femte merendels något mindre. Undertill äro framvingarne blefve, för öfrigt nästan lika färgade och tecknade som på öfre sidan, men hafwa grönagtige fläckar i wingipetsarne. Bakvingarne äro undertill gröna med fyra fliswerfärgade (icke af fläckar bestående) tverrband, af hwilka de 2:ne, som äro närmast basen, icke hinna wingarnes indre kant och det 3:dje går från framfanten till analhörnet, der det förenar sig med det sjerde, som löper längs utfanten. Emellan de båda flisnämnda banden stå twenne rader flörre, rundade, mörkt grönagtiga fläckar, hwilka antingen alla,

eller blott några, tillhörande fjästa raden, omslutas hwardera af en silfverfärgad ring.

Sonau liknar hannen till färgteckningarne, men har dyftare grundfärg ofvran och alla nerverne på framvingarne normala. Desutom är bakvingarnes undre fjäda lifligare grön, stundom med purpurglans. De swarta teckningarne på wingarnes öfre fjäda äro derjemte gröfre.

Varven, som lefwer på *Urtica*, *Rubus* och *Viola*, är brun med gula tornar. De längre halstornarne äro bruna och längs ryggen går en ljustgul linia, som i midten delas af en annan svart och på hwardera sidan begränsas af en mörkbrun. Puppen är brunagtig med röda fläckar på mellanfroppsregionen och svartagtiga på wingslidorne.

Släktet: *Vanessa* *). FABR. et AUCT.

(Aglais DALM.)

Antennæ longiores, rigidæ. *Clava* cylindrica oblonga, distincta et determinata.

Palpi capite multo longiores, adscendentes, apicibus subconniventibus, ad latera squamati, infra dense hirsuti, triarticulati. *Articulus* medius longissimus, læviter compressus; ultimus angustior (basali æqualis), conicus apice obtuso.

Oculi hirti.

Pedes antici breves, pilosissimi tarsibus maris inarticulatis femine articulis quinque, minutissimis, arcti conjunctis; ceteri ut in genere *Molitea* armati et instructi, sed articuli tarsorum aliam habent proportionem: 1:mus longissimus reliquis fere æqualis, 2:dus optio et hic quarto, minimo, longior; 5:tus tertio foro æqualis et unguibus quatuor, plerumquo validis, armatus.

*) Namnet borde egentligen skrivas: *Phanessa*, men då ofwansående skriftsätt är allmänt ansett, bibehålles det äfven här.

Alæ anteriores saltem angulato-dentatæ. Cellulæ discoidales costa spuria clausæ.

Costæ alarum posticarum 9 et anticarum 10, omnino ut in speciebus subdivisionis secundæ generis præcedentis collocatæ; costa nempe octava al. anticarum semper a septima separata, e latere cellulæ egrediens. Costa transversa, cellulas alarum claudens, inter costam 4 et 5 posticarum et inter costas easdem anticarum plus minusve evanescens, plerumque tumiditate tantum continuata *).

Antemerne långa, flywa. Klubban cylindrisk, aflång, ganska tydligt afstild från skaftet.

Walperne mycket längre än hufvudet, uppåttigande med sammanflående spetsar, på sidorna fjälliga, undertill tätt håriga, treledade:

*) In tabula sequente forma costæ transversæ alarum et ramuli costæ primæ posticarum in speciebus nostris indicatur:

A. Costa transversa alarum anticarum cum continuatione sua subtilissima.

1. Costa transversa alarum posticarum cum continuatione sua subtilissima.

1) Ramulus costæ primæ alarum posticarum rectus apice bimueronato: *V. atalanta*.

2) Ramulus costæ primæ alarum posticarum apice simplice.

a) Ramulus costæ primæ alarum posticarum reflexus: *V. Cardui*.

b) Ramulus costæ primæ alarum posticarum inflexus: *V. antiopa*.

c) Ramulus costæ primæ alarum posticarum rectus: *V. c. album*.

2. Costa transversa alarum posticarum cum continuatione sua sat distincta. Ramulus costæ primæ alarum posticarum rectus apice simplice: *V. urticæ* et *polychloros*.

B. Costa transversa alarum anticarum cum continuatione sua sat distincta, suberassa. Ramulus costæ primæ alarum posticarum simplex rectus: *V. io*.

medlersta leden ganska lång, lätt sammantryckt; den sista leden smalare (lifa stor med basleden), koniskt med trubbig spets.

Ögonen lubna.

Fötterna: de främre forta, ganska lubna med hos hannen oledade och hos honan otydligt femledade tarser; de öfrige såsom hos släktet *Melitæa* bewäpnade, men lederne i tarserne hafwa en annan proportion: 1:sta ganska lång, nästan lifa lång med de öfrige; 2:dra längre än den 3:de, denna längre än 4:de, som är minst; 5:te nästan lifa med den 3:de och bewäpnad med 4, merendels starka flor.

Wingarne: åtminstone de främre, winkligt tandade. Diffäkten slutne medelst en falsk twernerv.

Nerverne på bakwingarne 9, och på framwingarne 10, alldeles så ställde som hos arterne i andra sektionen af föregående släkte, neml. så, att 8:de nerven på framwingarne alltid utgår från stämman af diffälet, skild från den 7:de. Twernerven, som tillsluter diffäkten, emellan 4 och 5 nerverne på bakwingarne och emellan samma nerver på framwingarne mer eller mindre försvinnande, merendels blott fortsatt medelst en uppsvällning.

Githörande fjärilar förekomma i twenne generationer om året och en del af de sist framkomma, tillhörande wisfa arter, öfvervintra, så att de under klara och mildare dagar om wintren utkomma från sina gömställen, eller de första vårdagarne fladdra öfver de ännu wisna, från snön knapt befriade fälten. Deras larver sakna tornar på första fropperingen, och hafwa på 2:dra och 3:de högst fyra, men på de öfriga alltid 6 sådana, hwilka äro stywa, spetsiga och mycket greniga. En del äro skadliga för träden, men med undantag af dessa arter, kunna de öfrige anses ofskadliga, då man här icke använder deras moderwexter, såsom i utlandet. Bupan har ett par större spetsar i hufvudets främre del och ett par mindre på ryggen af hwarje froppering, samt är ofta gulds eller silfverglänsande. På ryggen finnes dersemte en näsformig upphöjning.

A. Framvingarnes tvernerf tillika med dess fortsättning ganska fin.

1. Bakvingarnes tvernerf tillika med dess fortsättning ganska fin.

1) Grenen på bakvingarnes första nerv i spetsen tvåtaggig.

1. Admiralen (*Vanessa atalanta* Lin.).

Alis dentatis, supra nigris, anticis maculis difformibus apicalibus albis fasciaque obliqua in medio fulvo-rubra; posticis ad marginem exteriorem fascia nigro-maculata ejusdem coloris.
L. al. exp. 72—75 millim.

Wingarne småtandade, ofwan swarta; de främre med oliformiga hwhita fläckar i spetsen och ett gulrödt band snedt öfwer midten; de bakre wid utkanten med ett svartfläckigt band af samma färg. L. e. wingsp. $2\frac{7}{8}$ — $3\frac{1}{16}$ t.

Syn. Pap. *atalanta* Lin. F. Sv. 1060. Fabr. E. S. III. 1. 418. 362. Hüb. t. 15. f. 75. 76. Text. 14. 2. *Vanessa* Och. Schm. I. 1. 104. IV. 16. & 127. Zett. Ins. Lapp. 894. 4. God. et Dup. Lepid. I. 99. pl. 6. f. 1. II—S. Text. I. 44. Aglals Dalm. Pap. Sv. 65. 6.

Admiralen är en af våra vackraste fjärilar och förekommer om våren i Maj och om hösten i Augusti och September mer eller mindre allmän i södra och medlersta Sverige, isynnerhet i trädgårdar och smärre skogsdungar. I Skåne hör han wispa år ingalunda till fjällsyntheterne, andra år kan man deremot ofta förgäfwet söka honom på ställen, der han eljest brukar wara allmän. I Småland är han tagen wid Anneberg och på flera andra ställen (Bhm.). Wid Götheborg och på Wiftingsö är han äfwen anmärkt (Wahlb.), äfwen så wid Stockholm. Inom Norge är han träffad wid Christiania (Siebke). Huru högt han stiger mot nordn är vår halfö år ännu ej utrönt. Prof. Zetterstedt anför honom såsom fjällsynt af Lappiska insekter. I den norra delen af Westmanland förekommer han likwäl icke (Friedrichson).

Artbestr. Antennerne swarta med hwhitagtiga ringar. Klubban i spetsen gulagtig. Balperne ofwan swarta, på fborne hwhitagtiga, undertill brungulagtiga, låthåriga. Hufwud och ryggsköl-

den svartlubna. Abdomen ofwan svart, undertill hwitgulagtig. Bröflet gråblafigt, ludet. Bakwingarne från basen, längs infanten svartlubna. Wingarne tandadt wåglige, de främre med en större tand i utfanten.

Sanne och houe : Wingarne ofwan swarta, hwardera med ett gulrött band, hwilket på framwingarne går från framfanten snedt öfver midten till bakre hörnet, likwäl utan att hinna sjelfwa fanten, men deremot på bakwingarne följer utfanten och är här i midten försedt med en rad trefantiga swarta fläckar, samt i analhörnet prydd med en blåagtig. 3 framwingarnes spetsar finnas 6 större och mindre hwita fläckar af olika form, dels aflånga, dels runda. Längs utfanten af samma wingar synas några otydliga, i rad ställda blåagtiga fläckar. Undertill äro framwingarne tecknade såsom på öfre sidan, men wingspetsarna äro brunagtige och omkring de hwita fläckarne finnas swarta ringar, äfwenfom närmare basen några blåagtiga streck. Bakwingarne äro undertill brungrå med ljusare och mörkare flammor samt hafwa i midten af framfanten en gulagtig fläck, i disken en svart teckning, liknande 686, och mot utfanten en eller flera, otydliga ocellformiga fläckar.

Varven, som lefwer på Näpflor (emellan desfas sammanpunna blad), är kort och tjock, köttfärgad, gulgrön, svart eller brunröd med gula tornar och ett gult, af halfmånar bestående streck nära fötterna längs hwarje froppsfida. Pupen är brun eller grå med mycket trubbiga spetsar i hufvudet och flera, wansligen guldgulansande taggar på abdominalregionen.

2) Grenen på bakvingarnes första nerv i spetsen enkel.

2. Damen (*Vanessa cardui* Lin.).

Alis dentatis, supra fulvis, roseo tinctis maculis inæqualibus atris et albis; posticis infra marmoratis ocellis quatuor, l. quinque. L. al. exp. 55—70 millim.

Wingarne småtandade, ofwan rödgula, flötande i rosenrött, med större och mindre swarta och hwita fläckar; de bakre undertill marmorerade och prydd med 4—5 oceller. *l. c.* wingsp. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{13}{16}$ t.

Syn. *Pap. cardui* Lin. F. Sv. 4054. *Fabr. E. S.* III. 4. 404. 320. *Hübner*. Pap. t. 45. f. 73. 74. Text. 44. 4. *Vanessa* Ochs. Schm. l. 4. 102. IV. 46. *Treitsch.* X. 4. 49. *Zett. Ins. Lapp.* 894. 5. *God. et Dup.* Lepid. l. 402. pl. 5. secund. f. 2. H—S. t. 30. f. 457. 458. var. Text. l. 44. *Aglais* Dalm. Pap. Sv. 65. 7.

Ghuru denna utmärkt sköna art wisäa är träffas i stor mängd, kan den icke anses för allmän. De flesta är träffas blott så exemplar. Den uppehåller sig isynnerhet på äkrar och högst sällan i skogstrakterne. Detta är orsaken hwarföre den är allmänare i Skånes östra och södra delar än i dess norra. I nämnde provins finnes den wid Lund, Göperöd, Trolle Ålungby och Jinja. I Blekinge är den anmärkt wid Carlskrona och Sölvesborg. I Småland är den funnen wid Anneberg af Prof. Boheman och i närheten af Stockholm har jag själf tagit den. Wid Malmvik nära Drottningholm är den äfwen tagen (Welfrage). I Östergötland har Prof. Wahlberg träffat den wid Gussum och inom Norige är den funnen wid Christiania och i Ringerige (Siebke). I Rappmarken är den träfsad af Prof. Zetterstedt. Utom Europa förekommer den i de flesta länder af Asien, Afrika och Amerika.

Artbescr. Antennerne mörkbruna, glest hwitpudrade. Klubban i spetsen gul. Palperne hwitludne med ett mörkbrunt streck längs öfre sidan. Hufvudet basom ögonen hwitludet, för öfrigt jemte ryggskölden brungult, ludet. Abdomen ofwan swart, i ledkanterne och undertill rödgul. Bröflet gråhwitt, ludet. Fötterne hwitgula. Bakwingarne ofwan från basen längs indre kanten bevrurna med längre, rödgula hår. Wingarne i utkanterne såsom hos Admiralen.

Stämne och hona: Wingarne ofwan rödgula med rosenröd anstrykning; de främre i wingspetsen, snedt öfwer från framkanten till wingens bakre hörn, swarta med olifstora hwita fläckar; längs utkanten löper ett otydligt, hwitagtigt och afbrutet streck och uti den rödgula disken finnas efter hwarandra 3:ne oregelbundna, swarta, merendels sammanhängande fläckar. Wingarnes bas, isynnerhet de bakre, äfvensom desas framkant och de främres infant i botten swarta, men betäckta med rödgula fjäll,

hvaraf färgen här är mörkare. Till följe häraf blibar det rödgula på bakvingarne endast ett tvärband vid utkanten, hwilket icke hinner sfelfwa framkanten. Uti detta finnas 4—5 större runda, swarta fläckar och längs utkanten twenne parallela rader swarta, olifformiga fläckar, af hwilka de indre äro på tvären ovala och merendels sammanhängande, de yttre deremot förenade blott genom en fin, swart linia. Twenne af de förstnämnda, hwilka äro närmast analhörnet, flöta i blått. Undertill äro framvingarne tecknade såsom på öfre sidan, utom wingspetsen och utkanten, som här är gulgrå. Bakvingarne äro gulgrå, marmorerade med brunt och hwitgult, samt hafwa längs utkanten uti ett otydligt, hwitt band en rad af stundom sammanhängande, violetta tvärfreck och innanför dessa fyra, sällan fem, swarta fläckar, motsvarande öfre sidans, här lifwål ocellformiga, så att till ett större eller mindre antal af dem, är hwardera omgifwen af en rödgul och en swart ring samt i midten något blåpubrad. Fransarne äro hwita med swarta fläckar.

Varven är mörkare eller ljusare swartgrå med gula streck, fläckar eller punkter och korta tornar. Den lejer på flera slags wexter isynnerhet Lifslar, Näslor, Kardborrar, Kattostar och Achillea, samt drager några blad tillsamman omkring sig. Puppan är askegrå, eller brun med två trubbiga upphöjningar i hufvudet, och flera törghylba taggar och knappformiga spetjar på abdominalregionen.

3. *Morgmanteln* (*Vanessa antiopa* Lin.).

Alis angulato-dentatis, supra castaneo-nigris limbo lato, flavo-albido, serie adjacente macularum coerulearum. L. al. exp. 70—78 millim.

Wingarne winfligt tandade, ofwan mörkt kastaniebruna med bred, hwitgul borda och innanför denna en rad blå fläckar. *♀*. e. wingiv. $2^{13}/_{16}$ — $3^{3}/_{16}$ t.

Syn. *Pap. antiopa* Lin. F. Sv. 4056. Fabr. E. S. III. 4. 445. 355. Hüb. Pap. t. 46. l. 79. 80. *Vanessa*

Ochs. Schm. I. 4. 440. IV. 47. Zett. Ins. Lapp. 893. 4.
H—S. Text. I. 39. Aglals Dalm. Pap. Sv. 64. 2. Vanessa
morio God. et Dup. Lepid. I. 93. pl. 5. f. 4.

Denna art förekommer uti stogarne, isynnerhet der Björk och Åsp finnes, men i södra Sverige äfwen i trädgårdarne, stundom ganfka allmän, andra är deremot ganfka sällsynt. I Skåne träffas den öfwer allt. Lifaså i Småland (Vhm.), i södra delen af Östergöthland (Stenh.), på Gottland (Zett.), wid Stockholm och äfwen på fläna ställen i Lappmarkerne, såsom wid Muonioniska i Torned Lappmark (Zett.) På flera mellanliggande orter är den likwäl ständigt sällsynt, såsom i norra delen af Östergöthland (Stenh.) och af Westmanland (Fredrichs.). I Norige är den anmärkt wid Christiania, Edsberg, Eidsvold, i Ringerige, Krydsherred, Odalen och Romsdalen (Siebke). Flygtiden infaller twenne gånger om året, i Maj och i Augusti och September, då man stundom får se den i mängd på Björk- och Åspstammarne uppsuga den saft, som utslippar ur någon springa.

Artbeskr. Antennerne och klubban swarta, den sednare med gul spets. Palperne gula med swarta ränder och undertill bewurna med längre, swarta hår. Hufvud och ryggsköld brunludna. Abdomen swart. Bröflet, äfwen som bakvingarne längs indre kanten undertill, ludne af swarta, i spetsen gula hår; de sednare ofwan, från basen utöfwer midten, betäckta med lång, kastaniebrun ludd. Swardera wingen har i utkanten en gröfre tand. Fötterne med gula tibier och tarfer, samt swarta, mot leden gula låar.

Hanne och hona: Wingarne mörkt kastaniebruna med bred, ljusgul eller hwitgul korda, som är mer eller mindre beströdd med swarta atomer. Strakt innanför denna är grundfärgen mörkare, nästan swart, och deri finnes en rad ljueblå fläckar. Framvingarne hafwa i framkanten små, gula twerstreck och närmare spetsen twenne större, gula fläckar. Undertill äro wingarne swartbruna med kolswart wattning och ett tydligt, wågligt twerstreck af samma färg öfwer bakwingarnes dist. De twenne gula fläckarne i framwingarnes främre kant, äfwen som wingar-

nes borsta, äro blefware än på öfre sidan och den sednare har större, svarta atomer, hvilka isphnerhet lifsom på öfre sidan äro tätstående på vingfanternes gröfre tänder. I lifsen af bakvingarne finnes en mindre, gul fläck.

Parven, som är svart med svarta tornar och större röda fläckar, lefwer coloniewis på Björk, Ålöp, Poppel och flere Wilarter. Pupan är asfegrå eller brunagtig med svart schatterring och röda fläckar, samt har tvenne skarpa taggar i hufvudet och flera smärre på mellankroppen och abdominalregionen.

4. Winbärs-Fuchsen (*Vanessa c. album* Lin.).

Alis acuto angulato-dentatis, supra fulvis nigro-maculatis; infra cinereo-luscis plus minus albido marmoratis, posticis in medio c. albo notatis. L. al. exp. 50—55 millim.

Wingarne djupt utskurna och groitandade, ofwan rödgula, svartfläckige; undertill gråbruna, mer eller mindre marmorerade med hvitt, de bakre i midten tecknade med ett hvitt c. L. e. wingsp. 2—2¼ t.

Syn. Pap. *c. album* Lin. F. Sv. 1059. Fabr. E. S. III. 1. 124. 380. Hüb. Pap. t. 19. f. 92. 93. Text. 16. 10. *Vanessa* Ochs. Schm. I. 1. 125. IV. 17. & 129. Zett. Ins. Lapp. 864. 3. God. et Dup. Lepid. I. 85. pl. 5. tert. f. 1. pl. 5. f. 3. II—S. Text. I. 39. *Aglais* Dalm. Pap. Sv. 65. 5. *Hvita c-fjärilen*. Dahlb. Sk. Ins. Skada och Nytt. p. 153. 107.

Winbärs-Fuchsen är allmän i trädgårdar och skogslundar öfwer allt i Sverige och Norge med undantag af de nordligaste provinserne, der den är ganska sällsynt (Zett.). Såsom deß samfläktningar förekommer den i tvenne generationer om året, i Maj och Juni samt i Augusti och September, dock är den sällsyntare om hösten än om våren.

Artbeskr. Antennerne bruna, undertill otydligt hvitringlade. Klubban i spetsen hvitgul. Balperne gråludna. Hufvud och ryggstöld rödbrunt ludna. Abdomen ofwan svartagtig, undertill pudrad med rödbrunt. Bröfvet brungrått, ludet. Fötterne grå eller gulagtiga. Wingarne i utfanterne starkt utskurna och groitandade; de bakre ofwan med långa rödgula hår längs abdomen.

Samme och hona : Vingarne ofwan rödgula med en bred mörkbrun list i utkanterne, innansför hwilken på bakvingarne går en annan bhlif, skild från den yttre genom en rad ljusare rödgula fläckar. Framvingarne hafwa i framkanten tvenne tverrlående, större, mörkbruna, och i difsen 5 mindre, rundade och swarta fläckar, af hwilka sednare stundom de tvenne, som äro närmast basen och framkanten, med hwarandra sammanhänga. 3 bakvingarnes dist finnas och swarta fläckar. Undertill äro wingarne från basen till midten mörkare gråbruna, mer eller mindre wattade med hwitt, stundom enfärgade; derefter hwitgula med större och mindre bruna atomer och småstreck, men stundom äfwen enfärgadt mörkgrå. Swardera bakvingen har i difsen en hwit flgur, lifnande ett latinskt c, som wänder den konvera delen åt wingens infant.

Den utmärkt wackra larven är till främre hälften mörkgul och till den bakre hwit eller hwitgul, med mörkgula och hwitgula tornar, swarta fläckar och streck; på sidorne brun med 1—2 wågiga, gulagtiga streck öfwer fötterne. Den lefwer på Winbärshuskar, Humla, Näslor, Hadsel och Lonicera och gör stundom, då den förekommer i mängd, temmeligen betydlig skada. Puppan är ljusbrun, ofta grönagtig, och ljust farnosfröd med swarta och gula streck och fläckar, samt djupt infuren mellan hufwudet och abdominalregionen.

2. Bakvingarnes tverrnerv tillika med dess fortsättning temligen tydlig.

5. Nässel-Fuchsen (*Vanessa urticæ* Lln.)

Alis angulato-dentatis, supra fulvis nigro-maculatis, anticis macula unica majore et duobus minoribus rotundatis, nigris in disco; posticis supra ad basin nigris, infra nigris fascia flavida, nigro fuscoquo undulata. L. al. exp. 50—55 millim.

Vingarne groftandade, ofwan rödgula, svartfläckiga, de främre med en större och tvenne smärre, rundade och swarta fläckar i difsen;

de bakre ofwan wid basen swarta, undertill swarta med ett gulagtigt, svart och brunvattradt tverband. L. e. wingsp. $2-2\frac{1}{4}$ t.

Syn. Pap. *urticæ* Lin. F. Sv. 4058. Fabr. E. S. III. 1. 422. 374. Hüb. Pap. t. 48. f. 87—89. Text. 45. 7. Vanessa Ochs. Schm. I. 4. 420. IV. 17. Zett. Ins. Lapp. 863. 2. God. et Dup. Lepid. I. 94. pl. 5. secund. f. 4. H—S. Text. I. 40. Aglais Dalm. Pap. Sv. 65. 4. Nässelfjäriln Dahlb. Sk. Ins. Skada och Nyttä p. 452. 106.

Var. h. { Alis supra obscurioribus, infuscatis.
Wingarne ofwan mörkare, brunagtiga.

Nässelfjärilen är den allmänaste dagfjäril på vår halfö och förekommer allestädes från Skåne ända till Nord Cap. Egentligen har den tweene generationer om året, men dessa hafwa icke, såsom de flesta andra arterne, bestämda tider, utan utvecklas hela sommaren igenom, så att fjärilen träffas från April till slutet af September eller October månader. Älwen får man se honom wackra dagar midt om wintren framkomma från sina gömställen. Den mörkare, i brunt flötande varieteten, som för öfrigt lifnar den normala formen, är från Lappmarkerne, der den mera ofta träffas (Zett.).

Artbestr. Antennerne mörkbruna, fint hwitringlade. Klubban i spetsen gulagtig. Palperne rödgula, i spetsen swarta och under till gråagtigt eller svartagtigt håriga. Hufvud och ryggstölb ljusbrunhåriga. Abdomen ofwan svart, undertill rödgulagtig. Bröfket tätt svartludet. Fötterne gråagtiga. Wingarne i utkanterne småtandade, hwardera med en gröfre och större tand. Bakwingarne från basen utöfwer midten bewurna med gulbruna hår.

Hane och hona: Wingarne ofwan rödgula med svart, af blå fläckar prydd borda nära utkanten, i hwilken åter löper ett smalare brunagtigt streck, på hwardera sidan otydligt begränsadt af grundfärgen. Framwingarne hafwa ofwan i främre kanten trenne större, swarta fläckar, mellan hwilka grundfärgen är ljusare gul, och nära wingipetsen en hwit, mindre fläck. I diffen af nämnde wingar finnas trenne swarta, rundade fläckar, af hwilka den största är belägen närmast infanten. Bakwin-

garne äro wid basen utöfwer midten swarta, så att den rödgula färgen blott bildar ett tverband nära utkanten.] Undertill äro framvingarne ocfagula med brunshatterade spetsar, samt hafwa i framkanten och wid roten större swarta fläckar, begränsade af folswarta linier. Bakvingarne äro undertill från basen, utöfwer midten, swarta med ett swart, wågigt streck i färggränsen och ett annat, stundom afbrutet, öfwer diffen; emellan dessa finnes stundom en liten ljusgul punkt. Närmare utkanten går ett ljusgult, med swarta och bruna småstreck fint wattradt band. Längs wingarnes mörkbruna utkanter löper undertill ett swart-blått, tandadt, snällt band.

Varven är stundom swartagtig, stundom grönagtigt grå med gula och gröngula, mer eller mindre tydliga streck och korta tornar. Den är allmän hela sommaren igenom på Nästör, hwilka den i grund förstör, isphnerhet som den lefwer coloniewis. Pupan är ljus eller mörkt brunagtig med guldpunkter och korta taggar.

6. **Körsbärs-Fuchsen** (*Vanessa polychloros* Lin.).

Alis angulato-dentatis, supra fulvis, nigro-maculatis, anticis maculis quatuor subæqualibus, nigris in disco; omnibus infra nigro-fuscis fascia communi flavida, nigro fuscoque undulata.
L. al. exp. 60—65 millim.

Wingarne groftandade, ofwan rödgula, svartfläckiga, de främre med ispra, nästan lifa stora, swarta fläckar i diffen; alla undertill swartbruna med ett gemensamt gulagtigt, af swart och brunt wattradt band. L. e. wingsp. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{11}{16}$ t.

Syn. Pap. *polychloros* Lin. F. Sv. 4057. Fabr. E. S. III. 4. 124. 372. Hübn. Pap. I. 47. f. 81. 82. Text. 45. 5. *Vanessa* Och. Schm. I. 4. 414. IV. 17. Treitsch. X. 4. 20. God. et Dup. Lepid. I. 88. pl. 6. f. 2. Boisd. Icon. 125 pl. 24. f. 4. II—S. Text. I. 40. Aglais Dalm. Pap. Sv. 65. 3. *Foksen. Dahlb. Sk. Ins. Skada och Nyttä* p. 451. 405.

Var. b. *Alis supra fulvis, anticis maculis duabus ad marginem anteriorem maculaque unica ad marginem anteriorem*

nigris; posticis margine interiore sulvo, anteriori et exteriori nigro.

Wingarne ofwan rödgula, de främre med 2 swarta fläckar wid framfanten och en bplit wid infanten; de bakre i indre fanten rödgula, i den främre och yttre swarta.

Syn. Pap. *tesdudo* Esp. Schm. l. t. 73. c. 23. f. 4. p. 118. Pap. *pyrrhomelæna* Hübn. Pap. l. 174. f. 845. 846.

Rörsbärs-Rydsen, som mycket liknar föregående, är icke så allmän som denne, utan tvertom en af de sällsyntare inom släktet. Blott wiða år händer det, att man träffar honom i större mängd. I Skåne finnes han der och hvar i trädgårdarne. I Småland, Öster- och Westergöthland är han äfwen funnen (Dahlb.), men torde knapt gå högre än till Stockholm, hwarest den också förekommer (Wahlb.) I norra delen af Westmanland finnes den ej (Friedrichs.) och är icke eller mig weterligen anmärkt inom Norige. Flygtiden infaller tvenne gånger om året, i Maj och Augusti månader, till och med något sednare. Varieteten har blifwit funnen wid Gussum af Prof. Wahlberg och är sällsynt.

Artbeskr. Antennerne swartbruna. Klubban i spetsen gulagtig. Balperne gulagtiga, undertill med långa, swarta hår. Hufvudet mörkbrunt, hårigt. Ryggskölden och abdomen ofwan med rödgula hår, på den sednare glesare, hwilken desutom undertill är swartagtigt hårig, endast mot anus rödgul. Bröfvet swartagtigt, ludet. Fötterna swartgrå. Wingarne med en gröfre tand i utfanten och bakwingarne äro ofwan från basen, utöfwer midten, bewuxna med långa, rödgula hår.

Stämme och hönna: Wingarne ofwan mörkare rödgula, än hos föregående, men för öfrigt till färgteckningen snarlika dennes. De främre med tvenne större, swarta, aflånga fläckar i framfanten och en, något mindre, i distfältet, mellan hwilka grundfärgen är ljusgul. Utom de nu nämnda finnas fyra andra, runda, swarta fläckar i dissen, af hwilka den ena står nära bakre hörnet af wingen och de öfrige från infanten i sned riktning

mot wingspetsen. Utfanten är gulbrun och längs densamma löper ett svartbrunt band. Bakwingarne hafwa i midten af framfanten en större, svart fläck och närmast bakom denna är grundfärgen ljusgul. Utfanten är tecknad såsom på framwingarne, men i det svartbruna bandet finnas blå, halfmånsformiga fläckar. Undertill äro alla wingarne från basen, utöfver midten, svartbruna med ett solsvart, vågigt streck i färggränsen; derefter ljusgula med bruna atomer, småstreck och flammor. I framfanten af framwingarne synes samma swarta teckning som ofwan och längs alla wingarnes utfanter löper ett svart, i blågrått stötande band, hwilket på framwingarne ej hinna wingspetsen.

Varieteten *b.* skiljer sig från föregående deruti, att framwingarne hafwa i främre kanten ofwan twenne swarta fläckar och en öflik i indre kanten; den sednare delad genom den första rödgula tvernerven. De bakre äro längs indre kanten rödgula, men längs framfanten och utfanten swarta och wid denna sednare löper en rad rödgula fläckar. De blå fläckarne längs utfanten af bakwingarnes öfre sida, som finnas hos föregående, saknas alldeles.

Varven är blåsvart eller brungrå med gula tornar och gula strimmor längs ryggen och sidorne. Den lefwer på Alm och Rörbärsträd, samt förorsakar på de sednare stor skada, då den förefommer i mängd. Den lefwer alltid i stora sällskap och är således lätt bortplockad. Puppan är rödbrun, brungrå eller gulagtig med gul- och silfverfläckar samt skarpa taggar på hufvud och abdominalregionen.

B. Framwingarnes tvernerv tillika med dess fortsättning ganska tydlig, temligen tilltjocknad.

7. Jungfrun (Vanessa io Lin.).

Alis angulato-dentatis, supra fulvo-brunneis, singulis oculo magno coeruleo; anticis ad marginem anteriorum nigro maculatis. L. al. exp. 47—60 millim.

Wingarne grofstandade, ofwan rödbruna, hwardera med en stor, blå ocell; de främre i framkanten svartfläckiga. L. e. wingsp. $1\frac{7}{8}$ — $2\frac{1}{2}$ t.

Syn. Pap. *io* Lin. F. Sv. 1048. Fabr. E. S. III. 4. 88. 276. Hübn. Pap. l. 46. f. 77. 78. Text. p. 14. 3. Vanessa Ochs. Schm. l. 4. 107. IV. 17. God. et Dup. Lapid. l. 96. pl. 3. l. 2. II—S. Text. l. 39. Aglals Dalm. Pap. Sv. 64. 4.

Denna fjäril, som wistas i trädgårdar och skogsdungar, förekommer, liksom många andra af sina släktningar, ett och annat år ganska allmänt, men är dessemellan mycket sällsynt I norra Sverige och i Norge är den ännu icke anmärkt. I södra, äfvensom i medlersta Sverige träffas den deremot på åtskilliga ställen. I Skåne har jag funnit den wid Trolle Ejungby, Öppmanna, Hörröd och på flera andra ställen. I Småland är den träffad wid Anneberg (Whm.), och wid Berga af Kalmars län (Bett.); i Östergötland wid Wadstena (Bett.), wid Guxum (Wahlb.) och wid Hårads-hammar (Stenh.); i Uppland wid Stockholm och i närheten af Drottningholm. Dess flygtid infaller i Maj och i slutet af Juli, samt i början af Augusti månader.

Artbeskr. Antennerne svartbruna. Klubban svart med gul spets.

Balperne gulagtiga med swarta strimmor och undertill med swarta hår. Hufvud och ryggsköld rödbrunt ludna. Abdomen ofwan svart med rödbruna atomer, undertill svartgrå. Bröfvet svartgrått, ludet. Fötterna swarta med gulagtiga tibier och tarjer. Wingarne i utkanten tandade, hwardera försedda med en gröfre tand. De bakre ofwan längs abdomen beivurna med rödbruna, långa hår.

Stämme och huna: Wingarne ofwan wackert rödbruna; de främre från basen, uti framkanten och till dennas midt wackrade med svart och gult. I samma kant stå twenne, inåt mer eller mindre spetsiga, swarta fläckar; emellan båda dessa finnes en ljusgul fläck. I wingspetsen finnes en stor ocell, hwilken i midten har en svart fläck, men mot framkanten är ljusgul och mot utkanten ljusblå, samt der begränsad af ett smalt, svart

streck. Rängs utkanten synas några hvitagtigt blå fläckar, af hvilka 2—3 stå i sjelfwa ocellen och lika många bakom den samma. 3 bakvingarne främre hörn finnes äfven en stor ocell, som i midten är svart och ljusblå, men utomfring omgifwen af en whitgrå ring, som inåt begränsas af svart. Undertill äro alla wingarne swarta, wattrade med kolswarta småstreck, och öfwer disten af bakvingarne gå twenne parallela, wåriga tverlinier af samma färg.

Parven är enfärgadt svart med många hwita punkter och lesmer i sällskap på Näslor och Humle. Lifwål är den skada, som den åsladkommer, obetydlig, emedan den sällan förekommer i mängd hos oss. Pupen är grönagtigt askegrå eller brunagtig med skarpa taggar och spetsar, och en tvådelad stertipets, samt prydd med de wanliga gulds eller silfwerfärgade fläckarne.

III. Trib. Heliconides. BOISD.

Pedes 6 omnes gressorii, invicem conformes, sere æquales.

Cellula discoidalis alarum posticarum costa transversa, ceteris æquali, clausa. Cellula anticarum costa transversa aut continua, aut plus minus abrupta clausa.

Margo anticus alarum anticarum costis tribus et ramulis duobus l. tantum uno quartæ, rarius costa tantum unica et ramulis quatuor secundæ, extenditur.

Costæ alarum posticarum aut 8 aut 9: 1:ma aut e trunco communi cum 2—4, aut e basi separatim, semper tamen radice simplice egrediens et ramulum aut nullam aut distinctum in lobum basalem emittens. Cum costæ sunt 8, septima et octava e basi, sed cum 9 sunt, octava et nona o basi egrediuntur. Costæ anticarum 8 l. 9, ad basin inter se æquales, sexta vario modo, ramosa et 1:ma, o basi egrediens.

Alæ posticæ pro receptione abdominis canaliculatæ.

Larva cylindrica l. elongata, inermis, glabra l. sericea.

Pupa gibbosa, antice unimucronata, nuda, ano et filo per medium transverso alligata.

Fötterne: alla 6 gångfötter, stämellan lifformiga, nästan lifa långa.

Diffältet på bakvingarne slutet genom en tvernerb, som är lifa de öfrige wingnerverne. De främres diffält antingen slutet genom en fullständig, eller genom en mer eller mindre afbruten tvernerb.

Framkanten af framvingarne hålles utspänd genom 3 nerver och 2:ne grenar eller blott en enda af en 4:de, sällan genom blott en enda nerv och 4:ra grenar af en andra.

Nerverne på bakvingarne antingen 8 eller 9: den 1:sta utgående antingen från gemensam stam med den 2:dra—4:de eller of från basen skild från de 3:de, lifväl alltid med enkel rot, och utgående åt rotloben antingen ingen eller of en tydlig gren. Då nerverne äro 8, utgå den 7:de och 8:de från basen, men då de äro 9, utgå den 8:de och 9:de från basen. Framvingarnes nerver 8 eller 9, wid basen stämellan lifa; den 6:te på oflita sätt grenig och den 1:sta utgående från basen.

Bakvingarne för abdomens upptagande bildande en ränna medelst indre kantens nebböfning.

Parven cylindrisk eller aflång, obewäpnad, slät eller stekesluden.

Pupan uppblåst, framtill entaggad, naken, fasthängande med anal-taggen och medelst en omkring midten slagen tråd.

De till denna grupp hörande arter hafwa somliga en snabb och ihållande, andra deremot en fladdrande och afbruten flygt. Några äro ganska flygga och swåra att fånga, andra deremot icke. Största delen lefwer på lägre dicotyledona växter, några så på träd. En del förorsakar uti trädgårdar temligen stor skada, isynnerhet som de 3:de arter äro ganska allmänna. Färgen hos fjärilarna är svartelgul eller hwit, obetydligt blandadt med svart.

De släkten, som tillhöra denna grupp och finnas på vår halfö, kunna på följande sätt karakteriseras:

- Costa prima alarum posticarum simplex, ramulum nullum in lobum basalem emittens.
- A. } Första nerven på bakvingarne enfel, ej utfärande någon gren åt rotloben.
- Costæ alarum anticarum 8; 6:ta quadriramosa.
1. } Framvingarneß nerver 8; den 6:te fyrgrenig. } **Collas.**
- Costæ alarum anticarum 9; 6:ta triramosa.
2. } Framvingarneß nerver 9; den 6:te tregrenig. } **Goniapteryx.**
- Costa prima alarum posticarum ramulum in lobum basalem emittens.
- B. } Första nerven på bakvingarne utfärande en gren åt rotloben.
- Costa 2:da alarum posticarum biramosa. (Costæ al. anticarum 8; 7:ma quinquerosa).
1. } 2:dra nerven på bakvingarne tvågrenig. (Framvingarneß nerver 8; den 7:de femgrenig). } **Leucophasia.**
- Costa 2:da alarum posticarum simplex.
2. } 2:dra nerven på bakvingarne enfel.
- Costæ alarum anticarum 9; 6:ta quadriramosa.
- 1) } Framvingarneß nerver 9; den 6:te fyrgrenig. } **Anthocharis.**
- Costæ alarum anticarum 9; 6:ta biramosa.
- 2) } Framvingarneß nerver 9; den 6:te tvågrenig. } **Pieris.**
- Costæ alarum anticarum 9; 6:ta triramosa.
- 3) } Framvingarneß nerver 9; den 6:te tregrenig. } **Aporia.**

Släktet: Colias. FABR. et AUCT.

(Ganoris DALM.)

Antennæ breves (tertiam partem marginis anterioris alarum anticarum vix superantes), rectæ, apicem versus incrassatæ. Clava obconica, cylindrica, haud determinata, apice truncata, obtusa.

Caput magnum, thoraci fere æquale, pilis densis conformiter hirsutum.

Palpi compressi, porrecti, subdivergentes, intus subnudi, in latere exteriori tamen squamati; infra hirti, pilis longioribus divaricatis instructi; triarticulati. Articulus basalis medio brevior, fere rectus, articulationem versus nonnihil attenuatus; medius basalem ultimumque longitudine superans, conformis; ultimus minutissimus, tertiam partem articuli basalis non superans, obovatus apice rotundato.

Oculi nudi.

Pedes invicem conformes; femora intra pilosa; tibiæ, præsertim posticorum, dentibus brevibus instructæ, sed intermediorum et posticorum ad insertionem tarsorum calcaribus duobus validioribus etiam armatæ; tarsi etiam brevo dentati; articulus primus tarsorum longissimus, reliquis fere æqualis; 2: dus tertio, hic tamen quarto, minutissimo, nonnihil longior; 5: tus tertio æqualis.

Alæ integræ.

Costæ alarum posticarum 9: 1—4 e trunco communi superiori, 5 7 e trunco communi inferiori et 8—9 e basi egredientes; prima simplex, ramulum nullum in lobum basalem emittens; secunda arcuata. Costæ alarum anticarum 8: 1: ma e basi, 2—4 e trunco communi inferiori, 5 e costa transversa cellulæ, 6—7 e trunco communi superiori et 8 e basi egredientes; 6: ta quadriramosa. Costa transversa cellulæ alarum anticarum inter costam 4 et 5 modico arcuata.

Antennerne forta (snapt längre än tredje delen af framvingarne's främre kant), rätta, mot spetsen tilltjocknade. Klubban omvänt konisk, cylindrisk, föga affild från fästet, i spetsen tvär och trubbig.

Sufvundet stort, nästan lika bredt som thorax, lifformigt ludet af tätstående hår.

Palperne sammantryckta, utstående, något divergerande, på indre sidan nästan nakna, men på den yttre fjälliga; undertill ludna, försedda med längre usperrade hår; treledade: basleden kortare än den medlersta, nästan rät, mot ledfogningen något afsmalnande; den medlersta leden längre än basleden och sista leden tillsammantagna, lifformig; den sista leden minst, icke längre än tredje delen af basleden, omvänt äggformig med rundad ipets.

Ögonen nakna.

Fötterna finsemellan lifformiga; låren undertill håriga; tibierne, ispinnerhet bakfötternes, försedda med korta tänder, men mellanfötternes och bakfötternes derjemte bewäpnade med tvenne starkare ippror wid tarsernes ledfogning tarserne äfven tandade; 1:sta tarsleden gansta lång, nästan lika lång med alla de öfriga; 2:dra leden längre än den 3:dje, och denne längre än den 4:de, hwilken är minst; 5:te lika lång med 3:dje.

vingarne helbräddade.

Nerverne på bakvingarne 9: 1—4 utgående från öfre nervstammen, 5—7 från nedre nervstammen och 8—9 från basen; den 1:sta enkel, utfäandande ingen gren åt rotloben; den 2:dra frökt. Framvingarnes nerver 8: den 1:sta utgående från basen, 2—4 från nedre nervstammen, 5:te från diståltets tvärv, 6—7 från öfre nervstammen och den 8:de från basen; den 6:te ihrgrenig. Tvärvnerven wid framvingarnes distålt något böjd emellan 4:de och 5:te vingerberne.

Äf detta släkte tillhöra blott så arter vår Fauna. Utom Skandinavien är det talrikare representeradt. Arterne föredraga skogstrakter med berg och backar framför slättlandet, ehuru de upphålla sig på ångar och gräsrika platser. Deras larver äro nästan jemnstofka och

betruena med mycket korta hår, så att de hafwa utseende af att wara nakna. Pupan är på midten hwälfd och försedd med en upphöjd egg. Fjärilarne förekomma merendels med blott en generation om året.

1. Svafvelgula Hösfjärilen (*Colias palæno* Lln.).

Alis supra sulphureis aut albidis, apice lato nigris limbriusque roseis; posticis infra flavidis atomis nigris adpersis, macula simplici centrali argentea. L. al. exp. 50—57 millim.

Wingarne ofwan swafvelgula eller hwitagtiga, i spetsen med bred svart borda och fransarne rosenfärgade; de bakre undertill gulagtiga, beströdda med tätta swarta atomer och försedde med en enkel fläwerfärgad fläck i disken. *l. e. wingip.* 2—2 $\frac{3}{8}$ t.

Syn. *Pap. palæno* Lln. F. Sv. 4041. *Fabr.* E. S. III. 4. 207. 648. *Hüb.* Text. 67. 21. *Colias.* *Ochs.* Schm. I. 2. 484. IV. 32. et 156. 157. *Zett.* Ins. Lapp. 908. 4. *God.* et *Dup.* Lepid. II. 34. pl. 4. f. 2. *H—S.* Text. I. 403. *Ganoris Dalm.* Pap. Sv. 89. 9. *Pap. europomene* *Hüb.* Pap. I. 86. I. 434. 435. *Pap. philomene* *Hüb.* Pap. I. 117. I. 602. 603. et fig. 740. 744. *Colias werdandi* *H—S.* Pap. I. 83. f. 403. 404. I. 8. f. 44. 42.

Obs. *Col. werdandi* *H—S.* est a *Col. werdandi* *Zett.* Ins. Lapp. 908. 4. certissime longe diversa. Cum speciminibus lapponicis, ad *Col. palænonem* pertinentibus, bene congruit et varietatem haud memorabilem, nullo modo speciem distinctam constituit.

Denna wadra fjäril är i södra Sverige ganska sällsynt och träffas någon gång blott i stogsstrakterne. Så har jag funnit den i Skåne wid Jiretosta och W. Wramb och Prof. Boheman har träffat den wid Anneberg i Småland, och i Westergöthland. Wid Gusum i Östergöthland (*Wahlb.*), äfvensom nära Ömberget (*Zett.*) och wid Östthemborg (*Wahlb.*), förekommer den också, men temligen sparsamt. I de medlersta och norra Sveriges bergigare landskaper är den deremot allmänare, såsom wid Norberg i Westmanland (*Fredrich.*), wid Berge och Ålsten i Jemtland (*Zett.*), wid Quicksjö (*Wahlb.*), Åsele

(Bhm.), Karesuando, Muonioiska, Naschkind och Boshetop i Lappmarkerna (Zett.). Dess wistelsfort är fårr och myror och flygtiden infaller i slutet af Juni, i Juli och Augusti månader. I Norge är den anmärkt på de flesta ställen i södra delen och finnes äfwen i den norra. Vid Christiania, Solör, i Ringerige och Österdalen är den funnen (Siebke) och synes der wara nästan allmännare än i Sverige.

Artbeskr. Antennerne rödagtiga, undertill stötande i gult. Klubban i spetsen undertill rödgul. Palperne hwitgulagtigt ludna. Hufwudet tätt ludet af brunt och gult. Mellanryggen gråluden, hos hannen stötande i gult. Abdomen ofwan svart med gult puder, undertill hos hannen gulagtig, hos honan hwitagtig. Bröfket hos den förre gul-ludet, hos den sednare gråludet. Fötterna hos den förre gula, hos den sednare grå.

Stann. Wingarne ofwan iwasjwulgula med svart, något gulpubrad, inåt wägig borda, som på de främre är bredare och går från framkanten öfwer wingspetsen, och längs utkanten till infanten, hwilken den med en smal fläk följer ett kort stycke; men på bakwingarne är bordan smalare, således inåt wägig, gående från framkanten och öfwer främre hörnet till midten af utkanten, der den slutar och således icke hinner analhörnet; på alla wingarne är bordan jemnt bågformig och bredast i wingspetsarne. I difsen af framwingarne finnes en mer eller mindre tybblig, svart tverfläck och på samma ställe af bakwingarne en mindre gul rutformig, rundad eller kantig fläck. På undre sidan äro wingarne gula; de främre längs framkanten och äfwen i difsen närmare wingspetsen, samt de bakre öfwer hela ytan fint brunpubrade. I difsen hafwa de främre en tverstående svart fläck, som i midten är gul, och de bakre på samma ställe en fyråddig, silfwerhvit fläck. I utkanterna, der bordan på öfre sidan går fram, äro wingarne på undre sidan gula med swag, gröngagtig anstrykning. Fransarne äro rosenfärgade.

Honan har vingarne på öfre sidan hvita, den swarta borden inåt ej så bestämdt begränsad som hos hannen och den upphör på framvingarne i bakre hörnet utan att följa infanten, samt är på bakvingarne mycket smalare än hos hannen. Undertill äro framvingarne hvita med gula spetsar och de bakre gula. För öfrigt liknar hon hannen.

Larven är grön och gulstrimmig, samt swart punkterad. Den skall lefwa på *Coronilla*, en fjellväxt, som der och hvar förefommer, men utan tvifvel tillgriper den äfwen andra växter.

Num. Till Sveriges Fauna har äfwen en annan, nu beskrifna närstående art blifwit räknad och finnes såsom svensk i de flesta af våra samlingar. Lifaledes har man uppgifwit ännu en annan såsom förekommande i vårt land; men då man icke har sig några säkra localer bekanta, upptagas endast på detta sätt bådas beskrifningar:

***Colias hyale* Linn. (Colias hyale LIN.)**

Alis supra sulphureis l. albidis, anticis macula media discoidali maculisque apicis nigris; posticis macula fulva, infra macula sesquialtera argentea, ferrugineo circumcincta. L. al. exp. 45—48 millim.

Wingarne ofwan swafvelgula eller hwitagtiga, de främre med en swart fläck i biffen och fläckar af samma färg i wingspetsen; de bakre med en rödgul fläck i biffen, och undertill med en dubbel flfwerfärgad fläck, omgifwen af rödbrunt. *l. e.* wingsp. $1\frac{7}{8}$ — $1\frac{15}{16}$ t.

Syn. PAP. *hyale* LIN. F. Sv. 4040. FABR. E. S. III. 4. 207. 649. HOB. Text. 67. 49. COLIAS OCHS. Schm. I. 2. 484. IV. 32. TREITSCH. X. 4. 93. GOD. et DUP. Lepid. I. 46. pl. 2. secund. f. 2. II—S. Text. I. 404. t. 6. f. 33. 34. GANONIS DALM. Pap. Sv. 89. 8. PAP. *palæno* HOB. Pap. t. 87. f. 438. 439.

(Fjärilen*) skall enligt Vinné förefomma högst sällan i Skåne; men detta är troligen ett misstag. Enligt Doct. Holmodins uppgift i bref till Prof. Wahlberg skall han hafwa $\frac{1}{4}$ bels mil söder om Wisby på Gottland den 2 September år 1829 fångat denna art. Exemplaret, som förvaras

*) In Gottlandia habitare fertur. Testimonia ulteriora tamen desiderantur. In Scania non occurrit, quantum mihi innotuit.

i Prof. Wahlbergs enstilda samling, och som af Kolmodin uppgifvets vara från nämnde ställe, har jag sett: men på förefkommen anledning tror jag mig böra anse arten såsom twiswelagtig för vår Fanna intill dess den blifwer widare eftersökt.

Artbest. Antennerne rödaktige. Klubban i spetsen gul. Kroppsdela-
nes färg för öfrigt såsom hos föregående.

Hanne. Vingarne ofwan ljus swafvelgula, wid basen svartpu-
drade; de främre med en rundad svart fläck i disken och ett svart band öf-
wer ningsspetsen och längs utkanten, hwilket är upplöst i olifformiga fläc-
kar, så att fläckar af grundfärgen deraf inneslutas. Bakvingarne med en
rödgul fläck i disken och längs utkanten ett smalt svart band, hwilket
isynnerhet i wingspetsen har antydning till swarta fläckar, som skulle
innesluta andra af grundfärgen. Undertill äro framvingarne ljusgula,
i spetsen höggula, wid basen och längs framkanten fint svartpu-
drade, och hafwa nära utkanten en rad fläckar, som äro rödbruna eller svartaktiga.
Bakvingarne äro på samma ställe höggula, från basen och utöfwer midten
fint svartpu-
drade, med en dubbel perlemorfärgad fläck, den främre
minst, men båda omgifna hvardera af en rödbrun cirkel; i främre
kantens midt finnes en rödbrun fläck och längs utkanten går en rad
dylila. Fransarne rosenfärgade.

Honan liknar hannen, men har wingarnes öfre och framwingarnes
undre ställe hvitaktig, obetydligt dragande i gult.

Rödgula Rösfljörilen (Colias edusa FABR.).

Alis supra sulvis margine nigro, (feminæ fulvo maculato); anticis
macula discoidali nigra; infra omnibus virescentibus, anticis macula di-
scoidali nigra, posticis macula punctoque adjacente argenteis. L. al.
exp. 50—56 millim.

Vingarne ofwan rödgula med svart (hos honan gulfläckig) borda; de
främre med en svart fläck i disken; alla undertill grönaktiga, de främre
med en svart difffläck och de bakre med en perlemorfärgad fläck och der
bredvid liggande punkt. L. e. wingsp. 2—2¼ t.

Syd. PAP. *edusa* FABR. E. S. III. 4. 206. 643. HÄBN. Text. 66.
17. COLIAS OCHS. Schm. I. 2. 473. IV. 32. et 456. TREITSCH.
X. 4. 84. PAP. *hyale* HÄBN. Pap. t. 85. f. 429—434.

Äfwen denna art*) skulle finnas på Gotthand. Doct. Kolmodin upp-

*) In Gothlandia habitare fertur. Testimonia ulteriora tamen deside-
rantur.

gifwer sig på samma ställe som föregående art hafwa funnit denna den 1 och den 22 Sept. 1829, och sedan flera gånger. Båda exemplaren, hanne och hona, förvaras i Prof. Wahlbergs samling; men för öfrigt gäller samma anmärkning om denna som om förra art.

Artbeskr. Kroppedelarnes färg såsom hos föregående arter.

Hanne. Vingarne ofwan rödgula; de bakre flötande i grönt och fint mörkpydrade; med en svart borda (— af samma form som hos swafwelgula Hösjärilen —) hwilken genomdrages af de rödgula vingervene. Vid diffältets slut på framvingarne finnes en rundad svart fläck och på bakvingarne en annan rhyblig och röd. Undertill äro de främre i dissen orangegula, i framfanten, som är svartpydrad, och i wingsvetsen gröngula, med en rad mörkbruna fläckar längs utfanten, hwilka nära infanten blifwa swarta. Bakvingarne äre grönagtigt gula med en större och en bredwidliggande mindre perlemorglänfande fläck i dissen, omgifwen af en rödbrun linia, samt längs utfanten en rad rödbruna fläckar. Granarne såsom hos föregående.

Honan, mörkare rödgul än hannen och på bakvingarne flötande i brunt, har gulfläckig borda i utfanten och tydligare röd fläck i bakvingarnes dist. Undertill är hon lifaledes mörkare än hannen, hwilken hon för öfrigt lifnar.

2. Nordiska Hösjärilen (*Colias Boothii* Ross).

Alis supra fulvo-luteis limbo communi nigro, flavo pulverato; anticis ad costam transversam cellulæ lineola nigra, infra in medio alba; posticis infra obscure fulvo-virescentibus, dense atro-pulveratis, macula argentea, interdum gemina, in disco. L. al. exp. 40—45 millim.

Vingarne ofwan rödagtigt gula med gemensam svart och gulpydrad borda; de främre med ett svart, undertill i midten hvitt streck wid diffältets twernerv; de bakre undertill mörkt gulgröna, öfwerströdda med tätta swarta atomer och i dissen försedda med en perlemorglänfande fläck, som stundom är dubbel. *L. e. wingsp. 1⁵/₈ — 1¹³/₁₆ t.*

Syn. *Colias Boothii* Ross: Appendix to the Narrative of a second voyage in Search of a North-West-Passage (1835) p. 65. n. 40. pl. 4. a. f. 3—5. *Col. hecla*

Lefeb. Act. Soc. Ent. Gall. 1836. p. 384. t. 9. f. 3. 4.
Zett. Ins. Lapp. 908. 3. **Col. Boothii** H—S. pl. 96. f.
 459. 460.

Obs. Præter figuras jam citatas habet **Herrich Schæffer** alias **Col. Boothii** in tab. 8. f. 39 et 40. Figuræ illæ ad hanc speciem pertinere non possunt, quia limbum nigrum multo tenuiorem et seriem, etsi obsoletam, macularum fuscærum ostendunt. Possibile est ut figuræ memoratæ ad *Col. chionen* Ross l. c., speciem mihi ignotam, pertineant.

Denna högnordiska fjäril, hwilken nu för första gången bekräftas såsom swenskt, upptäcktes i Vappmarken af vår förtjenstfulle Entomolog, Prof. **Boheman**, hwilken fann den i en dal emellan Quicksjock och Alfavare, kallad Balliwaggi. Detta är osså, såwidt man hittills känner, enda lokalen för densamma inom Skandinavien. Af **Nos** blef den aldrasförst upptäckt på Grönland, derifrån man äfwen i Swenska samlingar eger exemplar.

Artbeskr. *) Antennerne farnosfärgade. Klubban otwan brunagtig, i spetsen och undertill rödgul. Balperne gulagtiga, under-

*) *Descr.* Antennæ coccineæ. Clava supra fusca, apice et parte inferiori fulva. Palpi flavi, infra cinereo-rufi pilosi. Caput et thorax pilis densis albidis, in capite et collari in roseum vertentibus. Abdomen supra pilis rarioribus albidis, infra flavidum. Pectus cinereo pilosum. Pedes cinereo-luteis.

Mas. Alæ supra fulvo-luteæ limbo lato nigro, flavo pulverato, communi, in posticis tamen attenuato et in medio marginis exterioris desinente. Ad basin sunt alæ omnes punctulis nigris adpersæ, quæ, abdomen sequentes, se supra discum extendunt, ubi etiam macula adest subinconspicua fulva. Ad finem cellulæ alarum anticarum linea transversa utrinque nigra, quæ interdum supra in medio macula flava, semper tamen infra macula alba est instructa, observatur. In limbo nigro lineolæ flavæ, e costis alarum excurrentibus ortæ, adsunt. Alæ anticæ infra fulvæ, ad marginem anteriorem et in apice nigro punctatæ, ad angulum posticum maculis nonnullis fuscis prope marginem anteriorem cinereum ornatæ. Alæ posticæ infra obscure fulvo-virescentes, ad basin densius, quam ad marginem anteriorem, atro pulveratæ. Ad cellulam discoidalem macula argentea, interdum gemina, præsertim postice brunneo marginata, conspi-

till med gråagtigt röda hår. Hufvud och ryggfölb bevarna med hvitagtiga hår, hvilka på hufvudet och halsfragen flöta i rosenrött. Abdomen ofvan med hvitagtiga glesare hår, undertill gulagtig. Bröflet gulgrått, lubet. Fötterna gulgrå.

Sæmne. Vingarne ofvan rödgulagtigt gula med en temligen bred, svart och guldpubrad borda i utfanterne, hvilken på bakvingarne afsmalnande upphör wid midten. Wid basen äro vingarne beströdda med swarta atomer, hvilka på de bakre gå längs abdomen utåt diffen, som prydes af en otydlig rödgul fläck. Wid diffältets slut finnes på framvingarne ett svart tvärfreck, hvilket stundom är i midten ofvan försedt med en gul fläck, men alltid undertill har en hvit. Wingnerverne utgå i utfanten med smala, gula streck. Undertill äro de främre vingarne rödgula, längs främre fanten och tvärs öfver diffen samt i wingspetsen pudrade med svart, och wid indre hörnet försedda med några svartagtiga fläckar nära den gråagtiga utfanten. Bakvingarne äro undertill gulgröna, tätt öfverpubrade med swarta atomer, hvilka likväl äro mindre tätstående wid utfanten. Vid diffältets slut finnes en hvit fläck, som stundom åtföljes af en annan mindre, men alltid är, isynnerhet utåt,

citur, ut etiam ad medium marginis anterioris macula fusca, e qua series arcuata macularum ejusdem coloris, discum obscuriorem a margine dilutioni discernens, ad angulum ani egreditur. Fimbriæ rosæ, supra in flavedinem vertentes.

Femina, quam non vidi, limbum in pagina superiore alarum latiorrem, maculis flavis ornatum, et alas posticas supra omnino nigro pulveratas, infra obscuriores quam in mare genere fertur.

Hab. i Lapponia rarissime. Celeberr. Dom. *Boheman* inter Quickjock et Alkavare hanc speciem quam maxime borealem in Scandinavia detexit.

Obs. Specimina e Groenlandia orta, in parte inferiori alarum posticarum ad maculam argenteam discoidalem et pone illam habent maculam rufo-brunneam, in mucrone acuto postice excurrentem, qua omnino carent suecana.

omgifwen af brunt. I framkantens midt är en mörk fläck från hvilken stundom en böjd rad af andra dubbla går till analhörnet, ställjande den mörkare disken från den ljusare utkanten. Fransarne rosenfärgade, ofwan flötande i gult.

Sonan skall hafwa i utkanten af wingarne ofwan bredare borða, hwilken är prydd med gula fläckar, och bakwingarne ofwan helt och hållet öfverpudrade med swarta atomer och undertill betydbligt mörkare än hos hannen. (Af mig ännu icke sedd).

3. Gröngula Högjärilen (*Colias nastes* Boisd.).

Alis maris supra virescenti-sulphureis, feminae albido-flavoscentibus, limbo communi maculari nigro; anticis macula discoidali nigra; posticis intra obscure virescenti-flavis, dense nigro pulveratis macula simplici argentea in medio. l. al. exp. 45—50 millim.

Wingarne ofwan hos hannen grönagtigt swarfwelgula, hos honan hwitgula, med en gemensam af fläckar bestående swart borða; de främre med en swart fläck i disken; de bakre undertill mörkt gröngula med tätstående swarta atomer och i midten en perlemorglänjande, enfel fläck. *l. e. wingsp. 1¹³/₁₆—2 t.*

Syn. *Colias nastes* Boisd. Icon. p. 245. pl. 8. f. 4. 5. (figuræ quoad colore incorrectæ). II—S. Text. l. 103. pl. 7. f. 37. 38. pl. 83. f. 401. 402. (figuræ optimæ). God. et Dup. Lepid. Suppl. l. 98. pl. 45. f. 4. 5. (fig. quoad colore incorrectæ). *Col werdandi* Schhr. Zett. Ins. Lapp. 908. 2. (certo).

Obs. *Col. werdandi* Zett. ost *C. nastes* Boisd. ut o specimine originario, in collectione Schönherri asservato et a me viso, satis apparet. Cur Celeberr. Dom. Zetterstedt specimen suum ad *C. nastes* Boisd. non retulit, facile perspicimus. Figuræ nempe *Boisduvali* ut etiam *Duponcheli* speciminibus suecanis quoad colore non exacte quadrant.

Gröngula Högjärilen är lifsom föregående en högnordisk art. Den förekommer bland Lappsta fjellarne, der den äfger öfver nakna platser emellan snödrifworne. Enligt Prof. Zetterstedt är den

funnen nära norra gränsen i Torneå Lappmark och Prof. Boheman har hemfört den från en fjelldal, wid namn Wallivaggi, belägen emellan Quickjock och Alkaware i samma Lappmark.

Artbeskr. *) Antennerne rödaktiga. Klubbarn oöfwan brun, undertill rödgul. Balperne svafvelgula, undertill beväxna med rödaktiga, tätstående hår. Kroppen svart med hvitaktig ludd, som på

*) *Descr.* Antennæ subrescentes. Clava supra fusca, infra fulva. Palpi sulphurei, infra dense fulvo l. rubro hirti. Corpus nigrum pilis cinereo-albis, in capite et collari ad roseum vertentibus. Pectus flavo-hirtum. Pedes rubri.

Mas. Alæ supra sulphureæ, obsolete virescentes, punctulis nigris, præsertim ad costas, ad basin, ad marginem anteriorem alarum anticarum et ad marginem anteriorem alarum posticarum densis. In margine exteriori alarum est limbus flavo-pulveratus niger, qui in medio marginis alarum posticarum desinet et deinde punctulis acervatis nigris tantum indicatur. I limbo memorato alarum anticarum maculæ adsunt 6—7 ovatae, flavæ, quarum plurimæ lineas tenues flavas in ipsam marginem emittent. Maculæ ejusmodi in limbo alarum posticarum, minus tamen distinctæ (interdum nullæ), reperiuntur. Ad cellulam linea transversa nigra in anticis et macula subinconspicua in posticis locum tenet. Alæ anticæ infra sunt pallide flavæ, punctulis densis nigris ad marginem anteriorem et exteriorum et in apice obsitæ; margo exterior in colore cinereo maculas geret pallide flavas, maculis paginæ superioris respondentes et intus serie maculata, plus minus continua, et punctulis acervatis nigris formata, terminata. Linea nigra discoidalis (sæpe nulla) interdum argenteo pupillata. Alæ posticæ infra obscure virescenti-flavæ, dense nigro pulveratæ, ad marginem posteriorem dilutiores; ad cellulam discoidalem macula argentea, rufo-brunneo præsertim postice terminata; in medio marginis anterioris macula infuscata et interdum series maculata ejusdem coloris inter colorem obscuriorem disci et dilutiorem marginis exterioris. Fimbriæ roseæ.

Femina mari est simillima, sed albido-flavescens obsoletius virescens et maculam in parte inferiori alarum posticarum discoidalem plerumque geret majorem.

Hab. ad latera alpium Lapponiæ variis, ubi papilio in locis sterilibus, nive non plane obrutis, circumvolat. Hanc speciem Celeberr. Dom. Boheman inter Quickjock et Alkaware Lapponiæ Tornensis etiam collegit.

hufvud och halsfrage flöter i rosenrödt. Bröfket gul-lubet. Fötterne röda.

Samme. Wingarne ofwan fwaſwelgula, ſwagt flötande i grönt, beſtrödda med ſwarta atomer, hvilka iſynnerhet hopa ſig omkring wingnerverne, wid baſen, och längs framkanten af framwingarne ſamt indre hälften af bakwingarne. Längs utfanterne går en ſwartagtig, guldpuſrad borda, ſom på bakwingarne upphör wid midten och derefter blott antydes genom hopade ſwarta atomer. I denna borda finnas på framwingarne 6—7 ovala, gula fläckar, af hvilka de fleſta utſända en gul ſtrimma till utfanten. På bakwingarne finnas äfwen dylika fläckar, liſwäl inåt mindre beſtämmt, ſtundom alldeles icke, ſtilda från grundfärgen. Wid diſſjältets ſlut finnes på framwingarne ett ſwartagtigt tverſtreck, och på bakwingarne ſtundom en blekgul fläck. Framwingarnes undre ſida är blekgul med täta, ſwartagtiga atomer längs framkanten och utfanten ſamt tverſ öfwer wingspetſen; utfanten är gråagtig och har blekgula fläckar, ſom motſwara öfre ſidans och inåt begränſas af en mer eller mindre ſammanhängande rad af andra fläckar, bildade genom hopade ſwartagtiga atomer. Diſſjältets ſwarta ſtreck, ſom då och då ſaknas, har ſtundom en hwitagtig pupill. Bakwingarne äro undertill mörkt gröngula, längs utfanten ljufare och öfwer hela ytan iätt beſtrödda med ſwartagtiga atomer, ſamt haſwa wid diſſjältets ſlut en hwit fläck, ſom oſtaſt, iſynnerhet utåt, är begränſad af rödbrunt. Wid midten af framkanten är en mörk fläck och ſtundom en rad dylika i färggränſen mellan den ljufare utfanten och mörkare diſſen. Franſarne roſenröda.

Donan liſnar hannen, men har wingarnes öſje och de främres undre ſida hwitgul, högst obetydligt flötande i grönt. Deſutom är diſſfläcken på bakwingarnes undre ſida något ſtörre än hos hannen.

Släktet: Goniopteryx. LEACH.

(Colias FABR. LATR. OCHS. ZETT. Ganoris DALM.

Rhodocera BOISD.).

Antennæ ut in genere præcedente breves, sed deorsum arcuatæ, versus apicem sensim incrassatæ. Clava obconica, intus complanata, haud determinata, apice rotundato, mucrone minutissimo inflexo instructo.

Caput parvum, thoraco minus, crista erecta acuminata ex pilis densis inter oculos et sub antennis instructum.

Palpi compressi, vix divergentes, squamati, infra dense pilosi apice subnudo, triarticulati. Articulus basalis reliquis conjunctis longitudine æqualis, arcuatus, articulationem versus attenuatus; medius ultimo longior, oblongo-ovatus; ultimus minutissimus, subconicus (apicem versus attenuatus apice acuminato).

Oculi nudi.

Pedes inter se conformes; femora infra dense pilosa; tibiæ tarsisque inermes; tibiæ tantum quatuor posticorum dentibus duobus brevibus ad insertionem tarsorum munitæ. Articulus tarsorum primus tribus sequantibus conjunctis longitudine æqualis, secundus tertio, hic tamen quarto minuto longior, sed quintus secundo longitudine æqualis.

Alæ angulato-dentatæ.

Costæ alarum posticarum 9 omnino ut in genere præcedente sed secunda recta; anticarum 9: 1 o basi, 2—4 o trunco communi inferiori, 5 o costa transversa cellulæ, 6—8 o trunco communi superiori, 9 o basi egredientes; 6 biramosa. Costa transversa cellulæ alarum anticarum inter costam 4 et 5 valde arcuata, convexitatem orga cellulam vertens.

Antennæ hos föregående slägte korta, men nebåt höjda, mot spetsen snåningom tilltjocknande. Klubban omvänt koniskt, på indre sidan afplattad, föga afstild från skäftet, i spetsen rundad med en ganfka liten, inböjd tagg.

Sufwundet litet, mycket smalare än thorax, med en spetsig och upprät af tätta hår bildad crista emellan ögonen och under antennerne.

Palperne sammantryckta, knapt divergerande, tjällige, undertill tätthåriga, i spetsen nästan nakna, treledade: basleden lifa lång med de öfrige tillsammansantagne, böjbo, mot ledfogningen affmalnande; mellanleden längre än den sista, aflångt äggformig; den sista minst, nästan koniskt (mot spetsen affmalnande och tillspetsad).

Ögonen nakna.

Fötterne finkemellan lifformiga, låren undertill tätthåriga; tibierne och tarserne oväpnade; blott de 4 baksta tibierne försedda med twenne forta tänder wid tarsens ledfogning. Tarsernes första led lifa lång med de 3:ne följande tillsammansantagne, den 2:dra längre än den 3:de, denne längre än den 4:de, som är minst, men den 5:te lifa lång med den andra.

Wingarne vinkligt tandade.

Nerverne på bakwingarne 9, alldeles som hos föregående släkte, utom den 2:dra, som är rät; på framwingarne 9: den 1:sta från basen, 2:dra—4:de från nedre nervstammen, den 5:te från diffältets twernerv, den 6:te—8:de från öfre nervstammen och den 9:de från basen; den 6:te tvågrenig. Diffältets twernerv på framwingarne emellan 4:de och 5:te wingnerverne mycket fröckt, wändande sin konvexa sida mot diffältet.

Detta släkte, hwaraf till vår Fauna blott hörer en art, har larven nästan lifnande föregående, men den är bakåt affmalnande och pupan är fentig med mycket uppblåst bröstregion. Arten är

Citrongula Tostesjärilen (*Goniopteryx rhamni* Lln.).

Alis maris citrinis, seminæ flavo-albidis, unicoloribus, omnibus in medio macula minuta supra aurantiaca, infra ferruginea.
L. al. exp. 55—60 millim.

Wingarne hos hannen citrongula, hos honan gulhvita, enfärgade, alla i midten med en liten fläck, som ofwan är orangegul, undertill rostbrun. R. e. wingsp. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ t.

Syn. *Pap. rhamn Lin.* F. Sv. 1042. Fabr. E. S. III. 1. 244. 264. *Hüb.* Pap. L. 88. I. 442—444. Text. 37. 22. *Colias Och.* Schm. I. 2. 186. IV. 32. *Zett. Ins.* Lapp. 909. 4. *God. et Dup.* Lepid. I. 43. pl. 2. f. 4. *Ganoris Dahn.* Pap. Sv. 89. 10. *Rhodocera H—S.* Text. I. 406.

Twenne gånger om året, i Maj, och Juli—Augusti, är denna fjäril allmän på ängar, i fogslundar och trädgårdar uti södra och medlersta delarne af Sverige och Norge. Huru högt han egentligen går mot nordn af vårt land är oss ännu obekant. Af *Protophila* anföres han såsom ganska sällsynt i södra Rappmarkerne.

Artbeskr. Antennerne mörkbruna, pudrade med hvitgult. Klubban i yttersta spetsen gulagtig. Balperne längs öfre sidan bruna, undertill gul-ludna. Hufvudets crista mörkbrun. Hjesan och ryggskölden ludna af längre silfvergrå hår. Abdomen ofwan med kortare hår af samma färg, undertill hvitgul. Bröfket gul-ludet. Fötterne gula. Hwardera wingen i yttre kanten med en grof tand, hwilken på framwingarne finnes i wing-spetsen, men på bakwingarne i kantens midt. För öfrigt äro wingarne helbräddade.

Stäm. Wingarne ofwan wackert citrongula, hwardera med en orange-färgad mindre fläck wid diffältets slut; undertill blefware gula med en rostbrun diffälek, motsvarande öfre sidans. I framwingarnes främre kant samt emellan wingnerverne, nära samma wingars utkant, finnas några rostbruna, små streck och i sleskwa utkanten dylika små punkter. På bakwingarnes undre sida finnas likaledes dylika streck och punkter nära och uti utkanten; rotloben är i främre kanten merendels svartagtig.

Stäm. liknar hannen, men är såwäl på wingarnes öfre som undre sida hvitgul.

Varven är ljusare eller mörkare grön, gleshårig, med en ljusare linia och en hvitagtig strimma längs hwardera sidan. Den lesar ihjinnerhet på *Rhamnus frangula*, men träffas äfwen, ehuru sällan, på *Ulex*. **Pupen** är grön, framåt spetsig, med gulagtiga streck på sidorna.

Släktet: *Leucophasia*. STEPH. H—S.

(*Pieris* LATR. *Pontia* FABR. *Ochs.* *Ganoris* DALM.)

Antennæ mediocres, distincto clavatæ. Clava obovata, brevis, determinata, compressa.

Caput magnum, thorace fere æquale, crista ex pilis longis erecta, divisa, inter oculos et sub antennis instructum.

Palpi compressi, porrecti, divergentes, squamati, triarticulati. Articulus basalis maximus, reliquis conjunctis multo longior, in medio dilatatus, articulationem versus sensim attenuatus, fere rectus, infra pilis longis divaricatis, articulos reliquos fere occultantibus, instructus; medius et ultimus minutissimi, haud tertiam partem articuli basalis conjunctim superantes, ovati, medius tamen ultimo nonihil longior.

Oculi nudi.

Pedes inter se conformes; femora infra parcius pilosa; tibiæ tarsique inermes; illæ unguibus nullis ad articulationem tarsi munitæ. Articuli tarsorum 4—4 fere æquales, quintus minimus.

Alæ integræ, lanceolatæ. Cellula alarum minuta, tertiam partem alæ non occupans.

Costæ alarum posticarum 8: 4 e basi, secunda biramosa e trunco superiore, 3—6 e trunco inferiore, 7—8 e basi egredientes; prima ramulum bimucronatum in lobum basalem emittens. Costæ anticarum 8: 4 e basi, 2—4 e trunco communi inferiori, 5 e costa transversa cellulæ, 6—7 e trunco communi superiori, 8 iterum e basi egredientes; 7:ma quinqueramosa. Costa transversa anticarum literam S fere mentiet.

Antennerne medelmåttigt långa med kort, tydligt affbild, omväändt äggrund och sammantruffet klubba.

Snufvudet stort, nästan lika bredt som thorax, försedt med en upstående, delad, af långa hår bildad crista emellan ögonen och under antennerne.

Palperne sammantryckta, utslående, divergerande, fjällige och treledade: basleden störst, mycket längre än de öfrige tillsammansantagne, på midten utvidgad, mot ledfogningen småningom affmalnande, nästan rät, undertill försedd med långa, utsperrade hår, hvilka nästan dölja de öfrige lederne; medlersta och sista leden ganfsta små, äggformiga, tillsammans knapt öfverfligande basledens tredje del, den medlersta lifväl något längre än den sista.

Ögonen nakna.

Fötterne fñndemellan lifformiga; låren undertill glejare håriga; tibberne och tarferne öwäpnade; de förra utan tänder wid taröleden. Tarfens 1—4 leder nästan lifstora, den 5te minst.

Wingarne helbräddade, lancettformiga. Diffältet litet, knapt intagande tredjedelen af wingen.

Nerverne på bakwingarne 8: 1:sta från basen, 2:dra, som är tvågrenig, från öfre nervstammen, 3—6 från nedre nervstammen, 7—8 från basen; den 1:sta utfäandande en tvåspetsig gren åt rotloben. Framwingarnes nerver 8: den 1:sta från basen, 2—4 från nedre nervstammen, 5:te från diffältets twernerv, 6—7 från öfre nervstammen, 8:de återigen från basen; den 7:de femgrenig. Diffältets twernerv på framwingarne lifnar ett latinst S.

Nåven af detta slägte eger wår Fauna endast en art. Dess nästan nakna larv är mot båda ändarne affmalnande och pupan på midten bakåtböjd, samt framåt ganfsta spetsig.

Allmänna Hvitvingen (*Leucophasia sinapis* Lin.).

Alis albis, anticis supra apico infuseato; posticis infra flavidis fasciis duabus transversis obsoletis infuscalis. L. al. exp. 40—45 millim.

Wingarne hvita, de främre öfwan med brunagtig spets; de bakre undertill gulagtiga med tvenne otydliga, brunagtiga tverband. L. e. wingsp. $1\frac{5}{8}$ — $1\frac{13}{16}$ t.

Syn. Pap. *sinapis* Lin. F. Sv. 1038. Fabr. E. S. III. 1. 187. 577. Hüb. Pap. t. 82. l. 410. 411. Text. 64. 9. Pontia Ochs. Schm. I. 2. 169. IV. 31. Pieris

God. et Dup. Lepid. 1. fol. 3. bis. pl. 2. tert. f. 4.
Ganoris Dalm. Pap. Sv. 88. 7. Zett. Ins. Lapp. 907. 4.
Leucophasia II—S. Text. 1. 95.

Denna art finnes i stogar der och hvar allmän i Maj och Juli månader. I Skåne finnes den på flera ställen. Lifaledes i Småland (Vhm), Westergöthland (Zett.), Östergöthland (Stenh.), Gottland och Öland (Zett.), Uppland, Westmanland och Dalarne (Fredrichs.), samt äfwen i Rappmarkerne, såsom wid Lycksele i Umeå Rappmark (Zett.). I Norrige är den äfwen på sina ställen allmän, såsom wid Christiania, Edsberg, Eger och uti Ringerige (Siebke).

Artbeskr. Antennerne ofwan swarta med hwhita ringar, undertill hwhita. Klubban swart, undertill i indre iälfsten hwhit. Palperne gråslubna. Hufvudets crista grå. Nyggskölden gråsluden. Den smala abdomen ofwan glesare, undertill tätare hwhitpubrad. Bröflet hwhitagtigt, ludet. Fötterne hwhitagtiga.

Hanne och huna. Vingarne ofwan hwhita, de främre wid basen och utåt framkanten fint swartpubrade, med en större eller mindre, brunagtig, hwhitpubrad, rundad fläck i spetsen. De bakre ofwan något flammiga, till följe af undre sidans färgteckning. Framvingarne undertill wid basen och längs framkanten mer eller mindre brunpubrade, i spetsen gula. Bakvingarne gula med brunagtiga atomer, hwhiska wid roten äro täta och i dissen hopa sig till tvenne otydliga tverband. Fransarne hwhita.

Varven, som skall lefwa på Lotus och Lathyrus, är grön med en hög-gul linia längs hwardera sidan. Dupan har en rödbrun sidostrimma, hwhita lufthål och brunstrimmiga ving-sidor (Ochs.).

Släktet: **Anthocharis.** Boisd.

(Pieris Latr. Zett. Pontia Fabr. Ochs. Ganoris Dalm.)

Antennæ medioeres. distincte clavatae. Clava oblongo-ovata, compressa.

Caput magnum, thoraci latitudine fere æquale, crista ex pilis longis, densis divaricatisque, erecta, inter oculos et sub antennis instructum.

Palpi compressi, porrecti, squamati, infra pilis longissimis divaricatis dense instructi, triarticulati. Articulus medius basali longior, articulationem versus sensim attenuatus; ultimus, secundum longitudinem suam totam conformis, minimus, apice rotundato, in pilositate reliquorum fere occultus.

Oculi nudi.

Pedes invicem conformes; femora infra pilis longis hirsutissima; tibiæ tarsique, præsertim posticorum ut in genere sequente, sic etiam articuli tarsorum, primus horum tamen tribus tantum proximis conjunctis longitudine æqualis.

Alæ rotundatæ. Cellula discoidalis dimidiam partem alæ occupat.

Costæ alarum posticarum ut in genere sequente; 4:ma tamen ramulum rectum, ad apicem angulatum et reflexum, in lobum basalem emittens. Costæ alarum anticarum 9: 4:ma e basi, 2:da—4:ta o trunco communi inferiori, 5:ta o costa transversa cellulæ, 6:ta—8:va e trunco superiori, 9:na o basi egredientes; 6:ta quadriramosa. Costa transversa cellulæ al. anticarum inter costam 4 et 5 valde arcuata, convexitatem erga cellulam vertens.

Antennerne medelmåttigt långa med tydligt affäld, aflångt-åggformig och sammantryckt flubba.

Sufsvundet stort, nästan lifa bredt som thorax; emellan ögonen och under antennerne försedt med en uppfående crista, bildad af långa, tätta och utsperrade hår.

Palperne sammantryckta, utstående, fjälliga, undertill försedda med tätta, ganfsta långa och utsperrade hår; treledade: medlersta leden längre än basleden, mot ledfogningen småningom affmalnande; sista leden längs hela sin längd likformig, ganfsta liten, med rundad spets, och nästan dold i de öfriges hårighet.

Ögonen nakna.

Fötterna fläsemellan lifformiga; låren undertill ganfka ludna med långa hår; tibier och tarfer, ifpinnerhet det bakerfta parets, fäsom hos följande flägte; fä äfwen tarsleberne, men den förfta af deffa är lifwål blott lika lång med de 3:ne närmfte tillfammantagna.

Wingarne rundade. Diffältet intager halfwa delen af wingens längd.

Nerverne på bakwingarne fäsom hos följande flägte; den förfta fänder lifwål åt rotloben en rät, i fpetsen winklad och utåtböjd gren. Framwingarnes nerber 9: den 1:fta från basen, 2:dra—4:de från nedre nerbflammen, 5:te från diffältets twernerv, 6:te—8:de från öfre nerbflammen och den 9:de från basen; den 6:te fprgrenig. Diffältets twernerv på framwingarne emellan 4—5 wingnerverne båg böjd, wändande den konvera delen åt diffältet.

Likfom af båda föregående flägten har wår Fauna ej eller mer än en art af detta, hwilket utom Skandinavien lifwål eger några flera. Larven har famma form fom föregående flägtes, men pupan är något mera bakåtböjd och mot båda ändar affpetsad.

Bräme-Auroran (*Anthocharis cardamines* Lin.).

Alis albis, anticis apice et macula sublunata media fuscis, maris medio aurantiaco-sulvis; posticis infra viridi marmoratis.
L. al. exp. 40—45 millim.

Wingarne hwita, de främre i fpetsen fwartbruna och i midten en fläck af famma färg; hos hannen i midten orangegula; de bakre undertill marmorerade med grönt. *X. e. wingsp.* $1\frac{5}{8}$ — $1\frac{13}{16}$ t.

Syn. Pap. cardamines Lin. F. S. 4039. *Fabr. E. S.* III. 4. 493. 600. *Hüb. Pap. t.* 84. f. 424. 425. t. 83. f. 449. 420. et fig. 791. 792. *Text.* 65. 43. *Pontia* Ochs. *Schw. l.* 2. 465. IV. 34. 155. 488. *Treitsch. X.* 4. 90. *Pieris* God. et *Dup. Lepid. l.* fol. 3. bis pl. 2. f. 2. pl. 2 quart. f. 4. *Zett. Ins. Lapp.* 907. 5. *Ganoris* Dalm. *Pap. Sv.* 86. 6. *Anthocharis* II—*S. Text. l.* 98.

Denna wackra fjäril förefommer på ängar allmänt i födra och

medlersta trakterna af vår half-ö. 3 Pappmarkerne är den deremot mera sällsynt. Den sårger blott en gång om året, i Maj och början af Juni månad. *Den är temligen sällsynt.*

Artbeskr. Antennerne swarta, hvit eller gulpubrade. Klubban mörkare, undertill och i spetsen gulagtig. Balperne undertill bewurna med långa, brungrå hår. Hufvudets crista grå. Hufvudet bakom ögonen gulhårigt. Ryggskölden bewuren med hwitagtiga hår. Abdomen ofwan swart med hwitagtig, gles fläckslubb; undertill hvit med hvit lubb. Fötterne hwita med gulagtiga tibler och tarser.

Samme. Wingarne hwita, ofwan wid basen och i de främres framkant swartagtiga. Framwingarne ofwan i spetsen swartbruna, gulpubrade och i disten står en liten, något halfcirkelformig svart fläck; emellan denna och den swartagtiga wingspetsen äro wingarne från framkanten till bakre hörnet orangegula, hwilket äfwen är förhållandet på undre sidan, der likwäl wingspetsen är hwitagtig med gröna fläckar. Den swarta distfläcken finnes också på undre sidan. Bakwingarne äro undertill marmorerade med gulagtigt gröna fläckar eller oredigt sammanlöpande band, hwilka på öfre sidan synas otydligt igenom. Framsarne hwita, på framwingarne brunfläckiga.

Sonan liknar hannen, men saknar den gula fläcken på framwingarne och har i desas spets mera brunt, samt i disten större fläck.

Varven är finhårig och grön med 3:ne hwitagtiga, långsgående linier, af hwilka den medlersta är otydlig. Den lefwer enölig på Cardamine pratense, Turritis glabra och Brassica campestris. Pupau är grön eller stötande i gult, slät, med en blekgul, eller en mörkare linia på hvarje sida. Den öfverwintrar.

Släktet : Pieris. SCHRANK. LATR. H—S.

(Pontia FABR. OCHS. Ganoris DALM. Anthocharis H—S.
ex parte).

Antennæ longiores, distincte clavatæ. Clava obovata, brevis, determinata, compressa.

Caput magnum, thoraci latitudine fere æquale, crista erecta, fere indivisa, ex pilis longis divaricatis ut in prioribus instructum.

Palpi *) compressi, porrecti, divergentes, squamati, infra pilis longis divaricatis instructi, triarticulati. Articulus basalis et medius aut inflatis aut normales; ultimus in pilositate reliquorum non occultus, longior.

Oculi nudi.

Pedes inter se conformes; femora infra hirsuta; tibiæ tarsique dentibus brevibus instructi; tibiæ quatuor posticæ ad insertionem tarsorum calcaribus brevibus munitæ. Articulus tarsorum primus reliquis conjuncti fere æqualis, secundus tertio, hic tamen quarto longior, quintus tertio longitudine æqualis.

Alæ integre. Cellula alarum discoidalis magna, dimidiam partem alæ aut occupans aut superans.

Costæ alarum posticarum 9: 4-4 e trunco communi superiori, 5—7 e trunco inferiori, 8—9 e basi egredientes; prima ramulum simplicem, arcuatum, acuminatum in lobum basalem

*) Tabula anatomica formam palporum articulorum exhibens:

A. Palporum articulus basalis et medius normales. Omnes inter se longitudine fere æquales: *P. daphnice*.

B. Palporum articulus basalis et medius tumidi, quasi inflati.

1. Art. medius ultimo fere longior; hic gracilis, apicem versus sensim attenuatus: *P. napi* et *rape*.

2. Art. medius ultimo fere æqualis; hic ut in subdivisione priore: *P. brassicæ*.

omittens; 2:da simplex. Costæ anticarum 9: 1 e basi, 2—4 e trunco communi inferiori, 5—8 e trunco communi superiori et 9 e basi egredientes; 6:ta biramosa. Costa transversa alarum anticarum inter costam 4 et 5 recta, obliqua.

Antennerne temligen långa, med tydlig flubba. Denna omvänt äggformig, fort, beständ och sammantröft.

Sufvudet stort, nästan lika bredt med thorax, försedt med en nästan odelad, af utsperrade hår bildad crista, belägen på samma ställe som hos föregående släkten.

Palperne sammantröfta, utåt riktade, divergerande, fjälliga, undertill försedda med utsperrade hår, treledade: basleden och den medlersta antingen uppblåsta eller normala; den sista del i de öfriges hårlighet och temligen lång.

Ögonen nakna.

Fötterna stämellan likformiga; låren undertill ludna; tibier och tarser försedda med korta tänder; de fyra bakersta tibierne wid tarsens ledfogning bewäpnade med twenne kortare sporrar. Första tarsleden nästan lika lång med alla de följande tillsammantagna; den 2:dra längre än den 3:dje; denne längre än den 4:de; den 5:te lika lång med den 3:dje.

Wingarne helbräddade. Diffältet antigen upptagande halfwa wingens längd eller öfverfligande densamma.

Nerverne på bakwingarne 9: 1—4 från öfre nervstammen, 5—7 från den nedre, 8—9 från basen; den 1:sta utfärdande åt rotloben en enkel, böjd och spetsig gren; den 2:dra enkel. Framwingarnes nerver 9: 1 från basen, 2—4 från nedre nervstammen, 5—8 från den öfre och 9 från basen; den 6:te tvågrenig. Twernerven på framwingarne emellan 4—5 wingnerverne sned och rät.

Hörande arter hafwa egentligen twenne generationer om året, ehuru flera af dem flyga hela den warmare tiden. Deras larver äro såsom hos föregående afsmalnande åt båda ändar samt mycket fort-

håriga, fint flfkeslubna. Pupan är fentig och taggig, i främre ändan entaggig. Såsom larver göra en del arter temligen stor skada på köfsverter.

A. Palpernes leder nästan lika långa; den medlersta och basleden normala.

1. Klöfverfladdraren (*Pieris daplidice* Lin.).

Alis albis, anticis supra apicibus nigro maculatis maculaque ejusdem coloris in medio; potiscis infra griseo-virescentibus maculis difformibus albis. L. al. exp. 45—50 millim.

Wingarne hwhita, de främre ofwan med svartfläckiga spetsar och en fläck af samma färg i difsen; de bakre undertill gråagtigt gröna med olifformiga hwhita fläckar. L. e. wingsp. $1\frac{13}{16}$ —2 t.

Syn. Pap. *daplidice* Lin. S. N. 1. 2. 760. 84. Fabr. E. S. III. 4. 494. 595. Hüb. Pap. t. 82. f. 414. 445. et f. 777. 778. Text. 63. 6. *Pontia* Ochs. Schm. 1. 2. 456. IV. 34. Treitsch. A. 4. 89. *Pieris* God. et Dup. Lepid. 1. fol. 3 bis pl. 2. secund. f. 3 pl. 2 quart. f. 2. *Ganoris* Dalm. Pap. Sv. 88. 5. *Anthocharis* H—S. Text. 1. 98.

Flärilen, som först såsom fwenff upptäcktes af vår utmärkte Entomolog, Prof. Zetterstedt, förekommer egentligen i twenne generationer om året, men wårgenerationen, som flyger i Maj, är ganska fåtalig. I slutet af Juli och början af Augusti är flärilen deremot i östra och nordöstra Skåne icke så fållfynt; på somliga ställen är den till och med ganska allmän, såsom på sand- och klöfverfälten och hafreåkrarne wid Trolle-Hjungeby, Sjöbo, Högstads och Esperöd. Den skall äfwen vara funnen i Östergöthland (Dalm.).

Artbefr. Antennerne hwhitgrå med mörkare ringar. Balperne hwhitagtiga, undertill med gulhwhita och swarta hår. Hufvud och ryggföld ofwan gråslubna. Abdomen ofwan och på sidorne swart, undertill hwhitagtig. Bröflet tätt gulhårigt. Fötterne hwhitgula.

Hanne. Wingarne ofwan hwhita, wid basen swartagtiga. De främre hafwa i spetsarne flera sammanflytande, swartbruna

fläckar, hvilka dock icke sträcka sig längre än till midten af utkanten eller något deröfver; wid distältets slut finnes äfwen en fyråddig, svartagtig fläck på båda sidor om twernerven, hvilken synes såsom ett flut, hvitt streck, belande fläcken. Bakvingarne i utkanten omringa nerverne obetydligt svartfuggade; undre sidans färgteckning är på den öfre matt anthdd, emedan den synes igenom wingen. Undertill hafwa framvingarne i spetsen, såsom på öfre sidan, svartbruna, sammanflytande fläckar, men dessa äro här grönpudrade, äfvensom distfläcken, hvilken här sammanhänger med framkanten; nära bakre hörnet finnes äfwen ofta en grönpudrad mörk fläck, eller ock blott anthydnig dertill. Bakvingarne äro på undre sidan gråagtigt gröna med olifformiga hvita fläckar, af hvilka twenne finnas i framkanten, en i distältet, andra bilda ett oliformigt och afbrutet twerband öfver disken och andra, som merendels äro aflånga, upplånga från sleskwa utkanten.

Honan lifnar hannen, men har framvingarne mera afrundade och distfläcken på dessa öfre sida större samt desutom nära bakre hörnet en annan dylik fläck. Bakvingarne äro ofvan i disken mörkare, emedan undre sidans färgteckning synes tydligare igenom och desutom antyder af svartagtiga fluggningar; längs utkanten finnes ett twerband af större swarta, halfmånformiga fläckar, som sammanhånga med andra rundade i sleskwa utkanten.

Varven, som lefwer på flera åkerwexter, såsom klöfwer, *Turritis glabra*, *Sisymbrium sophia* och *Brassica*, är mörkblå, gulstrimmig och svart punkterad, med ljusgrönt, gulplåfigt och svartpunkteradt hufvud. **Pupan** är grå, grön eller brun och lifnar den till följande art. (Schf.).

B. Palpernes leder sinsemellan olika långa; den medlersta och basleden svålda, liksom uppblåsta.

2. Rapsatfladdraren (*Pioris napi* Lin.).

Alis albis, anticis apico infuscatis; omnibus infra costis dilatatis fusco-virescentibus. L. al. exp. 50—55 millim.

Wingarne hvita, de främre i spetsen brunagtiga; alla undertill med breda mörkgröna infattningar omfring wingnerverne. *L. c. wingip.* 2—2 $\frac{1}{4}$ t.

Syn. *Pap. napi* Lin. F. Sv. 4037. Fabr. E. S. III. 4. 487. 576. Hüb. Pap. t. 84. f. 406. 407. Text. 62. 4. *Pontia* Ochs. Schm. I. 2. 149. IV. 34 et 153. Treitsch. V. 4. 88. *Pieris* God. et Dup. Lepid. I. fol. 3 bis pl. 2. quart. fig. 3. pl. 2 tert. f. 3. Zett. Ins. Lapp. 907. 4. var. a. II—S. Text. I. 96. *Ganoris* Dalm. Pap. Sv. 87. 4. *Rapsal vissling* Dahlb. Sk. Ins. Skada och Nyttä p. 458. 444.

Var. b. Alis aut albis aut sordide flavicantibus, anticis supra maculis duabus fuscis; posticis intra flavis; omnibus utrinque costis dilatate infuscatis.

Wingarne antingen hvita eller smutstigt gula; de främre ofwan med twenne bruna fläckar i disten; de bakre undertill gula; alla på båda sidor med bred, brun infattning omfring wingnerverne.

Syn. *Pontia Bryoniæ* (Napi var.) Ochs. I. c. obs. p. 454. 452. *Gan. napi* var. Dalm. I. c. *Pont. napi* var. b. Zett. I. c. *Pieris Bryoniæ* God. et Dup. Lepid. II. 39. pl. 5. f. 4. *Pieris napi* var. II—S. Text. I. 97. Hüb. Pap. t. 84. f. 407.

Denna art förekommer allmänt öfver allt inom Sverige och Norge. Varieteten, som af flera Författare blifwit ansedd för egen art, är likväl egendomlig för de nordligaste landskaperna, der den ej sållan träffas på fjellens sidor, isynnerhet honan. I Torneå Lappmark fann Prof. Zetterstedt båda varieteterne. Artens flugt tid infaller från Maj till Juni och sedan åter i Augusti och September.

Artbessr. Antennerne swarta, hwitringlade. Klubban swart, i spetsen gul. Balperne gulhåriga. Hufvud och ryggsköld grå-ludne. Abdomen ofwan swart, undertill hwitgul. Bröfvet hwitgult, ludet. Fötterna hwitgula.

Samme. Wingarne ofwan hvita med smala, brunagtiga nerver. Framvingarne wid basen och i framfantens indre hälft swartagtiga med en svartbrun fläck i wingspetsen, upplösande sig

i utfanten till brun fluggning omkring nerverne; i disken antingen ofläckade eller med en brunagtig, merendels otydlig fläck. Bakvingarne vid basen svartagtiga och i utfanten omkring nerverne fint svartbrunt fluggade, samt ofast med en svartbrun fläck i framfanten midt. Vingarne undertill: de främre hvita med gulagtiga wingspetsar, de bakre gula; alla med grön, utbredd infattning omkring nerverne, i synnerhet de bakre. Granarne hvita.

Honan liknar hannen, men har mera afrundade wingar, samt i disken af de främre 2:ne mörkbruna fläckar och i infanten ett streck af samma färg.

Var. h. skiljer sig från föregående endast deri, att både hannen, som merendels är hvit, och honan, som är smutsigt gul, hafva i framvingarnes dist tvenne mörkbruna fläckar, samt att alla nerverne på öfre sidan hafva bred brun infattning, så att wingarne få ett smutsigt brunt utseende. Honan är mörkast.

Larven är finhårig, blåagtigt grön med ett fint, otydligt, gult streck längs ryggen och ljusare kroppsidor, samt gula lufthål. Hela kroppshytan är beströdd med svarta och hvita vårtor, som bära ljusare eller mörkare hår. Den lefver på *Kålwerter*, *Rosoda* och *Turritis*. Pupau är gulgrön med svarta punkter och gula och svartfläckiga kanter.

Larven till denna och följande arter förorsaka ej obetydlig skada på *Kålwerter*, hvarföre man föreslagit åtskilliga medel till förekommande deraf. Dessa upptagas utförligare uti åtskilliga af våra Trädgårdsböcker och uti Adjunct Dahlboms här ofwan citerade arbete: *Skandinaviska Insekternes Nyttä och Skada*, hvarföre jag blott vill hänvisa till dessa. Afbröter man och förstör de blad på *Kålwerterne*, der honorne lagt sina små, hos de flesta arterne gulagtiga och elliptiska ägg, förekommes derigenom en betydlig del af den beskrade skadan.

3. *Rosvefladdraren* (*Pieris rapæ* Lln.).

Alis albis; anticis supra apicibus infuscatis, albido-punctu-

latis; posticis infra flavidis nigro punctulatis. L. al. exp. 45—50 millim.

Wingarne hvita; de främre ofwan i spetsen brunagtiga, hvitpudrade; de bakre undertill gula med fina swarta punkter. L. e. wingsp. $1\frac{13}{16}$ —2 t.

Syn. Pap. rapæ Lin. F. Sv. 1036. Fabr. E. S. III. 1. 486. 575. Hüb. Pap. 1. 80. f. 404. 405. Text. 62. 3. Pontia Ochs. Schm. 1. 2. 446. IV. 30. Ganoris Dalm. Pap. Sv. 87. 3. Pieris God. et Dup. Lepid. 1. fol. 3 bis pl. 2. tert. f. 2. Zett. Ins. Lapp. 906. 3. H—S. Text. 1. 96. Rofvevissling Dahlb. Sk. Ins. Skada och Nyttä p. 458. 410.

I södra och medlersta Sverige och Norge är denna art lika allmän som föregående och flägger wid samma tid. I Rappmarkerne är den deremot sällsynt, men huru högt den egentligen går mot nordn är icke utränt.

Artbeskr. Antennerne hvitagtiga. Klubban brunagtig, i spetsen och undertill hvitgul. Palperne hvitgula, ludna. Hufvud, ryggsköld, abbomen, bröst och fötter såsom hos föregående.

Hanne. Wingarne ofwan hvita; de främre wid basen, längs framkanten och i wingspetsen brunagtiga, hvitpudrade; i disken finnes stundom en fläck af samma färg; de bakre hafwa i framkanten äfwen en dylik fläck. Undertill äro de främre wid basen och längs utkanten swart punkterade, i wingspetsen gulagtiga och hafwa i disken en brun fläck. De bakre äro på samma ställen gula med fina swarta punkter, som äro tätast wid basen.

Honan liknar hannen, men har i disken på framvingarnes båda sidor twenne bruna fläckar; dock saknas på öfre sidan stundom den ena.

Parven är fluhårig, blåagtigt grön med tydlig, gul rygglinia och gula fläckar på sidorna. Den lefwer på samma wexter som föregående och deltagar med honom i den förödelse, som åstadkommes på ködwerterne. **Pupan** är grönagtigt grå eller brunagtig med swafwelgula linier.

4. Kålfaddraren (*Pieris brassicæ* Lln.).

Alis albis; anticis supra apicibus lato nigris; posticis infra flavidis nigro punctulatis. L. al. exp. 65—70 millim.

Wingarne hvita; de främre ofwan i spetsen bredt swarta; de bakre undertill gulagtiga, swartpunkterade. L. e. wingsp. $2\frac{11}{16}$ — $2\frac{13}{16}$ t.

Syn. Pap. *brassicæ* Lln. F. Sv. 4035. Fabr. E. S. III. 4. 186. 574. Hübn. Pap. t. 80. f. 404—403. Text. 62. 2. *Pontia* Ochs. Schm. 1. 2. 144. et 240. IV. 30. *Ganoris* Dalm. Pap. Sv. 87. 2. *Pieris* God. et Dup. Lepid. 1. fol. 3 bis pl. 2. tert. f. 4. Zett. Ins. Lapp. 906. 2. II—S. Text. 1. 96. *Kålvissling* Dahlb. Sk. Ins. Skada och Nyttä p. 155. 109.

Denna art är i södra och medlersta delarne af Sverige och Norge lifa allmän som Nässef-Buchsen, och förekommer från våren till sena hösten. I egentliga Rappmarkerne lär den icke finnas.

Artbeskr. Antennerne swarta med hvita ringar. De öfriga kroppsdelenarne äro till färgen lifa föregående.

Sanne. Wingarne hvita; de främre från basen utmed framkanten brunagtigt grå med en bred swart, söga hwit-pudrad pläck i wingspetsen. Denna pläck börjar med en smal strimma wid framkantens brungrå färg och slutar i utkanten, något framom wingens bakre hörn. De bakre hafwa en swart pläck i framkantens midt. Undertill äro framvingarne i spetsen gula der de ofwantill äro swarta, och hafwa i disken tvenne runda, swarta pläckar. De bakre äro på samma städa gula, tätst beströdda med swarta atomer.

Sonan lifnar hannen, men har ofwan i framwingarnes dist tvenne runda, swarta pläckar och intill dessa ett swart streck, som går snedt från indre kanten.

Varven är finhårig, swartpunkterad och blågrön med en långgäående gul linia åt ryggen och en dylik längs hvardera sidan. Den skada som han förorsakar på alla kålwyxter är känd.

Dupan är gulagtigt grön, tätt öfverströdd med svarta fläckar och punkter.

Rörande medel mot den skada larven åstadkommer se ofvan anförda arbete af Hdj. Dahlbom pag. 156 och 157, hvarest sådana uppräknas mot alla kålmäskar.

Släktet: *Aporia*. HübN.

(*Pieris* LATR. ZETT. II—*S. Pontia* FABR. OCHS. *Ganoris* DALM.)

Antennæ longiores, extrorsum sensim crassiores, in clavam elongatam gracilem, haud determinatam subeuntes.

Caput latitudine thoracis multo minus, fronte villosa.

Palpi compressi, porrecti, valde divergentes, squamati, infra pilis longis divaricatis instructi, triarticulati. Articulus basalis reliquis conjunctis longitudine æqualis; medius ultimo nonihil longior, hic nudus, distinctus, apicem versus sensim attenuatus; basalis et medius normales non inflati.

Oculi nudi.

Pedes inter se conformes; femora infra hirsuta; tibiæ tarsique dentibus brevibus serrati; tibiæ quatuor posticæ ad insertionem tarsorum calcaribus brevibus munitæ. Articuli tarsorum ut in genere præcedente.

Alæ integræ minus squamata, ad margines præsertim anticarum plus minus denudatæ. Cellula discoidalis alarum magna, in anticis haud, sed in posticis exacte dimidiam partem alæ superans.

Costæ alarum posticarum 9 ut in genere præcedente, sed ramulus costæ primæ rectus, et inter costam 7 et 8 plica, costam mentiens, in parte inferiore alarum adest. Costæ anticarum 9: 4 o basi, 2—4 o trunco communi inferiori, 5 o costa transversa cellulæ, 6—8 o trunco superiori et 9 iterum o basi egredientes; 6ta triramosa. Costa transversa cellulæ modice oblique arcuata.

Antennerne temligen långa, utåt småningom tilltjocknande, öfvergående till en aflång, smal och föga affilb flubba.

Hufvudet mycket mindre än mellankroppen i bredd, med luden hjesa.

Halperne sammantvätta, utstående, mycket divergerande, fjälliga, undertill försedda med långa, divergerande hår, treledade: basleden lika lång med de öfrige tillsammantagna; den medlersta något längre än den första; denna naken, tydlig, mot spetsen småningom afsmalnande; basleden och den medlersta normala, icke uppsvällade.

Ögonen nakna.

Fötterna fästsmellan lifformiga; låren undertill ludna; tibierne och tarserne taggiga af korta tänder; tibierne wid tarsens ledfogning väpnade med korta sporrar. Tarsens leder såsom hos föregående släkte.

Wingarne helbräddade, glejare fjällige, mot fanterne mer eller mindre nakna, isphunerhet på de främre. Distfältet stort, på de främre knapt, men på de bakre tydligt öfverstigande wingens halfrå längd.

Nerverne på bakwingarne 9, såsom hos föregående släkte, men 1:sta nervens gren rät och emellan 7—8 wingnerverne finnes undertill ett veck, som är snarlikt en nerv. Framwingarnes nerver 9: 1:sta från basen, 2—4 från nedre nervslammen, 5 från distfältets tverrnerv, 6—8 från öfre nervslammen och 9:de återigen från basen; den 6:te tregrenig. Distfältets tverrnerv obetydligt snedt böjd.

Farven till detta släkte är temligen långluden med längre hår wid fötterna och lesver uteslutande på träd. Rupan är slät, utan taggar, men med en rundad uppsvällning på hufvudregionen.

Hagtorns-Ejärilen (*Aporia crataegi* Lh.)

Alis albis costis nigris. L. al. exp. 65—70 millim.

Wingarne hwhita med swarta nerver. L. c. wingsp. $2\frac{1}{16}$ — $2\frac{13}{16}$ t.

Syn. **Pap. crataegi** Lin. F. Sv. 4034. **Fabr.** E. S. III. I. 182. 563. **Hüb.** Pap. t. 79. f. 399. 400. Text. 64. f.

Pontia Ochs. Schm. I. 2. 142. IV. 30. **Ganoris Dalm.** Pap. Sv. 86. 4. **Pieris God. et Dup.** Lepid. I. fol. 3. bis pl. 2. f. 3. **Zett.** Ins. Lapp. 906. 4. II—S. Text. I. 95. **Hagtornwissling Dahlb.** Sk. Ins. Skada och Nyttä p. 454. 408.

Denna art träffas i södra och medelsta provinserne af Sverige och Norge uti trädgårdar och skogslundar, helst i närheten af watten, och är der temligen allmän. I egentliga Lappmarkerne är han deremot högst sällsynt, enligt Prof. Zetterstedt. Dess flygtid infaller i Maj, Juni och Juli månader.

Artbeskr. Antennerne swarta. Klubban i spetsen hwitgul. Palperne korta, undertill gråsludna. Hufvud och ryggsköld gråsludna. Abdomen ofwan swart, undertill hwitagtig. Bröflet hwitgult, ludet. Fötterne swarta med hwitgrå långstreck.

Färgne och lona. Vingarne enfärgadt hwita med swarta nerver; de bakre undertill flötande i gult.

Larven är gråsluden, med swarta och orangegula strimmor längs ryggen och afseblå flödar, hwardera med en rad swarta punkter. Den lefwer på hagtorn, plommonträd och flera andra fruktträd i stora sällskap, hwilka spinna öfwer sig ett nät, hwar under de hwila och söka flydd wid annalkande owäder: Larven öfwerwintrar. Pupan är gulagtigt grön med svartagtiga fläckar och punkter.

Larven skadlig, emedan den om våren uppäter blad och blomknopparne på fruktträden.

IV. Trib. Parnassii (FABR.).

(Parnassides Dup.)

Pedes 6 omnes gressorii, inter se conformes.

Cellula discoidalis alarum posticarum costa transversa ceteris æquali clausa; anticarum costa in medio abrupta subclausa.

Margo anticus alarum anticarum costis tribus simplicibus, nempe costis alæ 8—10, extenditur.

Costæ alarum posticarum 8: 1 o trunco communi cum 2:da et 3:tia radice simplico egrediens et ramulum rectum simplicom in lobum basalem emittens; 8 iterum o basi egrediens. Costæ anticarum 10 ad basin invicem subæquales, 7 triramosa, 1 et 2 o basi egredientes.

Alæ posticæ rotundatæ, pro abdomine libero in margine interiori excisæ.

Larva pilosa, cylindrica, capite tentaculato.

Pupa lævis, mutica, subfolliculata.

Fötterne: alla sex gångfötter, släsemellan lifformiga.

Diffjäktet på bakvingarne slutet genom en tvvernerb, som är lif wingnerverne. Diffjäktet på framvingarne halfslutet genom en på midten afbruten tvvernerb.

Framfanten af framvingarne hålles utspänd genom trenne enkla nerver, neml. genom 8—10 wingnerverne.

Nerverne på bakvingarne 8: den 1:sta utgående med en enkel rot från gemensam stam med 2:dra och 3:dje och utjäandande åt rotloben en rät, enkel gren; den 8:de återigen från basen. Framwingarne's nerver 10, wid basen lifformiga; den 7:de tregrenig; den 1:sta och 2:dra utgående från basen.

Bakvingarne rundade, i indre fanten utskurna för den fria abdomen.

Parven luden, cylindrisk, med ett utsträdbart spröt i hufvudet.

Pupan slät, utan taggar, liggande i en nästan kofonglik hylsa.

All denna familj hör till vår Fauna icke mer än ett slägte:

Slättet: *Doritis*. FABR. et AUGR.

(*Parnassius* LATR.)

Antennæ breves, clavatæ. Clava subovata, recta, incrassata, apice mucronato.

Palpi capite longiores, subadscendentes, prominuli, pilis longis fimbriati, triarticulati. Articululus basalis arcuatus, omnium

latissimus; medius et ultimus recti, proportio eorum tamen pro specie variat. *).

Oculi nudi.

Pedes conformes; femora infra pilosa; tibiæ tarsique dentibus minutis serrati; tibiæ quatuor posticæ ad insertionem tarsorum calcaribus duobus longis munitæ; articulus primus tarsorum duobus proximis longitudine æqualis; 2, 3 et 4 inter se longitudine fere æquales; quintus tamen tertio quartoque conjunctis æqualis.

Alæ integræ, parcius squamatae, subnudæ; præsertim infra ad margines denudatæ.

Costæ alarum posticarum 8: 4—3 o trunco communi superiori, 4—7 o trunco inferiori, 8 o basi egredientes; 4:ma radice simplex ramulum rectum, extrorsum attenuatum et simplicem in lobum basalem imittit. Costæ anticarum 10: 4:ma, minima, et 2:da o basi, 3—6 o trunco communi inferiori, 7—9 o trunco superiori et 10 o basi egredientes; 7:ma triramosa. Costa transversa alarum anticarum in medio inter costam 6 et 7 abrupta, tantum tumiditate connexa.

Antennerne forta, klubbformiga. Klubban något äggformig, rät, tilltjoföfnad, med tagg i spetsen.

Palperne längre än hufvudet, något uppåtsligande, framstående, fransade med långa hår, treledade: basleden krökt, bredare än någondera af de öfriga; den medlersta och sista rätta, men deras proportion varierar efter arten *).

Ögonen nakna.

Fötterna lifformiga; låren undertill ludna; tibiae och tarfer sågade medelst forta tänder; de fyra bakre tibierna wid ledfogningen

*) Tabula anatomica proportionem articulorum palporum exhibens:

1. Articulus basalis longissimus (univique reliquorum longior); medius ultimo longior, hic brevissimus omnium, conicus: *mnemosyne*.
2. Articulus basalis medio, hic tamen ultimo fere brevior; ultimus longissimus omnium, gracilis apicem versus sensim attenuatus: *apollo*.

med tarferne bewäpnade med tvänne långa sporrar; 1:sta tarsleden lika lång med de tvänne närmaste, 2, 3 och 4 finsemellan nästan lika långa, men den 5:te lika med den 3:dje och 4:de tillsammansagna.

Wingarne helbräddade, glest fjälliga, halfnafna; isynnerhet undertill mot fanterne blottade från fjäll.

Nerverne på bakvingarne 8: 1—3 från öfre nervstammen, 4—7 från den nedre, 8:de från basen; den 1:sta, som har enkel rot, utlöper till rotloben en rät, mot spetsen affmatnande och enkel gren. Framvingarnes nerver 10: den första ganfka kort, jemte den andra från basen, 3—6 från nedre nervstammen, 7—9 från den öfre, 10:de från basen; den 7:de tregrenig. Framvingarnes tvernerv emellan 6 och 7 vingnerverne afbruten på midten, sammanknuten blott genom en uppsvälning.

De wackra arter, som höra till detta släkte, förekomma endast i bergiga stogstrakter och hafwa blott en generation om året. Deras pupa har mycken likhet med Spinnarnes (Bombyces). Den är slät, framåt trubbig, bakåt tillspetsad och omgifwes af en tunn hylsa af silke, dock icke af tät väfnad, såsom Spinnarnes, utan af spridda trådar, hvarmed larven omgifwer sitt lägerställe, der han skall undergå sin förvandling. Larven utmärkes genom ett tvådeladt spröt, som kan indragas och utstutas, samt är öfver allt betäckt med fina hår, lifnande sammetsludd. Honan har wid anus undertill ett pergamentartadt, säcklikt bihang.

2. Hvita Tunnvingen (*Doritis mnemosyne* Lin.).

Alis albis costis nigris, anticis maculis duabus discoidalibus nigris. L. al. exp. 55—60 millim.

Wingarne hwhita med swarta nerver; de främre med tvänne swarta diffsläckar. L. c. wingsp. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ t.

Syn. Pap. *mnemosyne* Lin. F. Sv. 1033. Fabr. E. S. III. 4. 182. 562. Hübn. Pap. t. 79. 398. Text. 61. 7. *Parnassius* God. et Dup. Lepid. II. 24. pl. 2. f. 3. *Doritis* Ochs. Schm. I 2. 139. IV. 30. Treitsch. X. 4. 86. Dalm. Pap. Sv. 86. 2. II—S. Text. I. 446.

Hvita Tunnvingen är en af våra sällsyntaste flärlarter och träffas endast der och hvar på högländta ängar i bergiga och backiga skogstrakter af Sveriges spåligaste provinser. Ut i Skåne är den träffad i Råsten nära Lund (Zett.) och wid Maltesholm nära W. Wramb (Viljeb.), men är på båda dessa ställen sällsynt. I Blekinge deremot förekommer den på fina ställen temligen talrik, såsom wid Lyckeby och Åsarum (Bhm.). Dess flygtid infaller i Juni och Juli månader.

Artbeskr. Antennerne och klubban svarta. Hufvudet svartbrunt, ludet, äfwenfom palperne. Halsfragen gulbrun. Ryggskölden gråagtigt luden. Abdomen ofwan svart med glefa grå hår; undertill tätare gråluden, i kanterne med gulagtigt fäst. Pergamentåbihanget hos honan gulhvitt. Bröfket gråludet. Fötterne svarta, med glef, gulagtigt fäst der och hvar.

Hanne. Vingarne ofwan hvita, i kanterne blottade från fjell, isynnerhet på de främre. Nerverne ofwan och undertill svarta. De främre vingarne med tvenne svarta fläckar i distfältet, hvilka finnas på båda sidor. De bakre ofwan från basen längs indre kanten svarta; i framkantens midt och wid distfältets slut finnes en svart fläck. Bakvingarnes svarta teckning synes äfwen på undre sidan, ehuru matt och otydligt.

Honan till färgen lik hannen.

Ärven, som är mig obekant, skall lefwa på *Corydalis cava*.

2. Rödfläckiga Tunnvingen (*Doritis apollo* Ltn.)

Alis albis, anticis maculis 5 nigris; posticis ocellis supra 2, infra tribus, ut etiam maculis basilibus, rubris. L. al. exp. 85—90 millim.

Vingarne hvita, de främre med 5 svarta fläckar; de bakre ofwan med 2, undertill med 3 röda oceller och fläckar af samma färg wid basen. *Æ. c. wingsp.* $3\frac{3}{8}$ — $3\frac{5}{8}$ t.

Syn. Pap. *apollo* Ltn. F. Sv. 1032. **Fabr.** E. S. III. 1. 431. 560. **Hüb.** Pap. t. 79. f. 396. 397. fig. 730. 734. Text. 60. 6. **Swartz** Sv. Zool. II. 7. h. n. 44. **Parnassius** God. et **Dup.** Lepid. II. 45. pl. 2. f. 4. **Doritis** **Ochs.** Schm. I. 2. 432. IV. 30. et 452. **Treitsch.** X. 1. 85. **Dalm.** Pap. Sv. 85. 1. II—S. Text. I. 445.

- Var. a. Ocellis magnis rubris, albo pupillatis utrinque (Dalm.)
Ocellerne stora, röda med hwhita pupiller på båda sidor af
vingarne.
- Var. b. Ocellis supra rubris absque pupilla alba, infra albo pu-
pillatis (Dalm. l. c.).
Ocellerne ofwan röda utan hwhit pupill, undertill med hwhit
pupill.
- Var. c. Alis maculis ocellaribus supra nigris, non nisi obsoleto
rubro pupillatis; infra quoque sine pupilla alba (Dalm.).
Wingarne ofwan med swarta, knapt rödpupillerade oceller;
undertill afwen utan hwhita pupiller.

Liksom föregående art träffas denna endast i bergiga och backiga
skogstrakter, men förekommer likväl, ehuru temligen sällsynt, i alla
Sveriges och Norges södra och medlersta landskaper. Inom egentliga
Lappmarkerne lär den ej träffas, men hwar dess nordligaste gräns är
känner man ännu ej. I norra delen af Westmanland förekommer
den på ett och annat ställe, ehuru icke omkring Norberg (Fredrichs.).
I Wermland wid Lesjöfors finnes den afwen (Wahlb.). Dess
flögtid infaller i Maj, Juni och Juli månader. Sällan träffar man
en och annan sednare. Varieteterne förekomma tillsammans; den sista
är dock wida sällsyntare än de öfrige.

Artbestr. Antennerne gråhwhita med mörkare ledafdelningar. Klub-
ban svart. Balperne hwhitgulagtiga, håriga. Hufvudet brun-
grått, hårigt. Halssragen gulgrå. Ryggskölden och abdomen
ofwan med hwhitgrå, lång ludd. Abdomen undertill och bröstet,
samt låren med gulagtigt grå, tät ludd. Fötterne hwhitgrå med
swarta ledafdelningar på tarserne.

Spinne. Wingarne hwhita, slundom flötande i gult; de
främre ofwan och nedan med fem swarta fläckar i disken, af
hwhilka de fyra äro belägne wid framkanten och den femte, som
är rundad, nära infanten. Undertill är slundom en eller an-
nan af dem rödpubrad. Wid basen och längs framkanten finnes
också på båda sidor en mängd swarta atomer hopade, och nära
den blottade utkanten en rad swarta, af atomer bildade fläckar,

som gå från framkanten inåt wingen. Bakwingarne äro ofrån från basen längs indre kanten svartpubrade och på båda sidor försedde med tvenne stora, röda med svart ring omgifna oceller, som ännu hafwa hvita pupiller på båda sidorne, ännu blott på den undre, och stundom sakna sådana, då de äfwen äro söga rödpubrade. Den ena af dessa oceller är belägen nära framkanten, den andra i difsen, dock närmare utkanten än basen. I indre kanten nära anslhörnet finnas äfwenledes på båda sidor några svarta tverflående fläckar, som undertill äro stundom rödpubrade och äfwen endera försedd med hvit pupill. Undertill hafva bakwingarne hela basen betäckt af röda fläckar, som utåt begränsas af svart. På båda sidor finnes nära utkanten en tverrad otydliga, genom svarta atomer bildade fläckar.

Stomak lifnar hannen, men har längs utkanterna såväl på framwingarne som på bakwingarne tydligare fläckar och indre kanten af bakwingarne ofrån mera utbredd svart. Det pergamentartade bihanget vid anus är svartagtigt.

Färgen sammets svart med tvenne rader orangeröda fläckar och flere stålblå vårtor, samt längre stickelhår bland den kortare luddan. Hufvudet är svart med en brandgul fläck i nacken, derifrån det tvådelade sprötet uppstiger. Den lefver på åttskilliga arter af *Sedum*, isynnerhet på *Sedum telephium*. Pupen är i början blekgul, sedan rödbrun och slutligen violett, öfverpubrad med blågrått mjöl.

V. Trib. Equites. (LIN.)

Pedes 6 omnes gressorii, inter se conformes.

Cellula discoidalis alarum posticarum costa transversa ceteris æquali clausa, anticarum costa transversa continua clausa.

Margo anticus alarum anticarum costis quatuor simplicibus, nempe costis alæ 9—12, extenditur.

Costæ alarum posticatarum 8: 1:ma e trunco communi cum 2:da et 3:ta radice duplici egrediens et ramulum bimucronatum in lobum basalem emittens; 8 iterum e basi egrediens; anticarum 12 ad basin invicem subæquales, 8:va biramosa, 4 et 2 e basi egredientes.

Alæ posticæ caudatæ, pro abdomine libero in margine interiori excisæ.

Larva lævis, nuda, tentaculata.

Pupa angulata, antice bimucronata, nuda, ano et filo per midium transverso alligata.

Fötterne: alla sex gångfötter, sînemellan lifformiga.

Diffäktet på bakvingarne slutet genom en tværnerv, som är lif de öfriga wingnerverne; på framvingarne lifaledes slutet genom en oafbruten tværnerv.

Framkanten på framvingarne hålles utspänd genom 4 enkla nerver, nemligen genom 9—12 wingnerverne.

Nerverne på bakvingarne 8: den 1:sta utgående med dubbel rot från samma stam som 2:dra och 3:dje, samt utfärdande en tvåspetad gren åt rotloben; den 8:de återigen från basen. Framvingarnes nerver 12, wd basen sînemellan lifa; den 8:de tvågrenig; den 1 och 2 utgående från basen.

Bakvingarne försedda med en längre stjert, och i indre kanten utsturna för den fria abdomen.

Varven slät, nafen, med ett utsträdbart spröt i hufvudet.

Pupan kantig; framtill tvåtaggig, nafen, fasthängande med anus och medelst en omkring midten slagen tråd.

Äf denna, särdeles i heta zonen, på släkten och arter rika underafdelning räknas icke mer än ett släkte och knappast mer än en art till vår Fauna.

Släktet: **Papilio.** (LIN.) OCHS. et AUCT.

(Amaryssus DALM.)

Antennæ longiores, versus apicem sensim crassiores. Clava oblonga, pyriformis, arcuata.

Palpi brevissimi, adpressi, pilosi, triarticulati. Articulus basalis et medius inter se fere æquales, lati, hic tamen versus insertionem ultimi nonnihil attenuatus; articulus ultimus in pilositate præcedentium plane occultus, minimus, rudimentalis, tertiam partem articuli medii vix attingens, fere rotundatus.

Oculi nudi.

Pedes inter se conformes; femora intra pilosa; tibiæ tarsisque fere ut in genere præcedente serrati et armati; sic etiam proportio articularum tarsorum, sed articulus quartus minimus, et 5 secundo fere æqualis.

Alæ posticæ dentatæ et caudatæ.

Costæ alarum posticarum 8, omnino ut in genere præcedente, sed 1:ma radicem duplicem, unum e basi alæ, alterum o trunco superiori egredientem, habet et ramulum arcuatum bimucronatum in lobum basalem emittit. Costæ anticarum 12: 1:ma, brevissima, et 2:da o basi, 3—6: o trunco communi inferiori, 7:ma o costa transversa cellulæ, 8—11 o trunco communi superiori et 12 iterum o basi egredientes. Costa 2:da cum trunco inferiori costula transversa non procul a basi connectitur, et costa 9:na ex eodem loco cellulæ discoidalis cum 8:va, biramosa, egredit. Costa transversa cellulæ discoidalis continua.

Mutennerne temligen långa, mot spetsen småningom tilltjocknande. Klubban aflång, påronformig, fröft.

Palperne mycket korta, tilltröfsta, håriga, treledade: basleden och den medlersta flödemellan nästan lifa, breda; den sednare lifväl mot ledfogningen med den yttersta något affmalnande; den flsta leden alldeles bold i de föregående hårichet, ganska liten, nästan rudimentär, och rundad.

Ögonen nakna.

Fötterne flödemellan lifformiga; låren undertill håriga; tibier och tarser sågade och bewäpnade såsom hos föregående flägte; tar-

jens leder äfwen lika med föregående slägte, men den 4:de minst och den 5:te nästan lika lång med den 2:dra.

Bakvingarne tandade och fjertade (försedde med en långt utskjutande, fjertlik tand).

Nerverne på bakvingarne 8, alldeles som hos föregående slägte, men den 1:sta har dubbel rot, en kommande från basen och en annan från öfre nervstammen, samt fänder åt rotloben en kröft och tvåspetlig gren. Framvingarnes nerver 12: den 1:sta högst kort jemte den 2:dra kommande från basen, 3—6 från nedre nervstammen, den 7:de från diffäktets twernerv, 8—11 från öfre nervstammen och den 12:te åter från basen; 2:dra wingnerven förenas med nedre nervstammen, icke långt från basen, förmedelst en liten twernerv, och den 9:de wingnerven utgår från samma ställe af diffäktet som den 8:de, hvilken är tvågrenig. Diffäktets twernerv oafbruten.

Af detta slägte räknas med säkerhet blott en art till vår Fauna:

Parasoll-Fjärilen (*Papilio machaon* Lin.).

Alis flavis costis nigris, maculis margineque exteriori, flavo lunato, nigro-fuscis, posticis supra macula subocellari fulva ad angulum ani. L. al exp. 80—90 millim.

Wingarne gula med swarta nerver och swartbruna fläckar och utfant af samma färg; den sednare med gula halsmånformiga fläckar; de bakre ofwan med en rödgul, nästan ocellformig fläck i analhörnet. \varnothing . e. wingsp. $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{5}{8}$ t.

Syn. *Pap. machaon* Lin. F. Sv. 4034. Fabr. E. S. III. 4. 30. 87. Hübn. Pap. t. 77. f. 390. 391. Text. 59. 2. Ochs. Schm. I. 2. 421. IV. 28. Treitsch. X. 4. 79. Swartz Sv. Zool. I. häft. 3. n. 4. Zett. Ins. Lapp. 905. 4. God et Dup. Lepid. I. 38. pl. 4. f. 2. H—S. Text. I. 140. *Amaryssus* Dalm. Pap. Sv. 85. 4.

Fjärilen, som i öfriga Europa förefommer temligen allmän vår och höst, hör till de sällsyntare inom Skandinavien. Den finnes lifvål i hela Sverige och Norge från de sydligaste till de nordligaste landskapen. I Lappmarkerna träffas den i Juli, men

i Skåne i Maj och Augusti månader. Äfwen på Gottland har jag funnit den. Af Adjunct Vilheborg har den blifwit hemförd från Archangel.

Artbeskr. Antennerne swarta. Palperne gulhåriga. Hufvudet och ryggskölden svartludna med tvenne, på den sednare i bredd tilltagande, gula strimmor. Abdomen ofwan svart, undertill och på sidorne gul, med ett svart streck längs hwardera af de sednare. Bröfvet gul-ludet. Fötterne swarta med framtill gulagtiga tibier.

Hanne och hona: Wingarne gula, undertill något blefare, med swarta nerver. De främre ofwan wid basen utåt diffen och i utkanten swarta med gulagtiga atomer; på sednare flället prydd med gula halfmånformiga eller ovala fläckar. I wingspelsen emellan 8 och 9 nerverne finnes en svart, med utkantens färg sammanhängande fläck, försedd med en gulagtig flamma, och i diffen tvenne andra, den indre kommande från framkanten och gående tvärs öfver diffästet, den yttre utanför detta tvernery och ej hinande till framkanten. Bakwingarne ofwan från roten längs indre kanten svartagtiga och i utkanten prydd med ett bredt svart band, hwilket inåt bär en rad genom hopade blåagtiga atomer bildade fläckar och utåt en rad af andra halfmånformiga och gula. Sjelfwa utkanten är gul och i anahörnet finnes en större rödgul, rundad fläck, som är i indre kanten pudrad med blått och omgifwes af en halföppen svart ring. Framwingarne äro undertill tecknade såsom på öfre sidan, men de swarta fläckarne och banden äro tätare pudrade med gult, hwarigenom de synas mätta. Så är äfwen förhållandet med bakwingarne, der likwäl i utkantens swarta färg endast blå streck finnas, motsvarande öfre sidans fläckar af samma färg, och de gula halfmånformiga fläckarne äro större. Bakwingarnes stertilika förlängning, som stundom är något längre, stundom något kortare, är på båda sidor om den deri utlöpande nerven svart, tillsölje af det swarta här utlöpande strecket, som bakåt begränsar de gula fläckarne i utkantens swarta färg.

Varven, som lefwer på Dill, Morot, Bimpinella, Berjilla och flera andra parasollväxter, är såsom yngre svart med forta, wid roten persfärgade taggar och har en hvit fläck på ryggen; men såsom äldre försvinna taggarne och färgen blir grön, något stötande i blått, med svarta ringar, prydd af rödbruna punkter. **Puppen**, som har högt upplående ryggregion, är gulgrönagtig och på längden gulstrimmig.

Anm. För vidare efterforskning inom Stantianien, serdeles på Gottland, må här uppföras kännetecken på en, nu beskrifna närliggande art, hvilken väl ännu icke blifvit i något af de förenade Rikena med säkerhet anmärkt, men dock måhända finnes:

Blommön-Björillen (*Papilio podalirius* LIN.)

Alis flavis, utricque nigra fasciatis; posticis supra ad angulum anterioris macula nigra, coerulescens adspersa et fulvo circumcincta.

Wingarne gula, med svarta tverband på båda sidor; de bakre esvan wid analhörnet prydda med en svart, bläpudrad och af rödgult omgifven fläck.

Syn *PAPILIO podalirius* LIN. S. N. I. 2. 784. 36. FÄHR. E. S. III. 4. 24. 74. HÖBN. Pap. 1. 77. f. 388. 390. OCHS. Schm. I. 2. 448. IV. 28.

Utmärkt föregående, men har längre hjertförlängning i bakvingarnes utkant och har esvan och undertill svarta tverband, som till en del hinna indre kanten af framvingarne eller analhörnet af bakvingarne och till en del upphöra dessförinnan. I bakvingarnes svartagtiga utkant finnes en rad halfmånerformiga blå fläckar och wid analhörnet en svart, rundad, med blått prydd fläck, utmärkt hvilken grundfärgen är rödgul.

Varven, som lefwer på åttilliga fruktträd, såsom Äpple, Bären, Plommon och Råsbärsträd, är gulagtigt grön med röda punkter och hvitgula linier på rygg och sidor. **Puppen** är på framkroppen brun, men på abdominalregionen gul med svarta ringar och punkter.

Björillen träffas i Maj och Augusti på flera ställen i Europa, såsom i Frankrike, Österrike och äfven i norra Tyskland. På Gottland har jag år 1849 wid Myrvalder sett en björil, som jag förmodar varit denne, men då jag icke kunde benägmiga mig honom, kan jag ingenting bestämt derom afgöra; hvarföre jag med nu lemnade forta beskrifning blott velat såsta Fersfäres uppmärksamhet att densamma efterse.

VI. Trib. Lycænoïdæ.

Pedes 6 gresorii; antici maris reliquis breviores, feminae tamen omnes inter se conformes et æquales.

Cellula discoidalis alarum aperta, costa transversa tantum spuria, tenuissima, clausa.

Margo anticus alarum anticarum costis quatuor aut simplicibus, aut una biramosa, (rarius triramosa) nempe costis alæ 7—10, l. 6—9 extenditur.

Costæ alarum posticarum 9: 4:ma o tronco communi cum 2—4 radice simplice egrediens, ramulum nullum in lobum bisalem emittens; 8—9 iterum o basi egredientes. Costæ anticarum 10, ad basin inter se æquales, rarius tantum 9: 4:ma o basi, 6:ta biramosa, (rarius triramosa), aut simplex.

Alæ posticæ pro receptione abdominis canaliculatæ, in margine exteriori aut caudatæ, aut dentatæ, aut integræ.

Larva fere ovalis, aselliformis capite retractili, pedibusque brevibus.

Pupa brevis, obtusa, apice anali et filo per medium transverso alligata, rarius libera in terra quiescens.

Fötterne 6, gångfötter; främsta paret hos hannen fortare än de öfrige, men hos honan alla finskemellan lifformiga och lifa långa.

Diffältet på vingarne öppet, blott slutet genom en ganfsta fin, falsk twernerv.

Framfanten på framvingarne hålles utspänd genom fyra nerver, antingen alla enkla, eller ock den ena tvågrenig, sällan tregrenig; nemligen genom 7:de—10:de eller 6:te—9:de vingnerverne.

Nerverne på bakvingarne 9: den 1:sta utgående från gemensam stam med den 2—4, wid basen enkel och utfädbande ingen gren åt rotloben; 8—9 åter utgående från basen. Framvingarne 8 nerver 10, finskemellan wid basen lifa, sällan blott 9: den 1:sta från basen; den 6:te tvågrenig, (sällan tregrenig) eller enkel.

Bakvingarne i indre fanten nebböjda till en ränna, deri abdomen upptages; i yttre fanten antingen fjertade, tandade eller hela.

Parven nästan oval, afellformig med indragbart hufvud och korta fötter.

Pupan kort, trubbig, fasthängande wid anus och medelt en om froppens midt slagen tråd, sällan hvilande fri i jorden.

Githörande arter träffas i lundar och på ängar, till större delen temligen allmänna och hafva dels twenne dels blott en generation om året. Deras flugt är än snabb och uthållande, än afbruten och fladdrande. Såsom larver angripa några få trädens och buskarnes blad, men de flesta lefwa på lägre dicotyledona växter.

Gruppen sönderfaller i följande fyra släkten:

A. *Alæ posticæ caudatæ*.

Bakvingarne med stertlik förlängning i httre kanten.

1. *Costa sexta alarum anticarum triramosa*. } **Zephyrus.**
Framvingarnes 6:te nerv tregrenig.

2. *Costa sexta alarum anticarum simplex*. } **Thecla.**
Framvingarnes 6:te nerv enkel (utan grenar).

B. *Alæ posticæ dentatæ*. *Costa sexta, simplex, et septima, biramosa, alarum anticarum o loco eodem cellulæ discoidalis egredientes, rarissimo in trunco brevi conjunctæ*. } **Polyommatus.**

Bakvingarne i utfanten tandade. Den 6:te, enkla, och den 7:de tvågreniga nerven på framvingarne utgående från samma ställe af distfältet, sällan förenade med hvarandra i en kort stam.

C. *Alæ posticæ integræ*. *Costa 6, simplex, et septima, biramosa, alarum anticarum o locis diversis cellulæ discoidalis egredientes*. } **Lycæna.**
Bakvingarne i utfanten helbräddade. Den 6:te, enkla, och den 7:de tvågreniga nerven på framvingarne utgående från skilda ställen af distfältet.

Släktet: Zephyrus. (DALM.)

(Polyommatus. LATR. Hesperia et Thecla. FABR. Lycæna. OCHS.
Zephyrus DALM. ex parte.)

Antennæ longiores, extrorsum sensim crassiores.

Palpi squamati, infra breviter ac parco pilosi, apicibus nutantibus; triarticulati. Articulus medius reliquis conjunctis longior, basali latitudine æqualis, sed versus insertionem articuli ultimi nonnihil attenuatus; ultimus subnudus, basali brevior, apicem versus tenuior; fere conicus.

Oculi hirti.

Pedes antici maris reliquis nonnihil breviores, feminae tamen illis æquales; femora infra dense pilosa; tibiæ pedum anticorum inermes, sed reliquorum calcaribus duobus validis ad insertionem tarsorum armatæ; tarsi pilis longis dentiformibus infra instructi, antici maris, ut videtur, quadriarticulati, reliqui ut etiam omnes feminae quinquearticulati: articulus primus tibiis gracilior, reliquis conjunctis longitudine æqualis, ceteri inter se æquales.

Alæ posticæ ad marginem interiorem prope angulum ani excisæ, in margine exterioro caudatæ.

Costæ alarum posticarum 9: 4—3 o trunco communi superiori, 4 o costula spuria cellulæ, 5—7 o trunco communi inferiori, 8—9 o basi egredientes. Costæ anticarum 9: 4 o basi, 2 4 o trunco communi inferiori, 5 o costula transversa spuria, 6—8 o trunco communi superiori, 9 iterum o basi egredientes; 6:ta triramosa.

Antennæve temligen långa, utåt småningom tilltjocknande.

Halperne fjälliga, undertill fort och glest ludna, med lutande spetsar, treledade; medlersta leden längre än de öfrige tillammanstagna, lifa bred med basleden, men mot den sista ledfogning något afsmalnande; första leden fortare än basleden, nästan nästan, mot spetsen smalare; nästan konisk.

Ögonen ludna.

Fötterna: de främre hos hannen något fortare än de öfriga, men

hos honan lifa långa med besja; låren undertill tätludna; främsta parets tibier oöfverade, men de öfriga öfverade med 2:ne starka sporrar vid ledfogningen med tarsen; tarserne undertill försedda med långa, tandformiga hår; de främre hos hannen, såsom det synes, fyrledade, men de öfriga och alla hos honan femledade: första leden smalare än tibierne, längre än de öfriga tillsammans; de öfriga sammanhängande lifa.

Bakvingarne i indre kanten nära analhörnet utskurna, i yttre kanten försedda med fjertlik förlängning.

Nerverne på bakvingarne 9: 1—3 från öfre nervstammen, 4 från distalkantets sista tvärvägg, 5—7 från nedre nervstammen, 8—9 från basen. Framvingarnes nerver 9: 1:sta från basen, 2—4 från nedre nervstammen, 5 från den sista tvärväggen, 6—8 från öfre nervstammen, 9:de åter från basen; den 6:te tregrenig.

De tvänne till detta släkte hörande Skandinaviska arterne wisas isynnerhet i skogssträcker, der deras larver lefva på trädens och buskarnes löf. Larverne äro afslångade, d. v. s. afslängt ägg-runda med hvalförmig rygga och mot sidorna utplattade, så att fötterna, som äro mycket korta, sitta helt och hållit inunder kroppen, längs sidorna. Hos detta släkte äro de mot anus afsmalnande och således bredare framtill mot hufvudet, som kan indragas i de första kroppsringarne. Kroppen är täckt med korta hår och har mindre hvalförmig rygga än hos följande släkten. Pupan är sälad vid ett blad och är undertill platt, men på ryggen ganska hvalförmig, öfverallt något hårig, nästan jemntöck och alltid utan taggar.

I. Eke-Snabbvingen (*Zephyrus quercus* Lin.)

Alis infra cinereis striga alba, intus obscuro marginata, ot ad angulum ani posticarum macula gomina fulva. L. al. exp. 30—35 millim.

Mas: alis supra fuscis, cyaneo micantibus, marginibus nigris.

Femina: alis supra fuscis; anticis disco coeruleis.

Vingarne undertill afsegrå med en hvit, inåt mörkt kantad strimma och vid analhörnet på bakvingarne en dubbel rödgul fläck.
L. e. wingsp. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{7}{16}$ t.

Stamne: vingarne ofwan mörkbruna med blå glans och swarta kanter.

Söna: vingarne ofwan mörkbruna, de främre i disken blå.

Var. h. { Alis anticis supra maculis 4—3 fulvis. (Föm.)
 { Framvingarne ofwan med 1—3 rödgula fläckar (hona).

Syn. Pap. *quercus* Lin. F. Sv. 1072. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 1. 278. 72. *Papilio* Hübn. Pap. L. 73. f. 368—370. I. 121. f. 621. (var.) Text. 56. 43. *Lycæna* Ochs. Schm. I. 2. 96. IV. 27. Treitsch. X. 1. 239. *Zephyrus* Dalm. P. Sv. 90. 1. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. I. 490. pl. 9 secund. f. 1. pl. 9 tert. f. 3. *Thecla* H—S. Text. I. 437. **Gerhard** Lycænen. pl. 3. f. 3.

Denna vackra art träffas uti ofestfog i södra och medlersta Sverige åtminstone ända till Stockholm temligen allmän under Juli och Augusti månader, stundom också, ehuru mera sällsynt, under September. I Skåne är den nämnde tid icke sällsynt på flera ställen, såsom wid Gephult, W. Wramb, Öppmana, Kullen och Gæperöd. I Blekinge har jag tagit den wid Sölvesborg och Carlshamn. I Småland, Bohuslän och på Gotland (Vhm.), äfvensom i Östergötland (Stenh.) är den der och hvar talrik. Lifaså omkring Stockholm. Nordligare är det mig icke bekant, att den förekommer, och inom Norge är den ännu ej anmärkt.

Artbeskr. Antennerne swarta med hwhita ringar. Klubban ofwan och undertill rödgul. Palperne ljusgrå med svartagtig spets. Ögonen omgifna af en glänsande hwhit ring. Hufvudet emellan ögonen och under antennerne blåagtigt grått med tvänne swarta streck, för öfrigt brunludet äfvensom ryggskölden. Abdomen ofwan swartbrun, undertill gråagtig. Bröfket hwhitgrått. Fötterne hwhitgrå, der och hwar stötande i gult. Larjerna svartringade. Bakvingarne med en smal, hjertlik förlängning i utkanten nära analhörnet, i hwilket finnes en tagg, bildad af wingen och ett tätare hopande af fransar.

Stamne: Wingarne ofwan swartbruna med mörkblå glans, som är mer eller mindre stark och tydlig allt efter dagern. Framvingarne blott i utkanten, men bakvingarne i alla kanterna

temligen bredt svart. Vingarne undertill asfegrå med en, isynnerhet på de bakre vågig, hvit tverstrimma, hwilken inåt begränsas af en mörkbrun eller svartagtig fluggning och på framvingarne försvinner innan den hunnit infanten. Längs utkanterna löper en rad af otydliga, hwitagtiga, inåt mörkfluggade, isynnerhet på bakvingarne månformigt böjda streck, hwilka nära framvingarnes bakre hörn gränsa intill mörkbruna, utåt stundom swagt rödgulagtiga fläckar. På bakvingarne finnes midt för den fjertlikå förlängningen en rödgul fläck, som i midten har en svart punkt; i analhörnet finnes en annan af samma färg, som sänder en smal strimma inåt infanten och utåt begränsas af en svart fläck. En smal hwitagtig linia löper innanför en gråagtig längs wingarnes utkanter och är tydligast på de bakre. Franarne äro ofwan wid roten brunagtiga, i spetsen ljusgrå, men närmare framwingarnes bakre hörn nästan hwita; undertill äro de asfegrå.

Honan har wingarne ofwan svartbruna och på framwingarne en blå, i rödt flimrande fläck, hwilken sträcker sig från basen till diffjäktets tvernerw och derifrån bort mot wingens bakre hörn, hwilket den liwäl icke upphinner, samt följer wingens första nerv med sin bakre och längsta kant. För öfrigt liknar hon till färgen hannen.

Larven, som i början af Juni träffas fullvuxen på ekens blad, är bred, något platt, brunagtig med en rad upphöjda, trefantiga, genom en svart linia delade, gula fläckar, samt ledafdelningar af samma färg. Huswudet är rundadt och brunt, men de bakre kropperingarne oftast gulagtiga. Hupan är rundad, på midten tjockare, brun med ljusare fläckar.

2. Björke-Snabbvingen (*Zephyrus betulae* Lin.)

Alis infra luteis; anticis macula fusca ad costulam transversam cellulæ et fascia fulva postica; posticis fascia fulva utrinque albo marginata. L. al. exp. 35—40 millim.

Mas : Alis supra fuscis ; posticis maculis duobus fulvis in margine exteriori.

Femina : Alis supra fuscis, anticis macula magna lutoo-fulva in disco ; posticis ut in mare.

Wingarne undertill gula ; de främre med en brun fläck wid distfästets tvernerb och ett rödgult tverband nära utfanten ; de bakre med ett rödgult, inåt och utåt hwitkantadt tverband. L. e. wingsp. $1\frac{7}{16}$ — $1\frac{5}{8}$ t.

Hanne : wingarne ofwan mörkbruna ; de bakre med 2:ne rödgula fläckar i utfanten.

Hona : Framwingarne ofwan mörkbruna med en stor gul-röd fläck i disten ; de bakre såsom hos hannen.

Syn. Pap. *betula* Lin. F. Sv. 4070. Hüb. Pap. t. 76. 383—385. Text. 58. 51. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 4. 277. 69. *Lycæna* Ochs. Schm. I. 2. 113. IV. 28. Treitsch. X. 1. 79. 240. *Zephyrus* Dalm. Pap. Sv. 90. 2. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. I. 484. pl. 9. f. 4. *Thecla* Zett. Ins. Lapp. 909. 4. II—S. Text. I. 437. Gerh. *Lycænen*. pl. 4. f. 4.

Liksom föregående förekommer äfwen denna art i skogstrakterne af södra och medlersta Sverige, men är mycket sällsyntare och träffas icke på alla ställen. I Skåne finnes den der och hvar bland björk- och slånbuskar, någon gång äfwen i trädgårdar. I Blekinge har jag träffat den wid Sölvesborg. Wid Sjöbo nära Mässholm i Småland är den funnen af Prof. Boheman och i Östergötland förekommer den wid Häradshammar (Stenh.). I Upland är den anmärkt både wid Upsala och Stockholm ; samt i Norrige wid *Chri- stiania* (Siebke). Huru högt den går mot Norden är obekant. I norra delen af Westmanland och i den södra delen af Dalarne förekommer den ej (Fredrichs.), men Prof. Betterstedt anför den såsom högst sällsynt i Rappmarkerne, dock känner jag icke något ställe, hwarest den der i sednare tider blifwit träffad. Deß flygtid infaller i Augusti och September månader och sjärilen synes vara i rörelse endast några timmar wid middagstiden.

Artbeskr. Antennerne swarta med hwita ringar. Klubban swart, i spetsen rödgul. Palperne hwita, i spetsen swarta. Ögonen omgifna af en hwit ring. Hufvudet med rödbrun ludd, samt anslutning till tvenne swarta linier emellan ögonen. Thorax brunluden. Abdomen ofwan brun, undertill hwitagtig. Bröfvet hwitludet. Fötterne hwita med swartringlade tarser. Vingarnes form såsom hos föregående.

Hanne. Vingarne ofwan mörkbruna med obetydlig glans. De främre med ett swartagtigt streck wid distäktets slut och en lufare, i rödgult flötande, otydlig fläck derutanför. De bakre med en rödgul fläck i analhörnet och en annan på den fjertilika förlängningen. Undertill äro vingarne wackert gula, flötande i rött. De främre hafwa wid distäktets twernerv en brunagtig, med hwitt otydligt begränsad fläck, och utanför denna ett rödgult eller rostfärgadt band, som wid framkanten är bredast och bakåt slutar i en spets innan det hunnit infanten, samt utåt begränsas af en hwit och en mörkbrun linie, men inåt af en otydlig teckning af samma färg. Öfver bakwingarne går också ett rödgult eller rostfärgadt band, hwars båda sidor begränsas af en glänsande hwit och en mörkbrun linie, af hwilka lifwäl den indre ofta upphör på wingens midt eller blott otydligt fortsättes mot infanten. Fransarne ofwan och undertill hwita, men på bakwingarnes undre sida, framom den fjertilika förlängningen och derifrån till analhörnet, nästan swarta med blott korta hwita spetsar.

Honan lifnar hannen, men har på framwingarne en stor, gul, i rött flötande fläck, hwilken, belägen utanför distäktets twernerv, sträcker sig på tweren långt bakåt utan att hinna wingarnes infant, lifsom den ej eller räcker ända till den främre, ehuru den kommer närmare denna, än den förra.

Varven, som i Maj utflädes och lefwer på Björk, Slåne och Blommonträdb, är grön med upphöjda, gula ryggs- och sidolinier, samt något mörkare gula strållinier på sidorne. **Hupan** är brun med otydliga, lufare strimor.

Släktet: **Thecla** (FABR.)

(Polyommatus LATR. Hesperia FABR. Zephyrus DALM.

Lycæna OCHS.)

Antennæ longiores, extrorsum incrassatæ, clavam elongatam, cylindricam, haud determinatam constituentes.

Palpi *) squamati, intra plus minus pilosi, apicibus porrectis l. subadscendentibus, triarticulati. Articulus medius reliquis conjunctis haud longior, articulationem versus ut in genere præcedente gracilior; ultimus subnudus, basali aut longitudine æqualis aut eo longior, gracilis, latitudine conformis.

Oculi hirti.

Pedes ut in genere præcedente, sed articulus secundus tarsorum, præsertim posticorum, tertio, hic quarto, minuto, longior, et quintus secundo æqualis.

Alæ ut in genere præcedente.

Costæ alarum posticarum omnino ut in genere præcedente; anticearum 10: 1 o basi, 2—4 e trunco communi inferiori, 5 e costula transversa spuria, 6—9 o trunco communi superiori, 10 iterum o basi egredientes, 6—7 simplicis, ex eodem loco, angulo antico, cellulæ discoidalis egredientes.

Antennæ temligen långa, utåt tilltjocknande, bildande en aflång, cylindrisk, föga affäld klubba.

Palperne *) fjälliga, undertill mer eller mindre ludna, med framstående eller något uppåttågande spetsar, treledade; medlersta leden söga längre än de öfriga tillsammans, mot ledfogningen, såsom hos föregående släkte, smala; yttersta leden nästan nafen, antingen lika lång med basleden eller längre än denna, smal, till hela bredden lifformig.

Ögonen ludna.

*) Tabula anatomica palporum articulorum proportionem exhibens:

1. Articulus ultimus basali longior: *Th. lynceus* *W. album*.

2. Articulus ultimus basali longitudine æqualis: *Th. pruni et rubi*.

Fötterna såsom hos föregående släkte, men tarsernes andra led, isynnerhet på de bakre, längre än den 3:de och denna längre än den 4:de, som är minst; den 5:te lika med den 2:dra.

Wingarne såsom hos föregående släkte.

Nerverne på bakwingarne alldeles som hos föregående släkte; på framwingarne 10: den 1:sta från basen, 2—4 från nedre nervstammen, 5:te från den falska tværnerven, 6—9 från öfre nervstammen, 10:de åter från basen; 6:te och 7:de utgå från samma ställe af distfältet, nemligen från dess främre hörn, och äro enkla (utan grenar).

Detta släktes arter hafwa samma lefnadsfätt som föregående; men deras larver äro något smalare bakåt och pupor antingen smalare mot anus och fläta eller också något taggiga och kantiga.

I. Jerneke-Snabbvingen (*Thecla lynceus* Fabr.)

Alis infra fuscis striga lunata alba, extus sinuata, in anticis obsoleta; posticis maculis marginalibus disjunctis fulvis. L. al. exp. 35—40 millim.

Mas: alis supra fuscis macula fulva ad angulum ani.

Femina: alis supra fuscis; anticis macula fulva indeterminata.

Wingarne undertill bruna med en hvit strimma, bestående af halfmånar, som wända den konkava sidan utåt och på framwingarne äro otydliga; de bakre med stilda rödgula fläckar i utfanten. *L. e. wingsp. $1\frac{7}{10}$ — $1\frac{5}{8}$ t.*

Samme: wingarne öfwan bruna med en rödgul fläck i analhörnet.

Samma: wingarne öfwan bruna, de främre med en rödgul fläck utan bestämda gränser.

Syn. Hesperia lynceus Fabr. E. S. III. 4. 276. 73. *Pap. ilicis* Esp. Schm. I. t. 39. Sp. 45. t. 4. b. p. 353. *Lycæna* Ochs. Schm. I. 2. 103. IV. 27. Hübner. Pap. I. 73. 378. 379. Text. 57. 47. *Zephyrus* Dalm. P. Sv. 94. 5. *Thecla* H—S. Text. I. 136. *Polyommatus lynceus* God. et Dup. Lepid. I. 486. pl. 9 tert. f. 1. *Gerh. Lycænon*, t. 2. f. 2.

Denna sällsynta art träffas så widt jag wet endast i Skåne och Blekinge, der den på några ställen i Juli månad flyger bland efeubar. Vid Lund, (i Råsten) har Prof. Zetterstedt tagit den, och jag har träffat den temligen talrik wid W. Bramb och wid Sölvesborg.

Artbeskr. Antennerne swarta med hwhita ringar. Klubban ofwan swart, i spetsen och undertill rödgul. Palperne swarta, wid roten och på indre sidan hwhitagtiga. Ögonen omgifna af en hwhit ring. Hufvudet swartludet med några hwhitagtiga hår mellan antennerne. Ryggskölden brunluden. Abdomen ofwan brun, undertill gråagtig. Bröfket gråblått, ludet. Fötterne hwhitgrå, med swarttringlade tarfer. Bakwingarne i bakre kanten försedda med en kort fjertlik förlängning.

Hanne. Wingarne ofwan mörkbruna; de bakre med en rödgul, slundom otydlig, fläck i anahörnet. Wingarne undertill bruna, dragande i rött, prydda med en strimma af hwhita streck och halfmånar, hwilka sednare wända den konkava sidan utåt och äro på framwingarne otydliga. På bakwingarne är denna strimma mycket wägig mot infanten, och wid utfanten finnes en rad rödgula fläckar, som inåt begränsas hwardera af en swart halfbåge; i sjelfwa utfanten af samma wingar går en hwhit linie. Framwingarne äro wid basen i främre kanten smalt gulagtiga. Bränarne ofwan och undertill bruna, men på bakwingarnes fjertlika förlängning och derifrån till anahörnet hwhitagtiga, blandadt med swart.

Honan liknar hannen, men har på framwingarnes öfre sida en rödgul fläck, som delas genom de mörka wingnerverne och inåt förlorar sig i grundfärgen.

Larven är blekgrön med 3:ne afbrutna gula linier, en längs ryggen och en längs hwardera sidan. Hufvudet och bröstfötterne äro swarta. Den lefwer i Maj på Ek. Puppan är i början gulagtig, sedan brun med 3:ne rader mörka punkter på abdominalregionen.

2. Alme-Snabbvingen (*Thecla W album* Knoch.)

Alis infra fuscis, striga alba, in posticis W album mentio; posticis fascia aurantia marginali. L. al. exp. 30—35 millim.

Mas. et Femina: alis supra fuscis, posticis macula fulva ad angulum ani.

Wingarne undertill bruna med en hvit strimma, som på de bakre lifnar ett W; de bakre desutom med ett orangefärgadt tverband i utkanten. L. e. wingsp. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{7}{16}$ t.

Hanne och hona: Wingarne ofwan bruna; de bakre med en rödgul fläck i anahörnet.

Syn. Pap. *W album* Knoch. Beitr. II. 85. t. 6. f. 1. 2. Hübn. Pap. t. 75. f. 380. 381. Text. 58. 49. *Lycæna* Ochs. Schin. I. 2. 109. IV. 28. *Zephyrus Dalm.* Pap. Sv. 94. 4. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. I. 188. pl. 9. f. 3. pl. 9. tort. f. 2. *Thecla* Zett. Ins. Lapp. 909. 2. II—S. Text. I. 136. Gerh. Lycænen. t. 4. f. 3.

Denna fjäril är också ganska sällsynt, men finnes likväl på flera ställen än den förra i södra och medelsta Sverige. I Skåne är den funnen talrik i Paradisöfkan wid Lund (Zett.). I Upland finnes den ej sällan wid Stockholm (Whm.) och Upsala (Meives); äfvenfå har jag erhållit den från Westmanland genom Herr Fredrichson. Detta är äfven för arten den nordligaste lokal inom Sverige, man hittills med wisshet känner. I Norge är den funnen wid Christiania (Siebke). Dess flygtid infaller i Juni och Juli månader.

Artbest. Antenner och öfriga kroppsdelar såsom hos föregående art, men bröstet är brunludet och bakwingarne hafwa längre fjertlik förlängning och desutom framom denna en mindre.

Hanne och hona. Wingarne ofwan svartbruna; de bakre med en liten rödgul fläck i anahörnet. Undertill äro wingarne bruna, stötande i rött, med en hvit tverstrimma, hwilken på de framre är lika tydlig som på de bakre och nära infanten inåtböjd; på de sednare är den derjemte nära infanten och anahörnet tvenne gånger skarpt vinklad, så att den lifnar ett dubbelt latinfkt W.

Längs de bakres utkant går ett orangefärgadt tverband, som afsmalnar framåt och inåt begränsas af en rad svarta halfbågar, samt nära analhörnet har en blåagtig och längs utkanten en eller flera svarta fläckar. Inom och utom detta tverband går en mer eller mindre tydlig, hvit linia. I fjelfwa analhörnet finnes en svart fläck. Fransarne såsom hos föregående.

Varven, som lefwer på Alm (*Ulmus compostris*), är grön med 3:ne mörkröda, stundom omärkliga, fläckar på hwar och en af de bakersta froppbringarne, samt har längs ryggen en dubbel rad af spetsar. Nära förvandlingstiden blir den brunagtig. **Pupan** har små hår och är gråbrun med mörkare vingflidor.

3. Plommon-Snabbvingen (*Thecla pruni* Lln.)

Alis infra olivaceo-fuscis striga alba; posticis fascia marginali fulva nigro punctata. L. al exp. 30—35 millim.

Mas: alis supra fuscis; posticis maculis marginalibus fulvis.

Femina: alis supra fuscis maculis marginalibus fulvis.

Wingarne undertill olibruna med en hvit strimma; de bakre med ett rödgult, svart punkteradt tverband wid utkanten. *L. e. wingsp. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{7}{16}$ t.*

Hanne: wingarne ofwan bruna; de bakre med rödgula fläckar i utkanten.

Hona: wingarne ofwan bruna med rödgula fläckar i utkanten.

Syn. Pap. pruni Lln. F. Sv. 4074. Hüb. Pap. t. 76. f. 386. 387. Text. 58. 50. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 1. 277. 70. *Lycæna* Ochs. Schm. I. 2. 441. IV. 28. *Zephyrus* Dalm. Pap. Sv. 91. 3. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. I. 184. pl. 9. f. 2. *Thecla* H.—S. Text. I. 136. *Gerh. Lycænen*. t. 1. f. 2.

Denna är den sällsyntaste arten af släkten och så widt jag wet endast funnen wid Lund af Prof. Betterstedt. Dess flygtid infaller i Juli, då såärilen träffas merendels på Glånbussar.

Artbeskr. Kroppsbelarnes färg och form lik föregående arts; men denna har blott en hjertlik förlängning i bakvingarnes yttre kant.

Samn. Vingarne ofwan svartbruna; de bakre med en rad halfmånformiga, rödgula fläckar längs utkanten, innanför hvilka går en hwitagtig, stundom otydlig linia. Undertill äro vingarne olivbruna med en hwit, i korta linier upplöst strimma, som inåt begränsas af svart och är lika tydlig på alla vingarne. Längs utkanten af framvingarne går en rad matta och otydliga rödgula fläckar, af hvilka en och annan är inåt försedd med en svart fläck, som lifalebes inåt otydligt begränsas af hwitt. Längs utkanten af bakvingarne gå ett rödgult tverrband, hvilket är inåt försedt med runda, och utåt med trekantiga, svarta fläckar. De indre af dessa äro inåt och de yttre utåt begränsade med hwitt. I analhörnet finnes en svart fläck och framfarne äro såsom hos föregående art.

Honan lifnar hannen, men har på framvingarnes öfre sida nära bakre hörnet några rödgula fläckar, motsvarande bakvingarnes.

Varven, som lefwer på *Prunus spinosa* och *domestica*, är blekgrön med längslinier och fina tverstreck af hwit färg samt sex par korta, föttiga, svartpunkterade upphöjningar på ryggen. Dess hufvud är gult med tvenne svarta punkter. **Mupan** är kort, i främre delen tjock och med skarpt affild, samt något taggig abdominalregion. Till färgen är den mörkbrun med hwita ledafdelningar och hwitpunkterad hufvudregion.

4. Björnbärs-Snabbvingen (*Thecla rubi* Lin.)

Alis infra viridibus, posticis aut unicoloribus aut punctis nonnullis albis. L. al. exp. 25—30 millim.

Mas: alis supra olivaceo-fuscis, anticis loco obscuro supra excavato, infra convexo.

Femina: alis supra olivaceo-fuscis.

Wingarne undertill ljusgröna, de bakre antingen enfärgade eller och försedde med några hvita punkter. L. e. wingsp. 1—1 $\frac{1}{4}$ t.

Stamme : wingarne ofwan olivbruna, de främre med ett mörkt fläcke, som ofwan är utholkad och undertill konvert.

Sona : wingarne ofwan olivbruna.

Syn. Pap. *rubi* Lin. F. Sv. 1077. Hüb. Pap. t. 72. f. 364. 365. Text. 55. 44. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 4. 287. 402. *Lycena* Ochs. Schm. I. 2. 94. IV. 27. *Treitsch.* X. 4. 77. Zett. Ins. Lapp. 910. 1. *Zephyrus* Dalm. Pap. Sv. 94. 42. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. I. 206. pl. 40. f. 3. pl. 40 secund. f. 5. *Thecla* H—S. Text. I. 135. Gerh. *Lycænon*. t. 3. f. 2.

Björnbärs-Snabbvingen är den allmänaste arten inom släktet och träffas i alla stogar, såväl löf- som barrstogar, på hela vår halfrö, de nordligaste trakterne icke undantagna. Dess flygtid infaller i Maj och Juli månader.

Artbeskr. Palperne whitagtiga, utåt svartagtiga och undertill bewurna med grå hår. Hwardera ögat omgifvet af en wit ring, närmast hwilken ögat framtill är guldgulansande. Snutwedet brunhårigt; mellan antennerne äro likväl båren gråagtiga. Antennerne swarta med hvita ringar. Klubbarn i spetsen rödgul. Ryggskölden bewuren med blåagtig ludd. Abdomen ofwan brun, undertill grönagtig. Bröflet grålubet. Fötterna blågråagtiga med swartringlade tarfer.

Stamme. Wingarne ofwan olivbruna, obetydligt glänfande, wid basen matt svartagtiga. Framwingarne hafwa nära främre kanten wid diffältet en mörkare fläcke, som ofwantill är fördjupad och undertill upphöjd. I analhörnet af bakwingarne finnes stundom en otydlig gulagtig fläcke och fransarne, som för öfrigt hafwa samma färg som wingarne, äro här whitagtiga. Undertill äro wingarne ljusgröna med ett smalt brungult streck längs utkanterna och dylik färgläggning i framkanten af framwingarne. Bakwingarne hafwa i analhörnet en svart fläcke och ofta i framkanten en wit punkt, hwilken stundom är åtskild af en rad dylika tvärs öfwer wingen, men stundom äfwen saknad. Sällan

finnes en och annan hvit punkt på framvingarne. Fransarne såsom på öfre sidan.

Sonau, som liknar *Hannen*, saknar det omnämnda urholfade flället på framvingarne.

Parven är gräsgrön eller gulgrön med hvitagtig rugglinia, en rad trefantiga blefgula fläckar längs sidorna och en hvitagtig linia öfver fotraden. Den lefver på *Rubus fruticosus*, *Sarothamnus scoparius* m. fl. andra växter. *Pupan*, som är till främre delen uppblåst, har brun färg och ljusare lufthål. Hon öfvervintrar.

Släktet: **Polyommatus** (LATR.)

(*Lycæna* FABR. OCHS. ZETT. *Hesperia* FABR. *Zephyrus* DALM.)

Antennæ longiores, clavatæ; clava brevis, oblongo-ovata, crassa determinata.

Palpi spuamati, infra dense pilosi, apicibus porrectis l. subadscendentibus, triarticulati. Articulus medius reliquis conjunctis longior; basalis minutus; ultimus basali multo longior, gracilis, attenuatus, apice acuto.

Oculi nudi.

Pedes ut in genere præcedente, sed articulus tarsorum primus tibiis vix gracilior, rarius in posticis iis distincto crassior et articulis reliquis conjunctis longior.

Alæ posticæ ut in genere præcedente, sed in margine posteriori tantum dentatæ.

Costæ alarum posticarum ut in præcedentibus; anticarum 10 ut in genere præcedente egredientes, sed costa septima bibramosa*). Costa sexta et septima o loco eodem cellulæ egrediuntur.

*) *Polyommatus virgaureæ* interdum costas tantum novem habet, quoniam tunc costæ 6 et 7, ex eodem loco cellulæ egredientes, in trunco brevi communi sunt conjunctæ.

Antennerne temligen långa, jörsedda med flulba. Denna är kort, aflångt-äggformig, tjock och tydligt affkilad från skafvet.

Palperne fjälliga, undertill tätt ludna, med framstående eller upptågande spetsar, treledade: medlersta leden längre än de öfriga tillsammansantagna; basleden liten; sista leden mycket längre än basleden, smal, skarpt tillspetsad.

Ögonen nakna.

Fötterna såsom hos föregående släkte, men första tarsleden knapt smalare än tibierne, fjällan hos de bakre tydligt tjockare än desä och längre än de öfrige lederna tillsammansantagna.

Bakvingarne såsom hos föregående släkte, men i utfanten blott tandade.

Nerverne på bakvingarne såsom hos föregående släkte; på framvingarne tio, utgående såsom hos föregående släkte; men den 7:de är tvågrenig. 6:te och 7:de nerverne utgå från samma ställe af diffäktet. (Hos *Pol. virgaurea* finnas stundom blott 9 nerber på framvingarne. 6:te och 7:de äro då förenade med hvarandra till en kort stam; men detta är lifväl icke alltid förhållandet.)

Hörande sfärilarter finnas på solbelysta ängar och betesmarker, såväl i skogstrakter som på slättbygder. Deras larver äro asellformiga, men temligen långsträckt och på sidorne något sammantruffa, samt bevärna med mycket korta, temligen tätta hår. De lefwa på låga växter och förvandlingen sker nära vid eller på jorden, och fjällan på växterns blad. Puporne äro i båda ändar trubbiga.

1. Allmänna Guldvingen (*Polyommatus chryseis* Fabr.)

Alis infra cinerascens punctis ocellaribus numerosis nigris; posticis fascia intramarginali fulva, antice ovanoscenti, nigro-punctata. L. al. exp. 32—37 millim.

Mas: alis supra fulvis, aureo nitentibus marginibus nigris coeruleo micantibus.

Femina: alis supra fulvescentibus plus minus infuscatiss punctis nigris; posticis fascia intramarginali fulva.

Wingarne undertill afsegrågtiga med talrika swarta ocell-lifa punkter; de bakre wid utfanten pryhda med ett rödgult, swartpunkteradt tverband, som framåt är försvinnande. L. e. wingsp. $1\frac{5}{16}$ — $1\frac{1}{2}$ t.

Saune: wingarne ofwan rödgula, guldglänsande med swarta, i blått flötande utfanter.

Soua: wingarne ofwan rödgulagtiga, mer eller mindre öfverdragna med brunt, försedda med swarta punkter; de bakre i utfanten pryhda med ett rödgult tverband.

Syn. **Pap. chryseis** W. V. p. 481. Fam. M. n. 3. Hüb. Pap. t. 68. f. 337. 338. t. 74. f. 355. Text. 53. 44. **Hesperia** Fabr. E. S. III. 4. 309. 474. **Lycæna** Ochs. Schm. I. 2. 79. IV. 27. Treitsch. X. 1. 74. Zett. Ins. Lapp. 940. 2. **Zephyrus** Dalm. P. Sv. 92. 7. **Polyommatus** God. et Dup. Lepid. I. 498. pl. 9 secund. f. 4. pl. 40 secund. f. 2. II—S. Text. I. 432. Gerh. Lycænen t. 7. f. 4. (**Pap. hippothoë** Lin. F. Sv. 1046. (mas.) Esp. Schm. I. t. 22. f. 3. p. 292. t. 78. cont. 28. f. 5. p. 433. t. 100. cont. 55. f. 2. p. 38. var. **Pap. euridice** Borkh. Schm. I. 443. 270. II. 220.)

Obs. *P. hippothoë* Auct. non in Suecia est reporta, quare synonymiam Linnei citatam ad hanc speciem pertinere credo. Descriptio, ab Illustr. Viro l. c. data, nullam difficultatem præbet. "Statura *P. virgaureæ*", ut in discriptione Linnei dicitur, cum *P. chrys.* etiam magis quam cum *P. hippoth.* congruit.

Bar. b. Punctis ocellaribus infra in lineas elongatas nigras vel in maculas diffformes confluentibus.

De ocell-lifa punkterna undertill sammanflutna till långtgående linier eller fläckar af olifa form.

Bar. c. Alis posticis angulo antico magis rotundato, supra infuscatis fascia intramarginali fulva nigro-punctata; anticis supra fulvis dilutioribus*). Forma minor.

Bakwingarne med mera afstundadt framhörn, ofwan öfverdragne med brunt och pryhda med ett rödgult, swart-

*) Alæ anticæ fulvæ, in flavedinem vertentes.

punkteradt tverband i utkanten; de främre ofwan ljusare rödgula. Mindre form.

Syn. *Polyommatus* var. *Stiberi* Gerh. l. c. pl. 35. f. 4. (ut videtur.)

Denna art förekommer mer eller mindre allmänt på vår half-ö. Wisfa år är den sällsynt. På ängar och i flögsmarker träffas den i Juli och Augusti månader. Den flyger trögt och blott korta sträckor, så att han lätt låter fånga sig. I Skåne och Östergötland är han stundom allmän. På Öland (Zett.), i Småland (Bhm.) och i de flesta öfriga provinser af Sverige finnes han, äfwen som i Norge. Var. b. förekommer tillsammans med wanliga formen men Var. c. tyckes tillhöra de egentliga bergstrakterne. Den är af Prof. Wahlberg funnen ganfka talrikt wid Runnas, 2 mil westligt från Quicksöf i Rappmarken, och en gång wid Marstrand. På intetdera stället träffades den wanliga formen. Måhända den framdeles wisar sig ega rätt att betraktas såsom egen art.

Artbeskr. Antennerne swarta med hwita ringar. Klubban i spetsen rödgul. Palperne hwita med swart spets och undertill bewuxna med grå hår, blandade med swarta. Ögonen omgifna hwarbera af en hwit ring. Hufvudet ludet, mellan ögonen af swart, mellan antennerne af gråagtig och på hjesjan af brun ludd. Nyggskölden luden af swartblått, men på skuldrorne och halskragen af gråblått. Abdomen ofwan swart med glefa hår, undertill whitagtig. Bröflet grått, ludet. Fötterne grå med mörka ledafdelningar på tarferne.

Samme. Vingarne ofwan rödgula, guldglänsande, wid basen, längs framkanterne och utkanterne samt i bakvingarnes indre hälft, (längs utmed abdomen) swarta och blåskimrande, isynnerhet på sednare stället och i framvingarnes främre kant. Wid diffältets tvernerf finnes på framwingarne en swart streck, hwar till stundom äfwen ipår finnes på bakwingarne. Stundom, ehuru sällan, saknas denna äfwen på framwingarne eller finnes blott otydligt antydd. I bakvingarnes swarta utkant finnas stundom ipår till några rödgula fläckar. Undertill äro wingarne mörkt afsegrå,

de främre i midten swagt rödgulagtiga. Dessa sednare hafwa wid utkanten en rad otydliga swarta punkter, och innanför denna en annan starkt höjd och tydligare, hvars punkter äro hwardera omgifne af en hvit ring. I distfältet stå trenne större punkter, parallelt med framkanten och lifaledes omgifna af hwiit. Rångs utkanten af bakwingarne går ett rödgult med twenne swarta, otydligare punkttrader prydt band, hwilket lifwål oftaft framåt är försvinnande, så att det är tydligast nära anslhörnet. Innanför detta går en rad tydligare swarta punkter, hwardera omgifne af en hvit ring; 2:ne af dessa stå nära framkanten, stilda från de öfriga; i disken och nära basen finnas flera spridda med samma färg. En och annan af dessa punkter saknas slundom. Framarne hwhita, undertill wid roten gråagtiga.

Hona. Wingarne oswan swartbruna med mer eller mindre rödgult i disken på framwingarne, hwilka dersemte hafwa wid distfältets slut ett swart streck och närmare utkanten en twerrad swarta punkter, samt slundom wid bakre hörnet en början till ett otydligt rödgult band. Bakwingarne, som äro swartbruna, hafwa i utkanten ett bredt, rödgult tverband, hwilket försvinner närmare framhörnet och är prydt med swarta eller mörkbruna, obestämda fläckar. Innanför detta band synas äfwen slundom några i rad ställda, blåagtiga punkter. På undre sidan, som för öfrigt liknar hannens, äro framwingarne i midten mera rödgula och tverbandet i bakwingarnes utkant tydligare.

Var. b. Liknar föregående, men har på bakwingarnes undre sida i stället för de swarta punkterna delika streck eller trefantiga, eller ock annorlunda formade, fläckar. Det händer äfwen att exemplar finnas, hos hwilka wingarne på ena sidan om kroppen hafwa punkter och på den andra streck eller fläckar.

Var. c. är mindre än den normala formen. Hannen har wingarnes öfre, guldglänsande sida blefare rödgul (slötande i blekgult), nästan sasom hos honan till följande art. Framwingarne hafwa smal swart utkant, smal och swart, blåskintrande framkant och ett kort swart streck i disken. Bakwingarne äro

längs indre kanten svarta med blå stämmer, i utkanten svarta och hafwa der ett tydligt afskildt rödgult, svartfläckigt tverband, samt i diffen ett svart streck. Undertill äro wingarne lika dem hos den normala formen. Honan har framwingarnes öfre sida rödgul, vid basen och längs främre kanten brunagtig, samt twenne tverrader svarta punkter och en svart fläck i diffen. Bakwingarne äro bruna med ett svart streck i diffen och ett rödgult band längs utkanten, hvilket är prydt med svarta punkter. Undertill likna wingarne hannens. Honan till denna variationen liknar, i anseende till wingarnes öfre sida, i hast honan till följande art.

Varven, som är grön och finhårig, med en mörk rygglinia och lufare, hvita sidostrimmor, lefwer på åtskilliga fyrearter (Rumex). Puppan är äggformig, hwitgul med svarta strimmor på wingslidorne och punkter af samma färg på hufvud och abdominalregion.

2. Räftunge-Guldvingen (*Polyommatus virgaureæ* Lin.)

Alis anticis infra fulvis punctis nigris; posticis infra fulvo-griseis punctis nigris maculi que albis. L. al. exp. 30—35 millim.

Mas: alis supra fulvo-aurois, immaculatis, margine nigro.

Femina: alis supra languidius fulvo-aurois, nigro punctatis; posticis infuscatis.

Framwingarne undertill rödgula med svarta punkter; bakwingarne undertill gulgrå med svarta punkter och fläckar. L. e. wingsp. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{7}{16}$ t.

Hanne. Wingarne öfwan rödgula, guldglänsande, ofläckade, med svarta utfanter.

Hona. Wingarne öfwan blefare rödgula, svartpunkterade; de bakre öfwerdragna med brunt.

Syn. Pap. *virgaureæ* Lin. F. Sv. 1079. Hüb. Pap. t. 70. f. 349—354. t. 179. f. 884—887 Text. 54. 36. Hesperia Fabr. E. S. III. 4. 309. 173. Lycæna Ochs Schm. I. 2. 85. IV. 87. Treitsch. X. 4. 74. Zett. Ins. Lapp.

940. 3. *Zephyrus Dalm.* Pap. Sv. 92. S. *Polyommatus*.
 God. et Dup. *Lepid.* l. 202 pl. 9 secund. l. 6. pl. 40
 secund. l. 4. II—S. Text. l. 434. *Gerh.* *Lycænen* l. 5.
 l. 3. *Polyomm.* var. *oramula* *Gerh.* l. c. l. 4.

Denna utmärkt vackra Guldringe finnes öfverallt i skogstrakterne af södra och medlersta Sverige och Norge, men huru högt den egentligen stiger mot norden är ännu oafgjordt. Den nordligaste provins i Sverige, der man wet att den förekommer är Dalarne. Prof. *Betterstedt* anför den såsom sällsynt i Lappmarkerne, men utan att närmare uppgifwa någon lokal. Artens flygtid infaller i Juli och Augusti månader.

Artbeskr. Antennerne och deras klubba såsom hos föregående art. Balperne hvita, i spetsen swarta och undertill bewuxna med swarta hår. Ögonen omgifna af en hwit ring. Hufvudet ludet af rödgula hår, men emellan ögonen och under antennerne swartludet. Ryggskölden och abdomen ofwan ludna af rödgula, guldgulänfande hår. Den sednare undertill whitagtig. Bröfvet whitulligt. Fötterne whitagtiga; tibierne framtill något flötande i gult; tarferne swartringlade.

Hanne. Wingarne ofwan glänfande guldfärgade, i utkanterne swarta. Undertill äro de främre rödgula, i framkanten, spetsen och längs utkanten flötande i grått; längs utkanten gå twenne rader swarta fläckar eller punkter, af hwilka den yttre är matt och otydlig, och i distfältet stå parallelt med framkanten trenne swarta fläckar. De bakre äro rödgulagtigt grå med spridda, swarta, gulskantade punkter i disten och närmare utkanten en ofsammanhängande rad dyliga, till hwilka gränsa hwita fläckar, som variera till form och antal. Längs utkanten, och isynnerhet nära analhörnet synas några matta och otydliga, rödgula fläckar, hwilka stundom i midten äro mörkskuggade. Fransarne äro ofwan gulagtiga och undertill flötande i brunt.

Honan, som undertill liknar hannen, är till wingarnes öfre sida, isynnerhet på framwingarne, blekt rödgul med matt glans och har smala, brunagtiga wingkanter. Nära utkanten af framwingarne gå twenne twerrader swarta fläckar eller större

punkter, af hvilka den yttre är obestämbar än den indre. I distfältet finnas desutom twenne swarta fläckar, af hvilka den större är belägen wid twernerben. Bakvingarne, som äfwen äro rödgula, men från basen till större eller mindre utsträckning och stundom öfver hela ytan fluggade med brunt, hafwa i diffen en swart fläck och utanför denna några twerrader swarta punkter, samt, då wingarne äro alldeles öfverdragna med brunt, ett rödgult tverband längs utkanten, i hvilket swarta punkter finnas.

Ann. De hwhita fläckarne, som finnas på bakwingarnes undre sida, äro flere eller färre till antalet, hwarigenom den obetydliga varieteten, som *Gerhard* under namn af *oranula* afbildat, uppkommer. Denna har endast närmast framkanten några hwhita fläckar och är icke egenomlig för nordligare delar af *Scandinavien*, utan träffas öfver allt bland den normala formen.

Carven till denna art är mörkgrön med en gul linia längs ryggen och en gulgrön längs hwarje kroppsida. Dess hufvud och bröstfötter äro swarta. Den lefwer på wanliga *Nästungen* (*Solidago virgaurea*) och på åtskilliga *Rumex*-arter. *Pupan* är gulbrun med mörkare wingsidor.

3. *Syre-Guldvingen* (*Polyommatus phleas* *Lin.*)

Alis anticis infra fulvis, nigro-maculatis, margino exterioro canescente; *posticis* infra canescentibus punctis minutissimis nigris. *L. al. exp.* 30—35 millim.

Mas. et Femina: *alis anticis* supra fulvis nigro-maculatis; *posticis* fuscis fascia marginali fulva, nigro-punctata.

Fränwingarne ofwan rödgula, swartfläckiga, med gråagtig utkant; de bakre undertill gråagtiga med ganska små, swarta punkter. *2. e. wingsp.* $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{7}{16}$ t.

Hanne och Hona: framwingarne ofwan rödgula med swarta fläckar; de bakre bruna med ett rödgult, swartpunkteradt band i utkanten.

Syn. Pap. phleas *Lin.* F. Sv. 4078. *Hüb.* Pap. t. 72. f. 363. Text. 54. 38. *Hesperia* *Fabr.* E. S. III. 1. 341. 178. *Lycæna* *Ochs.* Schm. I. 2. 87. IV. 27. et

148. Treitsch. X. 4: 76. Zett. Ins. Lapp. 911. 4. Zephyrus Dalm. Pap. Sv. 93. 9. Polyommatus God. et Dup. Lepid. I. 204. II—S Text. I. 134. Gerh. Lycænon. t. 5. f. 4.

Var. b. Alis posticis supra maculis coeruleis ante fasciam fulvæ marginalæ.

Bakvingarne ofwan med blå fläckar framom det rödgula tverbandet i utfanten.

Zephyrus *Phlæas* Dalm. var. b. l. c. *Lycæna Phlæas* Zett. var. b. l. c. Pap. *Phlæas* Hüb. l. c. f. 362.

Var. c. Alis anticis supra fuscis, disco tantum fulvo, nigro-maculato.

Framvingarne ofwan bruna, blott i dissen rödgula och svartfläckiga.

Pap. *eleus* Fabr. E. S. Suppl. 430. 180—181 ? Ochs. Schm. I. 2. 90 ?

Ghre-Gulbvingen är den allmänaste arten inom släktet och förekommer på ängar, fält och fogsmarker ända från Skåne till Norska Finnmarkerne (Zett.). Ghuru den träffas hela den warmare årstiden, är den dock allmänast om våren i Maj och början af Juni, samt sedan åter om hösten i Augusti, så att den har egentligen twenne generationer om året.

Artbessr. Antennerne såsom hos föregående art. Klubban svart med ljusbrun spets. Palperne ljusgrå med mörkbruna spetsar och undertill med hwitagtiga hår. Omkring ögonen en hwit ring. Hufvudet mörkt brunludet. Ryggskölden brunluden, på skuldrorne och halskragen gråagtig. Abdomen ofwan svart med mörkbruna, glefa hår, undertill hwitagtig. Bröflet hwitgrått, ludet. Fötterne hwitgrå med brunringlade tarser.

Samme och hona. Framvingarne ofwan rödgula, guldglänsande, med swarta fläckar, af hwilka twenne finnas i dissfältet och de öfriga bilda en oregelbunden, böjd twerrad närmare utfanten, hwilken är bredt gråbrun. Bakvingarne ofwan svartbruna, glänfande, med ett temligen bredt, rödgult tverband i utfanten, hwilket utåt är tandadt genom svartbruna fläckar,

som sammanhånga med den smalt brunfärgade utkanten. Framvingarne undertill i spetsen och längs utkanten grå; för öfrigt rödgula med samma swarta teckning som ofwan, likväl med undantag deraf att i diffjälet finnas trenne swarta fläckar, hvilka, liksom alla de öfriga, äro kantade med gult eller hwitt. Bakvingarne undertill grå, mer eller mindre, särdeles mot utkanten, flötande i brunt med talrika, mycket små, swarta punkter, som isynnerhet bakåt äro kantade med whitagtigt. Längs utkanten synes en otydlig antydning till öfre sidans rödgula tverband. Fransarne ofwan hwita, undertill grå.

Var. b. Skiljer sig från föregående endast derigenom, att innanför det rödgula bandet på bakvingarnes öfre sida finnes en rad temligen stora, blå fläckar. Mas. et Fem. Träffas tillsammans med den allmänna färgvarieteteten.

Var. c. Har framvingarne på öfre sidan bruna och endast i biffen rödgula; men det rödgula är här betydligt, blandadt med brunt och de swarta fläckarne större, endast tydliga i biffen. Fem. Blott en gång träffad wid Trolle-Ljungby i Skåne.

Varven skall vara ljusgrön med en gul eller högröd linia längs ryggen och lefwa på åtskilliga *Syre*-arter, isynnerhet på *Rumex acetosa*.

4. **Ormrots-Guldvingen** (*Polyommatus helle* W. V.)

Alis infra fulvis, *posticis* griseo-infuscatis, omnibus fascia *postica* fulvo-rufa, serie adjacente macularum *trigonalium* nigrarum, *intus* albido-marginatarum, punctisque albo-cinctis plurimis, in disco sparsis. L. al. exp. 25—30 millim.

Mas: *alis* supra fuscis, valde violaceo nitentibus, punctis nigris minutis sparsis, praesertim in anticis.

Femina: *alis* anticis supra fusco-fulvis nigro coeruleoquo maculatis, rarius violaceo inductis; *posticis* fuscis fascia marginali sulva, nigro punctata.

Bingarne undertill rödgula, de bakre flötande i brungrått, alla försedda nära utkanten med ett rödgult tverband och en derintill belägen rad af swarta, trefantiga, inåt med hwitt begränsade fläckar,

samt desutom i disken flera spridda, swarta med hvitt omgifna punkter. L. e. wingsp. 1—1 $\frac{1}{4}$ t.

Öanne. Vingarne ofwan bruna med starkt violett glans och små spridda, swarta punkter, isynnerhet på framvingarne.

Sona. Framvingarne ofwan brunagtigt rödgula med swarta och blå fläckar, sällan helt och hållet öfverdragna med blått; de bakre bruna med ett rödgult, svartfläckigt band i utfanten.

Syn. *P. helle* W. V. p. 181. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 1. 312. 181. *Papilio* Hübn. Pap. t. 67. f. 134—133. Text. p. 52. *Lycæna* Ochs. Schm. I. 2. 68. *Treitsch*. X. 1. 7. Zett. Ins. Lapp. 914. 5. *Zephyrus* Dalm. Pap. Sv. 93. 10. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. II. 484. pl. 23. f. 5. 6. II—S Text. I. p. 130. *Pap. amphidamas* Esp. Schm. I. t. 58. c. 8. f. 4. p. 46. et t. 63. c. 12. f. 5. *Pap. hille* Thbg. In. Sv. II. p. 40. *Polyommatus* Gerh. pl. 10. f. 4.

Denna wackra art är temligen allmän uti Skogsstrakterne på torrare ställen i Norr- och Westerbotten under Juni och Juli månader. Isynnerhet är den talrik längs hela kustlandet från Kindbeck, i gränsen emellan Wester- och Norrbotten, äfwen som wid Luleå elfwens stränder (Whm. Wahlb.). Uti egentliga Lappmarkerne är den deremot temligen sällsynt, men finnes likwäl der och hwar på passande lokaler, såsom wid Quicksjö och Degerfors (Zett.).

Artbeskr. Antennerne swarta med hvita ledafdelningar. Klubb-
ban swart, i yttersta spetsen rödgulagtig. Palperna hvita, i
spetsen swarta, undertill starkt gråludna. Ögonen svartbruna,
omgifna af en hvit ring. Hufswudet svartludet. Ryggskölden
gråbrunt luden. Abdomen ofwan swart, på sidorne dragande
i brunt, undertill whitagtig. Bröfvet lufvgrått, ludet. Fötterne
hvita med swartringlade tarfer.

Öanne. Vingarne ofwan svartbruna, i disken swagt rödgulagtiga, med violett glans, som isynnerhet är ganska stark på de främre; utfanterne och bakvingarnes framkant swarta. Vid diskfältets slut finnes en swart streck, som isynnerhet är grof och tydlig på framvingarne, hwarest äfwen synes en rad smärre swarta fläckar utanför, och twenne swarta innanför nämnde streck.

Bakwingarne hafwa i analhörnet ett par rödgula, med svart prydda och utåt genom ett hwitt streck begränsade fläckar. Undertill äro de främre rödgula och de bakre brunagtigt gulgrå, alla med ett gemensamt mörkare rödgult band i utkanten, hwilket utåt begränsas af en hwitagtig eller gråagtig linia, åtföljd af swarta streck, som ispinnerhet äro grofwa och tydliga på bakwingarne, och hwilket inåt begränsas af en rad trefantiga swarta fläckar, af hwilka hwardera hafwa en wittriangel, som med spetsen vänder inåt wingen och på bakwingarne går längre inåt diffen, än på framwingarne. Dessa sednare hafwa närmast nu beskrisna twerband en twerrad af swarta punkter, wid diffältets slut en och i sstjelwa diffältet twenne samt nära infanten en annan svart punkt eller fläck, alla omgifne hwardera af en witring. Bakwingarne hafwa spridda swarta punkter i diffen, men dessa äro mindre än på framwingarne och omgifne hwardera af en gulagtig ring. Fransarne äro brunagtigt grå, mot spetsarne hwitagtiga.

Sonau, som till wingarnes undre sida liknar hannen, är på framwingarnes öfre sida rödgul med mer eller mindre brunt wid wingarnes bas och öfwer deras yta. Sällan finnes swag violett glans. Framwingarne hafwa nära utkanten twenne twerrader af swarta punkter, som inåt åtföljas af blåagtiga; i diffältet finnes en svart punkt och wid twernerven en annan. Bakwingarne äro enfärgadt svartbruna med ett rödgult twerband längs utkanten, hwilket är utåt försedt med en rad swarta fläckar och begränsadt af en wit linia, samt inåt åtföljdt af en rad blå fläckar eller punkter. Undertill på bakwingarne äro merendels de swarta punkterne, närmast det rödgula twerbandet, mera bildande en twerrad, än fallet oftast är hos hannen.

Larven är luden, enfärgadt grön med mörk rygglinia, gult hufvud och analspets. Den lefwer om hösten och våren på *Rumex acetosa* och *Polygonum historta*. **Pupan** är gulbrun, på abdominalregionen hwitagtig, med swarta långstreck och grofwa punkter.

Släktet : *Lycæna*. (FABR.) OCHS. H—S.

(*Polyommatus* LATR. BOISD. *Ind. Meth.* Argus BOISD. *Icon.*
ZETT. *Zephyrus* DALM.)

Antennæ longiores, clavatæ; clava brevior, compressa l. excavata, sat determinata.

Palpi squamati, infra dense pilosi, apicibus subnutantibus, triarticulati. Articulus medius reliquis conjunctis longior; basalis minutus; ultimus basali longior, gracilis, latitudine fere conformis.

Oculi aut birti, aut nudi.

Pedes ut in genere præcedente, sed articulus tarsorum primus tibiis semper gracilior et articulis reliquis conjunctis brevior; tertius secundo, hic tamen quarto longior.

Alæ rotundatæ, integræ; posticæ in margine interiori haud excisæ.

Costæ alarum ut in genere præcedente; anticarum 40, sed 6 et 7 e locis diversis, illa sola ex angulo antico areolæ, hæc vero in medio inter 6 et 8 oriuntur; ramuli costæ septimæ proportionaliter longiores, quam in genere præcedente.

Antennæ temligen långa, försedda med flubba. Denna är temligen kort, sammantryckt eller urholkad och någorlunda bestånd.

Palperne fjälliga, undertill tätt ludna, med något lutande spetsar, treledade: medelsta leden längre än de öfriga tillsammans; basleden liten; första leden längre än basleden, smal, åt hela längden nästan lifformig.

Begonen antingen ludna eller nakna.

Fötterna såsom hos föregående släkte, men första tarsleden alltid smalare än tibierna och kortare än de öfriga leden tillsammans; den 3:de leden längre än den 2:dra och denna längre än den 4:de.

Wingarne rundade, helbräddade; de bakre i indre kanten föga utskurna.

Nerverne på vingarne såsom hos föregående släkte; framvingarnes nerver 10, men 6 och 7 utgå från olika ställen af distiktet, den förra ensam från dess främre hörn, den sednare deremot midt emellan den 6 och den 8; den 7:des grenar äro äfwen proportionswis längre, än hos föregående släkte.

Arter af detta släkte träffas öfverallt på ängar, betesmarker, åkrar och backar, sandfält icke ens undantagna. Fjellarne hafwa äfwen sina arter, hwaraf några uppfuga ända till snögränsen. Fjärilarnes flygt är låg, men temligen ihärdig; hos några ganska snabb. Deras larver lifna till formen föregående släkten, men de äro fortare än hos *Polyommatus* och fullrigare samt mindre afsmalnande än hos *Thecla* och *Zephyrus*. Husvudet och fötterna äro ganska små, knappast synliga. Kroppen merendels bevärad med fina, ganska korta hår. Puporne äro temligen långsträckt, säsade wid en vextflängel, vanligen nära jorden, stundom till hälften dolde i densamma.

Tabula subdivisionum hujus generis:

- I. Alæ posticæ infra punctis nigris fasciaque maculari marginali fulva.
 - A. Oculi nudi: *L. battus*. *L. argus*. *L. optilete*. *L. aquilo*.
L. agestis. *L. eumedon*. *L. Donzelii*.
 - B. Oculi hirti: *L. alexis*. *L. adonis*. *L. dorylas*. *L. icarius*.
- II. Alæ posticæ infra punctis nigris, absque fascia marginali fulva.
 - A. Oculi nudi: *L. arion*. *L.alcon*. *L. cyllarus*. *L. pheretes*. *L. alsus*.
 - B. Oculi hirti: *L. acis*. *L. argiolus*.

I. Bakvingarne undertill med svarta punkter och vid utkanten ett rödgult, af fläckar bestående tverband.

A. Ögonen nakna.

1. Fetörts-Blåvingen (*Lycæna battus* W. V.)

Alis infra albidis maculis quadratis et rotundatis, magnis,

sparsis et seriatis nigris; posticis fascia continua fulva. L. al. exp. 25—30 millim.

Mas.: Alis supra nigris l. nigro-luceis, disco coeruloo-micanto, circulis coeruleis in margine maculisque nigris in disco.

Femina: Alis supra nigris, ut in mare maculatis, disco vix coeruleo.

Wingarne undertill hvitagtiga med qvadratformiga eller rundade, flora, spridda och i rader ställda swarta fläckar; de bakre med ett sammanhängande rödgult band. L. e. wingsp. 1—1 $\frac{1}{4}$ t.

Hanne. Wingarne ofwan swarta, eller swartbruna med glänsande blå diffl, blå cirklar i utfanten och swarta fläckar i diffen.

Hona. Wingarne ofwan swartagtiga, fläckade såsom hos hannen; i diffen knapt blåagtiga.

Syn. *Pap. battus* W. V. p. 185. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 4. 300. 137. *Papilio* Hübn. Pap. t. 66. f. 328—330. Text. 51. 29. *Lycæna* Ochs. Schm. I. 2. 64. IV. 26. Gerh. pl. 22. f. 2. *Zephyrus*. Dalm. Pap. Sv. p. 400. 25. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. II. 195. pl. 25. f. 7. 8. *Hesp. sedi* Fabr. E. S. III. 4. 286. 98. *Pap. telephii* Esp. Schm. I. t. 44. c. 47. f. 2. t. 94. c. 49. f. 5.

Denna sällsynta art är inom Skandinavien hittills endast träffad omkring Stockholm, hwarest den först upptäcktes på Lidingön af Gæffner. Sedan har den blifwit både der och wid Marienberg återfunnen af Prof. (Wahlb.). Den uppehåller sig om våren på och omkring de klippor, der *Sedum telophium*, farvets egentliga näringsplanta, växer.

Artbeskr. Antennerne swartbruna med hvita ringar. Klubban svart, i spetsen blåagtig. Palperne blågrå, yttersta leden svart, undertill ludna med swartagtiga stickehår. Höggsölden brungrå, luden. Abdomen ofwan svart med gleja brunagtiga hår; undertill hvitagtig. Bröfket blågrått, ludet. Fötterna blågrå med brunringlade tarser.

Sanne. Vingarne ofwan swarta eller svartbruna med swarta, mer eller mindre tydliga fläckar, isynnerhet på de främre; längs utkanterna går en rad af ljusblå cirklar, som innesluta fläckar af den swarta utkanten. Dessa cirklar äro mindre tydliga på framvingarne, än på bakvingarne. Vingarne äro undertill hwitagtiga; de främre med en svart, aflång, fyråddig fläck wid diffältets slut, och twenne mindre innansför denna, den ena i diffältet, den andra närmare infanten. Utanför den nämnde diffältsken går en rad, till större delen bestående af fyråddiga, ej med hwitt begränsade fläckar, och längs utkanten twenne rader andra dylika, de yttre lifwäl rundade. Bakvingarne hafwa två till tre rundade swarta fläckar eller punkter wid basen, en aflång, fyråddig wid diffältets slut, en starkt båg böjd rad dylika iwert öfwer wingen och twenne rader andra, rundade, längs utkanten. Emellan de båda sistnämnda finnes ett sammanhängande rödgult tvekanb. Fransarne äro hwita med större svartbruna fläckar wid wingnervernes utlopp.

Honan följer sig i färgteckningen från hannen derigenom att wingarnes öfre sida är mera svart, hvarföre de swarta diffälskenne blifwa otydligare. Lifwen är undre sidan mera stötande i brunt.

Barven beskrifwes wara sfögrön, sludnen, med en mörk, violett rygglinia och swarta punkter wid lufthålen på kroppsdorne. **Pupan** är kort och trubbig, på abdominalregionen ljusbrun, på hufvud- och bröstregionen samt wingfläbörne ljusgrön med bleka, bruna punkter. Den öfwerwintrar.

2. Allmänna Blåvingen (*Lycæna argus* Lin.)

Alis infra cinereis l. canis punctis ocellaribus sparse et soriatis nigris fasciaque nigro maculata, in posticis argenteo-coeruleo ocellata, fulva, adjacente fascia continua alba; clava antennarum supra nigra, infra fulva. L. al. exp. 20—27 millim.

Mas. alis supra coeruleis margine lato nigro, fimbria alba.

Femina: alis supra fuscis, ad basin coeruleo-pulvoru-

lontibus, in disco plus minus coerulescentibus, fascia intramarginali maculari sulva, interdum deficiente; simbria plus minus infuscata.

Wingarne undertill asfegrå eller isgrå med spridda och i rader ordnade, svarta, ocell-lila punkter, samt ett rödgult, svartfläckigt, på bakwingarne med silfverglänsande blå ocellpunkter försedt band, intill hwilket finnes ett annat sammanhängande, af hwit färg; antennklubban ofwan svart, undertill rödgul. L. e. wingsp. $1\frac{13}{16}$ — $1\frac{1}{16}$ t.

Hanne. Wingarne ofwan mörkblå med bred svart utfant och hvita fransar.

Hona. Wingarne ofwan bruna, wid basen blåpudrade, i disten mer eller mindre blåagtiga med ett rödgult, stundom försvinnande fläckband i utfanten och mer eller mindre brunagtiga fransar.

Syn. Pap. *argus* Lin. F. Sv. 283. 4074. *Zephyrus* Dalm. Pap. Sv. 400. 26 Pap. *idas* Lin. F. S. 284. 4075. *Argus* Zett. Ins. Lapp. 943. 8. *Lycæna ægon* Ochs. Schm. l. 2. 57. Pap. *ægon* Hübn. Pap. l. 64. f. 313—315. *Lycæna ægon* Gerb. pl. 23. f. 2. *L. leodorus* Gerb. pl. 23 f. 3.

Denna art är allmän öfver hela Skandinavien från det sybliga Skåne till det nordliga Tromsö. Dock är den i åtskilliga mellanliggande provinser mera sällsynt, såsom i Östergötthland (Stenh.) Den föredrager betesmark med enebuskar och kung, samt ängsbackar framför fuktiga och sankt lokaler. Dess flygtid infaller i Juli och Augusti månader.

Artbeskr. Antennerne svarta med hvita ringar. Klubban ofwan svart, undertill till hela sin längd rödgulagtig; ofwan mot spetsen försedd med en hwit tverfläck. Palperne blåagtigt hvita, undertill ludna af hvita och svartagtiga hår; yttersta leden svart. De nakna ögonen svarta, med brun, något glänsande strimma längs främre kanten och omgifne af hwit ring. Hufvudet emellan ögonen svartludet med en långgäående blå strimma i midten; på hjesjan blåludet. Ryggskölden och abdomen ofwan blåludna; den sednare undertill hwitluden och hwitpudrad. Gan-

nens analborste brungrå, mot ryggen mörkare. Bröfvet lubet, blåhvit. Fötterna blåagtigt hvita med svarttriåglade tarjer.

Saune. Wingarne ofwan mörkblå med bred, svart utkant, hwilken med obestämd färggräns skiljer sig från den blå grundfärgen och på bakwingarne stundom åtföljes af en rad swarta punkter. Framwingarnes främre kant smalt hvit, undertill äro wingarne ljust iågrå, mot basen grönpudrade. Längs utkanterna går ett rödgult band, som inåt begränsas af en rad halfmånformiga, swarta fläckar och utåt har en rad mot dessa swarande punkter, hwilka på framwingarne äro swarta, men på bakwingarne merendels starkt blåagtigt silfverglänsande och utåt begränsade af en whitagtig halvcirkel. På de främre är det rödgula bandet otydligare och mattare, än på de bakre. På alla wingarne åtföljes det af ett hwitt band, som stundom, då grundfärgen flöter i hwitt, är otydligt, isynnerhet på de främre. Närmast detta går öfwer wingarne en rad swarta punkter, hwardera omgifne af en whit ring. Vid diffältets slut finnes äfwen en svart med hwitt omgifwen fläck och innant för denna på bakwingarne 2—3 på samma sätt tecknade punkter. Fransarne äro hvita och åtföljas undertill af en fin, svart linia.

Honan har wingarnes undra sida asfegrå, flötande i brunt, så att det hvita bandet blifwer tydligare än hos hannen, hwilken den eljest här liknar. Till wingarnes öfre sida varierar hon nästan i oändlighet. Wingarne äro der bruna, wid basen blåpudrade; för öfrigt antingen enfärgade, eller också i dissen mer eller mindre blåagtiga, stundom i utkanten pryddas med en rad rödgula fläckar antingen på båda wingparen eller blott på de bakre. Fransarne äro mer eller mindre brunagtigt grå, merendels endast hvita i framwingarnes spetsar.

Varven lefwer på *Melilotus*, *Sarothamnus*, *Trifolium*, *Thymus* och flera andra wexter.

Anm. Skuru det icke ännu lyckats mig erhålla exemplar från utlandet af Författarnes *Lycæna ægon*, anser jag dock denna för identisk med Linnés *L. argus*, emedan alla de afbildningar, som varit mig till-

gångliga, öfverensstämma mera med vår allmänna Blåvinge, än med Författarnes *L. argus*, hwilken befunnen icke mig weterligen ännu är funnen inom Standinavien. Omöjligt är det lifwäl icke, att den någonslades inom vår, på omverlande lokaler rifa half-ö kan träffas. Därföre gifwer jag här dess diagnos, och tillägger den tillä widare det namn *Boisduval* bildadt:

Lycæna calliopis **Boisd. *)**

Alis infra canescenti-cinereis punctis ocellaribus sparsis et seriatis nigris, fasciaque nigro-maculata, in posticis argenteo-coeruleo ocellata, fulva, maculis sagittatis, plus minus confluentibus, albidis adjectis; clava antennarum nigra apice fulvo.

Mas. *Alis* supra coeruleis, margine angusto nigro.

Femina. *Alis* supra fuscis, disco coerulescente, fasciaque intramarginali fulva maculari.

Wingarne undertill ljufv afsegrå med spridda och i rader ordnade swarta, ocell-lila punkter samt ett rödgult, svartfläckigt, på bakwingarne med silfverglänsande, blå ocellpunkter försedt tverrband, intill hwilket finnas pilformiga, mer eller mindre sammanflytande fläckar; antennklubban svart med rödgul spets.

Drone. Wingarne ofwan mörkblå med smal, svart utfant.

Dona. Wingarne ofwan bruna med blåagtig diff och ett rödgult fläckband i utfanten.

Syn. ARGUS *calliopis* BOISD. Icon. p. 52. PAP. *argus* HÜBN. Pap. t. 64. f. 3:6—348. Text 50. 23. LYCÆNA *argus* OCHS. Schm. I. 2. 52. IV. 26. G. 446. TREITSCH X. 4. 71. II. S. t. 52. f. 247 GERH. t. 24. f. 4. POLYOMMATUS. GOD. et DUP. Lepid. I. 245. pl. 44. f. 4. pl. 44. tert. f. 4.

Denna art finnes på åtskilliga ställen i Lyssland och Granfrife, isynnerhet uti de sydligare länderne. Inom Danmark skall den ej förefinna.

3. Violettfärgade Blåvingen (*Lycæna optiloto* Esp.)

Alis infra cinereis punctis ocellaribus nigris sparsis et seriatis, lunulisque ocellatis duabus fulvis ad angulum ani posticarum. L. al. exp. 30—35 millim.

*) Specimina suecana hujus speciei non vidi, quare etiam nomen a *Boisduval* impositum attribui. *Zephyrus argus* Dalm, in Suecia vulgarissimus, est *L. ægoni* maxime affinis, ut e figuris citatis apparet. Specimina exotica non vidi

Mas. Alis supra obscure violaceis margine nigricante tenuiore.

Femina. Alis supra fuscis disco plus minus coerulescente.

Wingarne undertill afsegrå med ocell-lifa, swarta, spridda och i rader ordnade punkter, samt twenne ocell-lifa rödgula fläckar i bakwingarnes analhörn. L. e. wingsp. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{7}{16}$ t.

Samme. Wingarne ofwan mörkt violettblå med smal, svart utfant.

Söna. Wingarne ofwan bruna, i disten mer eller mindre blåagtiga.

Syn. *Pap. optilete* Esp. Schm. I. t. 79. f. 45. p. 436. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 4. 297. 434. *Papilio* Hübn. Pap. t. 63. f. 340—342. Text. 30. 25. *Lycæna* Och. Schm. I. 2. 54. IV. 26 & 446. *Zephyrus* Dalm. Pap. Sv. 100. 24. *Argus* Zett. Ins. Lapp. 913. 7. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. II. p. 498. pl. 26. f. 3—4. *Gerh.* t. 46. f. 4.

Äfwen denna Blåvinge träffas öfwer allt på Skandinavien uti sanke fogsängar och på torra buskmarker, äfwenjöm uti jurusfogar. Lifwål är den icke så allmän som föregående. I Skåne är den till och med temligen sällsynt. Den går lika högt mot norden som föregående art. Flygtiden infaller i södra Sverige uti Juni och Juli, i norra och i Norge deremot uti Juli och Augusti månader.

Artbeskr. Antennerne swarta med hwita ringar. Klubban svart, med en hwit fläck ofwan mot spetsen. Palperne grå med svart spets, undertill svartludna. Ögonen swarta, omgifna af en hwit ring. Hufvudet emellan ögonen svartludet med en långsgående, blå strimma; hjesan blåluden. Ryggskölden med mörktblå ludd. Abdomen ofwan svart med mörktblå flun, på sidorne blågrå, undertill hwit. Bröfket blåagtigt hwitt, ludet. Fötterne hwita med bruna, ofwan hwitfläckade tarsjer.

Samme. Wingarne ofwan mörkt violettfärgade med indigogläns; i utkanterne smalt swarta. Wingarne undertill afsegrå med en aflång svartagtig, med hwitt omgifwen fläck wid dist-

fältetö flut; utansför denna en rad swarta med hwitt omgifna punkter och derefter i utkanten tvenne rader, lifalebes med hwitt omgifna, fläckar, af hvilka den indre på framvingarne är tydligare än den yttre, men på bakvingarne båda lifa tydliga. På siftnämnda wingar äro de indre af dessa fläckar trekantiga och de yttre, dem motsvarande, rundade. Närmast analhörnet är rummet emellan dessa fläckar fyllt med rödgult och de yttre swarta punkterne blåprade, så att tvenne (stundom endera otydlig) oceller derigenom bildas. Fransarne löper en smal swart linia. Fransarne äro i spetsarne hwita, men wid roten brunagtiga.

Honan, som till wingarnes undre sida lifnar hannen, är ofwan swartbrun, endast blåagtig antingen äfven i difken, eller ock blott wid basen. Desutom har honan ofwan stundom en orangefärgad fläck wid bakwingarnes analhörn.

4. Högnordiska Blåvingen (*Lycæna aquilo* Boisd.)

Alis infra cinereis basi coerulescente, anticis macula discoidali nigra, albo marginata, serie punctorum ocellatorum, alteraque macularum nigrorum albo-marginatorum intramarginali; posticis maculis difformibus albis, plus minus confluentibus, fasciaque intramarginali fulvescente obsoleta. L. al. exp. 27 millim.

Femina. Alis supra cinereo-subcoerulescentibus macula discoidali nigra, albomarginata; anticis serie duplici punctorum albidorum.

Wingarne undertill askegrå, wid basen blåagtiga; de främre med en swart, hwitkantad fläck i difken, en rad swarta, ocell-lif punkter och en annan af swarta, hwitkantade fläckar i utkanten; de bakre med olifflora, mer eller mindre sammanflytande, hwita fläckar och i utkanten ett otydligt, rödgulagtigt band. V. e. wingsp. nära $1\frac{1}{8}$ t.

Hona. Wingarne ofwan blåagtigt askegrå med en swart, hwitkantad fläck i difken; de främre desutom med en dubbel rad af hwitagtiga punkter.

Syn. *Argus aquilo* Boisd. Icon. p. 62. pl. 12. f. 7. 8.
Polyommatus God. et Dup. Lepid. Suppl. 1. p. 295. pl.
 47. f. 6. 7. II—S. tab. 71. f. 343. 344. Gerh. pl. 49.
 f. 1. (figura mala). *Polyomm. Franklini* Ross Appendix.
 pag. 69 pl. 4. a. f. 8. 9.

Denna vår Faunas sällsyntaste dagfjäril fann vår utmärkte Entomolog, Prof. Boheman, på högsta spetsen af Walliberget nära Quicksjöck i Luleå Lappmark den 20 Juli. Den flög der bland den ännu quarliggande snön. Den finnes äfven på Altai och i Labrador.

Artbestr. Antennerne mörkbruna med hvita ringar. Klubban mörkbrun med en hvitagtig fläck oöfvan nära spetsen. Palperne långa, blåagtigt hvita, undertill starkt håriga. Ögonen ludna (?). Ryggskölden och abdomen oöfvan blåagtigt ludne. Bröfvet blågrått, lydet. Fötterne — — —

Hona. Vingarne oöfvan blåagtigt grå med en svart, månformig, hvitbegränsad fläck vid diskfältets slut och utanför denna på framvingarne twenne rader af hvitagtiga fläckar, af hvilka den yttre, som går nära utkanten, är otydlig, nästan omärklig. I utkanten af bakvingarne finnes en rad swarta, med hvitt omgifna punkter. Vingarne undertill askegrå, vid basen blåagtiga; de främre ljusare, vid diskfältets slut försedda med en svart fläck, lik öfre sidans, och utanför denna en rad af 5—6 swarta, med hvitt omgifna punkter, af hvilka de twenne, infanten närmaste, stå mera utåt än de öfrige. Längs utkanten af samma vingar går en annan rad af mera trekantiga, på samma sätt färgade fläckar. Bakvingarne äro mörkare med en hvit nsurformig fläck i disken, hvilken förenar sig med twenne sammanflytande, spikantiga hvita fläckar, kommande från midten af framkanten. Innanför midtelfläcken finnas 2—3 hvita mindre punkter, och utanför samma fläck längs utkanten flera, stora och sammanflytande fläckar, så att wingen är der till betydlig bredd hvit. Vid analhörnet och i utkanten finnas några rödgulagtiga, trekantiga, inåt och utåt svart begränsade, otydliga fläckar. Granjorne äro hvita, oöfvan och undertill åtsjölda af en fin, svart linia.

Sannan, som jag ej sett, skall lifna honan, men hafva de hvitagtiga fläckarne ofvan mindre tydliga och vara mera blå *).

5. Rödfläckiga Blåvingen (*Lycæna agestis* W. V.)

Alis infra canescentibus fascia maculari intramarginali nigro-maculata fulva, serieque adjacento punctorum ocellatorum nigrorum in posticis antico interrupta; posticis macula media

*) *Desc.* Antennæ fusæ annulis albis. Clava fusca, supra macula apicali albida. Palpi sat longi, coerules-albidi, infra dense pilosi. Oculi hirti (?). Thorax et abdomen supra coerulescente hirti. Pectus coeruleo-cinereum, hirtum. Pedes — — —

Femina. Alæ supra cinereo-subcoerulescentes macula lunata, albo-marginata, nigra in disco, serieque in anticis duplici macularum albidarum, altera in medio inter cellulam et marginem, altera obsoleta in margine ipso. Alæ posteriores serie intramarginali punctorum nigrorum, albo-marginatorum. Alæ infra cineræ, ad basin coerulescentes; anteriores macula discoidali ut in parte superiori, serieque punctorum 5—6, nigrorum, albo-marginatorum; inter hæc 2, margini interiori proxima, sunt foras locata. Series altera macularum trigonarum nigrarum, ejusmodi albo-cinctarum, ad marginem exteriorem adest. Alæ posteriores sunt in parte inferiori obscuriores macula reniformi discoidali alba, cum 2 quadrangularibus et inter se confluentibus, e medio marginis anterioris egredientibus, conjuncta. Intra maculam hanc discoidalem 2—3 puncta alba adsunt, et extra maculam eandem maculæ majores et confluentes, plurimæ, in margine exteriori sunt collocatæ, ut margo lata sit albus. Ad angulum ani et ad marginem exteriorem maculæ nonnullæ fulvæ, triangulares, nigroterminatæ, sed obsoletiores, reperiuntur. Fimbriæ albæ, supra et infra ad basin lineæ nigra tenuissima terminatæ.

Mas, quem non vidi, feminae similis describitur, sed maculas albas in colore magis coerulescente paginæ superioris alarum anticarum minus distinctas gerere dicitur.

Speciem hanc lepidopterorum nostratum rarissimam Celeberrimus noster Entomologus Prof. *Boheman* die 20 Julii in cacumine Walli montis prope Quickjock Lapponiæ Lulensis legit. Specimen, a nobis visum et descriptum, sat læsum fuit, ut oculos et pedes describere non potuerimus.

marginali alba, cum macula discoidali, cordiformi, non cohærente, et punctis ocellaribus, basi tamen anticarum impunctata. L. al. exp. 30—35 millim.

Mas. Alis supra fuscis maculis interdum fulvis marginalibus obsoletis, lineolaque nigra discoidali in anticis.

Femina. Alis supra obscure fuscis maculis fulvis marginalibus, lineolaque nigra discoidali obsoleta in anticis.

Wingarne undertill isgråagtiga med ett svartfläckigt, rödgult fläckband i utfanten, och en derintill gränssande rad af swarta, ocellulika punkter, hwilken på bakwingarne är framtill afbruten; de bakre i midten af utfanten med en hwit fläck, som ej sammanhänger med den hwita, hjertformiga difffläcken, samt försedda med ocellformiga punkter; framwingarnes bas utan punkter. L. e. wingsp. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{7}{16}$ t.

Sanne. Wingarne ofwan bruna, stundom med rödgula otypliga fläckar i utfanten, samt med en kort, svart linia i de främres diff.

Sona. Wingarne ofwan mörkbruna med rödgula fläckar i utfanten, och en otyplig, kort, svart linia i de främres diff.

Syn. Pap. *agestis* W. V. p. 184. Mübn. Pap. t. 62. f. 303—306. Text. 49. 20. *Lycæna Ochs.* Schm. l. 1. 44. IV. 26. *Treitsch.* X. 4. 70. *Zephyrus Dalm.* Pap. Sv. p. 99. 23. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. l. 213. pl. 10. f. 4. pl. 11. tert. f. 3. (fig. incorrecta) *Pap. medon* Esp. Schm. l. t. 32. suppl. 8. f. 1. p. 330. *Lycæna agestis* Gerh. pl. 26. f. 1.

Var. b. Alis supra fuscis, immaculatis.

Wingarne ofwan bruna, ofläckade.

Skärilen förekommer ganska sparsamt på sanfa ängar der och hvar i södra och medelsta Sverige och Norge. I Skåne har jag träffat den wid Trolle Esjunge och W. Wramb, i Blekinge wid Sölvesborg. I Småland är den funnen af Prof. Boheman; i Östergötland wid Gusum af Prof. Wahlberg och wid Stockholm af denjamme. Det nordligaste ställe inom Sverige, der wi weta den wara funnen är Norberg, hwarest den förekommer någon gång uti den såfallade Munktäkten (Friedrichs.). Inom Norge är den an-

märkt wid Christiania och i Österdalen (Siebke), samt på Dore (Whm). Dess flygtid infaller i Juli månad. Varieteten är sällsynt.

Artbeskr. Antennerne swarta med hwhita ringar. Klusban swart, i nedre hälften hwhit, med en dylik fläck nära spetsen. Palperne hwhita, ofwan och i spetsen swarta, undertill ludna med swarta stickelhår. Ögonen swarta med en smal, brun, något glänsande strimma framtill, och omgifna med en hwhit ring. Hufvudet mellan ögonen swartludet med en längsgående blå strimma; på hjesjan blåluet. Ryggskölden brunluden. Abdomen ofwan swart med glefa, ljustbruna hår; undertill hwhitagtig. Bröflet grått. Fötterna hwhita med undertill bruna, ofwan brunfläckiga tarfer.

Samme. Wingarne ofwan bruna, något glänsande; de främre, i själfwa framkanten hwhita, med ett swart streck wid distfältets slut. Vängs utkanten, isynnerhet på de bakre, stå en rad af trefantiga eller halfmånformiga, rödgula fläckar. Undertill äro wingarne isgråagtiga med ett band af rödgula fläckar, som på båda wingparen äro lika tydliga och inåt begränsade af swarta och hwhita halfmånar samt utåt åtsjölda af en rad swarta punkter på hwhit botten. Närmast innanför detta band går en tverrad swarta, med hwhitt omgifna punkter, af hwilka på framwingarne de fem första (stundom också de enda, som der finnas) bilda en starkt böjd båge med den konvera sidan utåtvänd, och de twenne (stundom blott en, stundom inga) till infanten närmaste stå något närmare utkanten, så att raden är afbruten. På bakwingarne är denna rad äfwen afbruten, så att twenne punkter stå nära hwarandra och framkanten, längre skilda från de öfriga och snedt emot dessa, på så sätt, att de ej bilda en rät linia med den tredje utan med den fjerde eller femte, då dessa äro synliga. I disten af framwingarne finnes en swart, med hwhitt omgifwen fläck eller streck, och innanför denna finnas inga swarta punkter. I disten af bakwingarne finnes en hwhit, mer eller mindre hjertformig fläck, som i midten har en swart, ofta otydlig streck. Innanför denna finnes wid basen 2—4 swarta punkter, liknande de öfriga. Från midten af det rödgula

bandet i utfanten går en hvit fläck långt framom tverradens 4:de och 5:te punkter, af hvilka stundom endera, stundom båda försvinna. Lifväl sammanhänger icke denna fläck med diff-fläcken, ehuru den går in emot och stundom nära intill densamma. Granarne äro hwhita och närmast dem löper under till en smal, svartagtig linia.

Sonau lifnar hannen, men har grundfärgen ofwan mörkare, och således framvingarnes swarta diffstreck mindre tydligt.

Var. b. lifnar i allt förut beskifna, med undantag deraf, att de rödgula fläckarne ofwan i wingarnes utfanter helt och hållet saknas. Mas. Fem.

6. Brunagtiga Blåvingen (*Lycena eumodon* Esp.)

Alis infra cinereis, basi virescentibus, fascia maculari intra-marginali, nigro-maculata, fulva, praesortim in posticis distincta, serieque adjacente punctorum ocellatorum nigrorum continua; posticis macula media marginali alba, cum macula discoidali striga ejusdem coloris coherente, et punctis ocellaribus; basi anticarum impunctata. L. al. exp. 28—32 millim.

Mas. et Femina. Alis supra nigro-fuscis lineola discoidali nigra.

Wingarne undertill afsegrå, wid basen grönagtiga, med ett svartfläckigt, rödgult fläckband i utfanten, hwilket isynnerhet är tydligt på bakvingarne, samt derintill en sammanhängande rad af swarta, ocelliska punkter; de bakre i midten af utfanten med en hwit fläck, som medelst en strimma af samma färg sammanhänger med diff-fläcken, samt förjedda med ocelliska punkter; framvingarne wid basen utan punkter. L. e. wingsp. $4\frac{1}{8}$ — $1\frac{5}{16}$ t.

Spanne och hona. Wingarne ofwan svartbruna med en svart streck i diffen.

Syn. Pap. *eumodon* Esp. Schm. I. t. 52. cont. 2. f. 2. 3. p. 46. Hübn. Pap. t. 62. f. 301. 302. t. 438. f. 704. 702. Text. 49. 2¹. *Lycena* Ochs. Schm. I. 2. 48. IV. 26. & 446. *Zephyrus* Dalm. Pap. Sv. 99. 23. *Polymmat* God. et Dup. Lepid. II. 492. pl. 25. f. 4. 2.

Gerh. pl. 25. f. 2. Pap. *chiron* Borkh. Schm. I. 465.
& 280. 46.

Var. h. Alis supra maculis intramarginalibus fulvis.

Wingarne ofwan med rödgula fläckar i utfanterne.

Denna fjäril är ej eller bland de allmännare. Dock tyckes han förekomma oftare än föregående art, hwilken han ganska mycket liknar. I Skåne träffas den der och hvar på ängsmark, isynnerhet i närheten af odlade ställen. I Östergöthland är den allmän omkring Håradsåmmar (Stenb.), samt wid Gusum (Wahlb.); äfwen så wid Stockholm (Wm.). Wid Norberg förekommer den på samma ställe som föregående art. Inom Norge är den anmärkt wid Christiania (Siebke). Dess flygtid infaller i Juni och Juli månader. Varieteten är sällsynt.

Artbetr. Lifnar mycket föregående. Ryggskölden luden af bruna och blåagtiga hår. Bröfvet blågrått.

Hanne och hona. Wingarne ofwan svartbruna, wid basen obetydligt blåagtiga; de främre med en svart streck i disken. Undertill äro wingarne mörkt askegrå, flötande i brunt, wid basen grönagtiga, isynnerhet de bakre. Deöfwa hafwa längs utfanten ett band af rödgula, inåt skarpt tillspetsade och der med ett svart och ett hvitt, vinkelböjdt streck begränsade, trefantiga fläckar, som utåt åtsjöllas af en rad runda eller aflånga punkter, utanför hwilka grundfärgen är hvit. Framwingarne hafwa detta band endast någorlunda tydligt hos honan. Hos hannen synes knapt mera deraf än den swarta teckningen. Stundom är också denna otydlig. Innanför näm'n'e band löper på alla wingarne en twerrad af swarta, med hvitt omgifna punkter. På framwingarne är denna rad något böjd derigenom att första punkten (från framkanten) står längre inåt än den andra. Stundom saknas den, då raden är alldeles rät och består endast af 4 punkter. På bakwingarne är ifrågakvarande punktrad af samma beskaffenhet som hos *L. alexis*, så att 2:ne punkter stå wid framkanten lika långt från hwarandra som från de öfriga och bilda en rät linia med den 3:dje samt nästan en rät

winkel mot de öfrige, hvilka åter i en rät linia med hwarandra löpa till infanten, och ej slingrande såsom hos *L. agestis* och *alexis*. 7:de och 8:de af dessa punkter saknas stundom. I diffen af hwardera wingen finnes en svart streck, omgifwen af hwitt, hvilken är störst på framwingarne. Dessa hafwa innansför nämnde streck inga punkter, men de bakre hafwa wid framkanten endast en, lifnande de öfriga; dock är den stundom otydlig och saknas äfwen hos ett eller annat exemplar. Från det rödgula fläckbandet i bakwingarnes yttre kant går en hwit fläck långt framom 3:dje och 4:de punkterne af tverraden och sammanhänger med distfläckens hwita färg medelst en smal, hwit strimma. Transarne äro hwita, och närmast dem löper på wingarnes undre sida en smal, brun linia.

Var. b. lifnar alldeles föregående, men har på öfre sidan wid bakwingarnes utkant rödgula, halfmånformiga fläckar, hvilka stundom blott äro antydda wid analkörnet, men deremot stundom äro tydliga längs hela utkanten.

7. Donzels-Blåvin (Lycæna Donzelii Boisd.)

Alis infra cinereis, basi virescentibus, serie continua punctorum ocellatorum nigrorum, macula discoidali nigra albo-marginata, fasciaque marginali maculata fulva valde obsolota; posticis vitta media longitudinali alba; basi anticarum impunctata. L. al. exp. 2½—30 millim.

Mas. *Alis* supra virescenti-coeruleis, margine lato lunulæque media anticarum nigro-fuscis.

Femina. *Alis* supra fuscis, ad basin vix coerulescentibus.

Wingarne undertill afsegrö, wid basen grönagtiga, med en sammanhängande rad af ocell-lif, swarta punkter, en svart, hwitbegränsad fläck i diffen och ett mycket otydligt, rödgult fläckband i utkanten; de bakre med en längsgående, hwit strimma i midten; framwingarnes bas utan punkter. L. e. wingsp. 1—1¼ t.

Sanne. Wingarne ofwan grönagtigt blå med bred svart-brun utkant och en fläck af samma färg i midten af framvingarne.

Sona. Wingarne ofwan bruna, wid basen knapt blåagtiga.

Syn. *Argus Donzelii* Boisd. Icon. 64. pl. 45. f. 1—3.
Zett. Ins. Lapp. 944. 9. Hüb. Pap. t. 193. f. 955—957.
Lycæna Treitsch. Schm. X. 4. 64. H—S. t. 73. f. 354.
352. Gerh. pl. 49. f. 2. *Polyommatus.* God. et Dup.
Lepid. Suppl. 1. 48. pl. 8. f. 1—3.

Förtjensten af att hafwa wist, det denna sällsynta Blåvinge äfwen är en Skandinavisk art, tillhör Prof. *Boheman*, som under sin resa till Norge 1836 upptäckte densamma i Dalarne emellan Transtrand och Malung. Sedan har den äfwen blifwit träffad af Målaremästaren *Fredrichsön* wid Klacken och i Munkfåkten nära Norbergs by i Westmanland. Den wistas i dälber nära intill lösskog och sjögar i Juli. Utom Skandinavien är den funnen i Frankrike.

Artbetr. Antennerne swarta, hwitringlade. Klubban swart, nedtill rödgulagtig, med hwit spets ofwan. Palperne hwhita med swart spets, undertill med swarta och brunagtiga hår. Gufvudet och hjesjan, samt ögonen såsom hos samsläktningarne. Ryggskölden luden af blå hår. Abdomen ofwan swart, glest blåluden; undertill hwit. Bröfket hwitt, ludet. Fötterne hwhita, med brunfläckiga tarfer.

Sanne. Wingarne ofwan grönagtigt blå med breda svart-bruna utkanter, hwilkas färg inåt ej skarpt begränsas, utan förlöper i grundfärgen. Framkanten på framwingarne smalare, på bakwingarne bredare svartagtigt brun; på de förra i yttersta kanten hwit. Wingnerverne swarta. Wid diffältets slut finnes på framwingarne en swart fläck. Undertill äro wingarne aftegrå med otydliga, rödgula, trefantiga fläckar längs utkanten, hwilka likväl äro synligast på bakwingarne. Närmast dessa går tiwert öfwer hwardera wingen en sammanhängande rad af swarta, med hwitt omgifna punkter, hwilka på framwingarne äro något båg böjda; på bakwingarne bilda de 3:ne första en rät linia och

winkel mot de öfriga, som närmare anallhörnet göra en liten fröfning inåt och utåt. Vid diffältets slut finnes på hwar-dera tvingen en kort svart streck, likaledes omgifven af hvitt. Innanför denna finnes på framvingarne ingen punkt, men på bakvingarne stundom en otydlig nära framkanten. Nära basen börjar på bakvingarne en hvit strimma, som går längdester desas midt, genom diffältet till utkantens rödgula fläckar. Granarne äro hvita och begränsas undertill af en brun, sin linia, hwilken jemte sig har en annan, af korta streck bestående, otydlig och hvit.

Sonan lifnar hannen på wingarnes undre sida, men har de rödgula fläckarne något tydligare, och är ofwan brun med blåagtig anstrykning wid wingbasen, samt har stundom i utkanten af bakvingarne, järdels i desas anallhorn, otydlig antydning till rödgula fläckar.

B. *Ögonen ludna.*

S. **Puktörne-Blåvingen** (*Lycæna alexis* W. V.)

Alis infra aut cinerascens aut griseo-centibus fascia marginali maculari nigro punctata et lineis nigris, acute angulatis intus terminata, fulva, macula posticarum ante hujus medium alba, ad seriem continuam punctorum ocellatorum adscendente, maculaque discoidali nigra, albomarginata et punctis basalibus ocellatis; anticis punctis nigris, etiam ocellatis; fimbria omnium alba. L. al. exp. 28—32 millim.

Mas. Alis supra subviolaceo-coeruleis linea tenuissima marginali nigra.

Femina. Alis supra fuscis, disco plus minus coeruleo, sæpe ocellis intramarginalibus luteis, punctis nigris instructis.

Wingarne undertill antingen aftegråagtiga eller flötande i mörkgrått med ett svartpunkteradt, inåt af skarpt vinklade, svarta linier begränsadt, rödgult fläckband i utkanten; de bakre med en hvit fläck nära detta band, hwilken går intill en sammanhängande rad af ocell-

lila punkter, och derest i diffen en svart, med hvitt begränsad fläck, innanför hvilken finnas några ocell-lila punkter (merendels på båda vingparen); de främre äjwen försedda med swarta, ocell-lila punkter; fransarne hvita. L. e. wingsp. $1\frac{1}{8}$ — $1\frac{5}{16}$ t.

Hanne. Wingarne ofwan blå, flötande i violett, med en ganfka fin, svart linia uti utkanterne.

Hona. Wingarne ofwan bruna, i diffen mer eller mindre blå, ofta försedde med gula, svartpunkterade oceller i utkanten.

Syn. **Pap. alexis** W. V. 184. Hübn. Pap. t. 60. f. 292—294. Text. 48. 49. **Lycæna** Ochs. Schm. I. 2. 38. IV. 25. & 187. Treitsch. N. 4. 69. II—S. t. 52. f. 246. t. 74. f. 362. Gerh. pl. 27. f. 4. **Zephyrus** Dalm. P. Sv. 98. 24. **Argus** Zett. Ins. Lapp. 913. 6. **Polyommatus** God. et Dup. Lepid. I. 242. pl. 41 secund. f. 3. **Pap. adonis** Thbg. Diss. II. 39. **Hesperia** Fabr. E. S. III. 4. 299. 434. (var.) **Pap. thetis** Esp. Schm. I. t. 32. Suppl. 8. f. 2. **Pap. icarius** Esp. Schm. I. t. 50. Suppl. 26. f. 2. 3. p. 387. **Pap. polyphemus** Esp. I. c. I. 55. c. 5. f. 5. p. 34.

Denna Blåvinge är allmän i hela Skandinavien på alla högsländta ängar och betesmarker, samt på åkrar. Mot norden aftager den dock i mängd, men finnes likväl ända till Tromsö. Dess flygtid infaller i Maj och Juni och sedan åter i Juli och Augusti månader, då han är talrikast.

Artbeskr. Antennerne swarta med hvita ringar. Klubban svart, undertill whitagtig, och i spetsen ofwan whit. Palperne hvita, i spetsen swarta, undertill med swarta stickehår. Ögonen swarta, omgifna af en whit ring. Panna och hjesja ljusblått ludna, den förra med gleša swarta hår wid sidorne af ögonen. Ryggskölden och abdomen ofwan blåsludne. Den sednare undertill whitagtig. Bröfket blågrått ludet. Fötterne hvita, med undertill bruna, ofwan brunfläckiga tarser.

Hanne. Wingarne ofwan blå, flötande i violett, med en ganfka imal, skarpt begränsad linia i utkanterne. Framvingarne främre kant whit. Wingarne undertill askegråagtiga, de

bakre wid basen grönagtiga. De främre hafwa i utfanten twenne rader, med otydligt hwitt omgifna, swarta fläckar, hvilka likwäl äro matta och hafwa en ännu mattare och otydligare antydning till rödgul färg. Innanför dessa går en något bågformigt böjd rad swarta, med hwitt omgifna punkter, af hvilka de twenne närmast infanten, hvilka stundom saknas, icke stå i samma böjning, som de öfriga. Wid diffältets slut finnes en swart, kort streck, som likaledes är omgifwen med hwitt. Innanför denna finnas merendels en eller två, swarta, med hwitt omgifna punkter. Bakwingarne hafwa längs utfanten en rad rödgula fläckar, som utåt äro försedde med swarta punkter och inåt begränsas af skarpt winflade, swarta streck. Från midten af detta fläckband går en hwit fläck inåt wingen till en rad swarta, med hwitt omgifna punkter, af hvilka de trenne första stå i samma linia och bilda en rät winkel mot de öfriga; dessa åter hafwa närmare anslörnet en krökning inåt och sedan utåt. Vid diffältets slut finnes en swart fläck omgifwen af hwitt och innanför denna, wid wingbasen 3—4 swarta, likastora punkter, som bilda en rät linia med hwarandra. Närmast fransarne löper en smal, brun linia. Fransarne äro ofwan till indre hälften bruna och till den yttre hwita; men undertill nästan enfärgadt hwita.

Honan liknar i teckningarne hannen; men är undertill mera flötande i mörkgrått. Till wingarnes öfre sida varierar hon snart sagt i oändlighet. I allmänhet är det rödgula fläckbandet i utfanten af wingarnes undre sida lika starkt uttryckt på de främre, som på de bakre. Följande äro de wigtigaste färgförändringarne:

1. Wingarne ofwan mörkt violettblå med ett swart tverstreck wid slutet af framwingarnes diffält; från basen längs framwingarnes främre kant och från dessas wingspets, snedt till infanten swartbruna med otydliga spår till rödgula fläckar längs utfanten. Bakwingarne från basen längs framkanten söga bredt swartbruna, med en rad rundade, swarta fläckar längs utfanten,

hvilka hwardera hafwa innanför sig en trefantlig, otyblig, mörk fluggning.

2. Wingarne ofwan svartbruna, blott i diffen mörkt violett-blå, med rödgula fläckar längs utkanterne, dels blott på bakwingarne, dels äfwen på framwingarne. Längs utkanten af de förra går, utanför de rödgula fläckarne, en rad swarta, rundade fläckar, som hwardera äro omgifne af en blå ring.

3. Wingarne ofwan svartbruna med en violettblå fläck i diffen, antingen blott på framwingarne eller ock derjemte på bakwingarne, och med en rad med blått omgifne, swarta punkter längs utkanten af de sednare.

4. Wingarne ofwan mörkbruna med blå anstrykning wid basen. För öfrigt lik var. 2.

5. Wingarne ofwan mörkbruna utan fläckar.

Varven, som lefwer på *Ononis*, *Astragalus* och *Fragaria*, är fint hårig, grön med hvita, wågformigt afbrutna, otybliga snedstreck, mörkgrön, något ljus insattad rhgglinia, samt gulagtig eller whitagtig sidolinia. Hufvudet är svart. Mot förwandlingsstunden förloras de wågformiga linierna; larven spinner ej in sig. I nödfall förtär den sina lifar. Man finner den äfwen på *Molilotus* och på *Genista*. Dupan är glänsande brungrön med mörkare rhgglinia och gula lufthål.

Num. Bjärilen har stundom på framwingarnes undre sida de tvenne innersta punkterna af den ocellformiga twerraden sammanslutna med punkterne wid basen, så att derigenom bildas ett halfcirkelformigt svart, med hvitt begränsadt streck. Hos sådana exemplar äro derjemte teckningarne af wingarnes undre sida gröfre, än hos den wauliga formen, med hvilken man träffar dem tillfamma.

9. Ginst-Blåvingen (*Lycæna adonis* W. V.)

Alis infra cineris fascia marginali, maculari, nigro-punctata et lineis nigris acute angulatis intus terminata, fulva, macula posticarum ante hujus modium alba, ad seriem continuam punctorum ocellatorum adscendente, maculaquo discoidali nigra,

albo-marginata et punctis basalibus ocellatis; anticis præterea serie etiam valde arcuata punctorum ocellatorum; fimbria omnium albâ, nigro-maculata. L. al. exp. 30—35 millim.

Mas. Alis supra læte coerulois linea tenuissima marginali nigra.

Femina. Alis supra fuscis, disco plus minus coeruleo, sæpe ocellis intramarginalibus, punctis nigris instructis.

Wingarne undertill afsegrå med ett svartpunkteradt, inåt af skarpt vinklade, svarta linier begränsadt, rödgult fläckband i utfanten, en hvit fläck på bakwingarne nära detta band, hwilken går intill en sammanhängande rad af ocell-lila punkter, och derefter i difsen en svart, med hwitt begränsad fläck, innanföör hwilken finnas några ocell-lila punkter, (merendels på båda wingparen); de främre desutom äfwen försedde med en skarpt båg böjd rad af svarta, ocell-lila punkter; fransarne hwhita med svarta fläckar. L. e. wingip. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{7}{16}$ l.

Stamme. Wingarne ofwan ljusblå med en ganska fin, svart linia uti utfanterne.

Söna. Wingarne ofwan bruna, i difsen mer eller mindre blå, ofta försedda med gula, svartpunkterade oceller i utfanten.

Syn. *Pap. adonis* W. V. p. 184. Hübn. t. 61. f. 298—300. t. 138. f. 698. 699. et t. 127. f. 645. 646. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 1. 299. 134. *Lycæna* Ochs. Schm. I. 2. 33. et 239. IV. 25. et 445. Treitsch. X. 4. 68. II—S. t. 52. I. 248. Gerhard pl. 30. f. 1. *Zephyrus* Dalm. P. Sv. 97. 20. *Polyommatus*. God. et Dup. Lepid. I. p. 210. pl. 14. secund. f. 2. pl. 41. tert. f. 2. *Pap. ceronus* Esp. Schm. I. t. 90. c. 40. f. 2. p. 178. t. 102. c. 57. I. i. p. 50. Hübn. tab. 6. f. 295—297. *Pap. bellargus* Esp. I. c. t. 32. Suppl. 8. f. 3. p. 333. I. 55. c. 5. f. 2. 3. 4. 6. p. 30.

Denna art är högst sällsynt inom Skandinavien. Likväl är den funnen wid Kinnekulle i Westergöthland (Dalm.) och wid Christiania i Norge (Siebke). Dess flygtid infaller i Juli och Augusti månader.

Artbeskr. Ginst-Blåvingen liknar så mycket föregående art, att här endast är nödigt uppföra skillagtigbeterna. Antennklubban är undertill och i spetsen rödgulagtig. Det rödgula fläckbandet på bakvingarnes undre sida är mindre än hos föregående och fläckarne mera tillspetsade; den derpåföljande fläckraden är längre afsläpsten från bandet, än hos meranämnde art och på framvingarne starkare bågböjd. Vid basen af framvingarne finnas 2—3 sådana punkter som hos *L. alexis*. Vingarne äro osvan hos hannen ljust och vackert blå, samt genomlöpa hos honan samma färgtefningar som hos Ruskörne-Blåvingen. Franarne äro hos båda könen rent hwhita med swarta fläckar, der nerverne hafwa sitt utlopp.

Varven lefwer på blomstren af *Trifolium* och *Genista*. Den är grön eller stötande i ljusbrunt med fina, hwhita hår och en mörk rygglinia, wid hwars båda sidor går en rad, trefantiga, gula fläckar. Hufwudet och bröstfötterne äro swartbruna; bukfötterne grönagtiga. Pupen är trubbig, grön eller mörkbrun. (Schf.).

10. Honingsklöfver-Blåvingen

(*Lycæna dorylas* W. V.).

Alis infra cinereo-fuscescentibus marginibus late albis, fasciæ maculari intramarginali sub-nigro-punctata et lineis arcuatis nigris intus interdum terminata, minuta, fulva, macula posticarum ante hujus medium alba, seriem continuam punctorum ocellatorum transcendente, maculaque discoidali anticarum nigra, albo marginata, posticarum alba, et punctis nigris basalibus in anticis nullis, in posticis minutis, ocellatis; anticis præterea serie etiam sat arcuata punctorum ocellatorum; fimbria alba. L. al. exp. 32—40 millim.

Mas. Alis supra coeruleis margine tenui, haud determinato, et extremitatibus nervorum nigris.

Femina. Alis supra fuscis maculis marginalibus fulvis.

Wingarne undertill afsegräsgigt bruna, i utfanterne bredt hvita med ett svartpunkteradt, inåt af bågböjda linier understundom begränsadt, smalt, rödgult band i utfanten, en hvit fläck på bakwingarne nära detta band, hvilken går in åt wingen förbi en rad af ocell-lika punkter, och derefter i diften en på framwingarne svart och hwitkantad, men på bakwingarne hvit fläck, innanför hvilken finnas på framwingarne inga, men på bakwingarne några små, swarta ocell-lika punkter; de främre desutom försedda med en temligen båg-böjd rad af swarta ocell-lika fläckar; fransarne hvita. L. c. wingsp. $1\frac{5}{16}$ — $1\frac{5}{8}$ t.

Stamme. Wingarne ofwan ljusblå med smal, söga begränsad, svart utfant och i hitre ändarne swarta nerver.

Hona. Wingarne ofwan bruna med rödgula fläckar i utfanterne.

Syn. Pap. *dorylas* W. V. p. 322. Hüb. Pap. t. 60. f. 289—294. *Hesperia* Fabr. E. S. III. t. 299. 135. *Lycæna* Ochs. Schm. I. 2. 34. IV. 25. et 145. *Treitsch.* X. 4. 67. II—S. t. 74. f. 363. *Gerh.* pl. 30. f. 3. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. Suppl. I. pl. 12. t. 1—4. *Argus* Boisd. Icon. p. 54. pl. 14. t. 4—3. Pap. *hylas* Esp. Schm. I. t. 45. Suppl. 24. f. 3. p. 375. Pap. *the-tis* Esp. I. c. t. 33. Suppl. 9. f. 3. p. 335.

Äran att hafwa upptäckt inom Skandinavien denna art tillhör vår utmärkte Entomolog, Prof. Zetterstedt i Lund, som fann den samma temligen talrik på flera ställen på Gottland, såsom wid Gothem, på Fårön, Thorsborg och Furillen. Sedan har den blifwit träffad på flera andra ställen på samma ö af Prof. Boheman och Doct. Stenhammar. Förklidet år fann jag den också wid W. Bramb och Årup i Skåne. Dessa äro de enda lokaler iödr artens förekomst inom Skandinavien, som man ännu känner. Desf skigtid infaller i Juli månad och förekommer han då på högländtare ställen i stogs-trakter.

Artbeskr. Höningslöfwer-Blåwingen liknar i mycket de båda föregående arterne, så att det är tillräckligt uppföra desf skiljsagtheter. Antenner, palper och öfriga kroppsdelar såsom hos Pustörne-Blåwingen.

Samme. Wingarne ofwan ljusblå med smal svart utkant, som inåt ej är skarpt afstild fran grundjårgen. Wingnerverne, isynnerhet på framwingarne, närmast utkanten swarta. Wingarne undertill asfegråagtigt-bruna med samma swarta teckning som hos *Pustörne-Blåvingen*; men utfanterne äro bredt hwita och der denna hwita färg slutar finnas små trefantiga, från hwarandra temligen widt stilda, rödgula fläckar, som stundom hafwa utanför sig en rad tydliga swarta punkter, men oftast ganfka små och otydliga sådana, samt inåt mera sällan begränsas af swarta bågformigt böjda streck. På framwingarne äro dessa fläckar mindre tydliga. Den hwita fläck, som går från det rödgula fläckbandet på bakwingarne, sträcker sig här förbi den wanliga punktraden (som liknar den hos *L. alexis*) fram mot diffsläcken, hwilken den likwäl ej hinne. Denna är rent **hvit**, hjertformig, och sänder en liten strimma bakåt. På framwingarne är den deremot i midten swart, såsom hos *Pustörne-Blåvingen*, men här äro de ocellformiga punkterne större än på bakwingarne. Vid basen af framwingarne finnas inga ocelllika punkter; på bakwingarne deremot 2—3 smärre. Fransarne äro rent hwita, merendels ofwan i indre hälften endast på framwingarne bruna.

Honan liknar hannen till wingarnes undre sida. Likwäl är det rödgula fläckbandet merendels större och äfwen tydligt på framwingarne. Ofwan äro wingarne bruna, något glänsande, med rödgula fläckar längs utfanterne, stundom på båda wingparen, stundom blott på det bakre.

Varven, som seswer på blomstren af *Molilotus*, är fint luden, mörkgrön, något stötande i brunt, med en wärdert gul sidoslinia och mörkgrön, fin rygglinia, på hwars båda sidor går en rad gula fläckar. Hufwudet temligen stort, swart, lifaså lufthålén.

11. Silfverfärgade Blåvingen (*Lycæna icarius* Esp.)

Alis infra cinereis basi coerulescente, fascia posticarum

marginali maculari minuta nigro-punctata et lineis nigris acute angulatis intus terminata, fulva, serio communi continua punctorum ocellatorum, et ante illam macula discoidali nigra albo-marginata, punctisque sparsis ocellatis ad basin posticarum; umbria alba. L. al. exp. 30—35 millim.

Mas. Alis supra argenteo-coeruleis margine lato, indeterminato et extremitatibus nervorum nigris.

Femina. Alis supra nigro-fuscis disco plus minus coeruleo, posticis punctis marginalibus nigris, interdum fulvo-ocellatis.

Wingarne undertill aftegrå, wid basen blåagtiga, med ett smalt, svart punkteradt, inåt af skarpt winflade, swarta linier begränsadt, rödgult fläckband i utfanten, intill hwilket går en gemensam, sammanhängande rad swarta, ocell-lifa punkter, och inom denna en svart, hwit begränsad difflek; wid basen af bakwingarne några ocell-lifa, spridda punkter; fransarne hwita. L. e. wingsp. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{7}{16}$ l.

Saunc. Wingarne ofwan flfwerfärgadt blå med bred svart, inåt obestämd utfant och i yttre ändarne swarta nerver.

Sona. Wingarne ofwan svartbruna, i diften mer eller mindre blå; de bakre med swarta punkter i utfanten, och flundom rödgula oceller.

Syn. *Pap. icarius* Esp. Schm. I. t. 49. c. 54. f. 4. p. 35. *Lycæna* Ochs. Schm. I. 2. 37. et 239. IV. 25. Treitsch. X. 1. 68. *Zephyrus* Dalm. Pap. Sv. 97. 19. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. Suppl. I. 68. pl. 44. f. 1. 2. *Argus* Böld. Icon. p. 50. pl. 42. f. 4—3. Zett. Ins. Lapp. 942. 5. *Pap. amandus* Hübn. Pap. I. 59. f. 283—285. *Pap. corydon* Thbg. Diss. II. 39. *Lycæna* Gerh. pl. 29. f. 4.

Denna Blåvinge förekommer mindre allmän i södra och mellersta delarne af vår halfd. Den är anmärkt inom Skåne, wid Trolle-Ljungby och wid Håkanryd inom Tfwetofsta pastorat; inom Småland, wid Anneberg (Bhm.); på Gottland och Öland (Zett.);

inom Östergötland, wid Häradshammar (Stenh.); i Westmanland, wid Norberg (Fredrichs.). Inom södra Norge synes den deremot vara något allmännare, och träffas der wid Christiania, Edsberg, Sölder, Gudbrandsdalen m. fl. st. (Siebke). Huru högt den egentligen går mot nordén känner man ej med wisshet. Dock är det tro- ligt, att den ej finnes inom Lappmarkerne. Dess flygtid infaller i Juni och Juli månader. Den flyger mycket snabbt.

Artbeskr. Äfwen denna art liknar så mycket Pustörne-Blåwin- gen, att wi här endast anföra skilligheterna.

Stann. Vingarne äro ofwan fliswärfärgadt blå med tem- ligen bred, swart utkant, hwilken inåt utan bestämmd färggräns öfswergår i grundsfärgen, som närmast utkanten genomfäres af de derstädes swarta nerverne. Undertill äro vingarne asfegrå, till betydblig bredd wid basen, isynnerhet på bakwingarne, blå- agtiga. De främre sakna i utkanten rödgula fläckar och hafwa blott några mörka fluggningar; dernäst följer en starkt böjd rad af de wanliga ocell-lika punkterna, hwilka här ofta äro tem- ligen små, och slutligen den wanliga distfläcken, innanför hwil- ken ingen fläck finnes wid basen. Bakwingarne hafwa i utkanten rödgula fläckar med samma teckning som hos Pustörne-Blåwin- gen, men de äro här mycket smärre och till en del otydliga; endast tydliga närmast analhörnet. Den hwita fläck, som föregående 3:ne arter ega wid detta band saknas här alldeles, och finnes icke ens antydd. Den wanliga raden af ocell-lika punkter liknar den hos Pustörne-Blåwingen, men gör endast en söga märkbar krökning närmare analhörnet, så att den här är rätare, än hos någon af de 3:ne föregående arterne. Dist- fläcken liknar den hos *L. alexis*, äfwen som de wanliga punk- terna wid basen.

Honan är ofwan swartbrun med mer eller mindre blått i disten. Bakwingarne hafwa merendels en rad swarta punkter längs utkanten och stundom äro dessa omgifne af rödgula rin- gar, så att de likna oceller. Undertill liknar honan alldeles hannen, endast med den skillnad, att de rödgula fläckarne äro på

bakvingarne något mera tydliga, dock icke så mycket, som hos honan till Rufsörne-Blåvingen.

Farven skall lesa på *Fragaria* (Sverolb.)

II. Bakvingarne undertill med svarta punkter och utan rödgula fläckar i utkanten.

A. Ögonen nakna.

12. Svartfläckiga Blåvingen (*Lycæna arion* Lin.)

Alis infra canis, ad basin virescentibus, punctis nigris marginalibus biseriatis distinctis. serie valde arcuata punctorum ocellatorum, macula nigra discoidali albo-marginata punctisque ocellaribus sparsis ad basin; fimbriis albis, infra nigro maculatis. L. al. exp. 40—45 millim.

Mas. *Alis supra coeruleis margine lato punctisque anticarum discoidalibus nigris.*

Femina. *Alis supra coeruleis margine latissimo punctisque anticarum discoidalibus majoribus nigris.*

Wingarne undertill isgrå, vid basen grönagtiga, med tvenne rader svarta, tydliga punkter i utkanterna, en starkt bågböjd rad ocell-lika punkter, en svart, hvitbegränsad fläck i biffen och andra spridda ocell-lika punkter vid basen; fransarne hvita, undertill svartfläckiga. *L. e. vingsp. $1\frac{5}{8}$ — $1\frac{13}{16}$ l.*

Hanne. Wingarne ofwan högbå med bred, svart utkant och svarta punkter i biffen af framvingarne.

Hona. Wingarne ofwan högbå med mycket bred, svart utkant och större svarta punkter i biffen af framvingarne.

Syn. Pap. arion Lin. F. S. 283. 4073. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 1. 293. 418. *Papilio* Hübn. Pap. t. 54. f. 254—256. Text. 44. 2. *Lycæna* Ochs. Schm. 1. 2. 4. IV. 24. Treitsch. A. 1. 58. *Zephyrus* Dalm. Pap. Sv. 94. 13. *Polyommatus*. God. et Dup. Lepid. 1. 219. pl. 44. f. 2. pl. 44. quart, f. 1. *Lycæna* Gerh. pl. 33. f. 3.

Denna vackra Blåvinge finnes der och hvar i Skåne på fogsbackar bland buskar, såsom vid Trolle-Bjuggby och W. Bramb. I Blekinge har jag funnit honom temligen allmän vid Sölvesborg.

På Gottland finnes den på flera ställen, såsom wid Wamblingbo och Ringweide (Vhm.) samt i Wallis iöden (Wahlb.). Dess flygtid infaller i Juli och besöker ssärilen isynnerhet då blommande arter af släktet *Thymus*. Dess flygt är ganska snabb och ihållande.

Artbeskr. Antennerne swarta med hwhita ringar. Klubban swart, i spetsen hwitagtig. Palperne hwhita, i spetsen swarta, undertill med swarta sticlshår. Ögonen bruna, guldglänsande, omgifne af en hwit ring. Hufvudet mellan ögonen swartludet med en blå, längsgående strimma; hjesian blåluden. Ryggskölden blåluden. Abdomen ofwan swart med glesa, blå hår, undertill och på sidorne slfwergrå. Fötterne hwhita med brunringlade tarser.

Saune. Vingarne ofwan högblå med breda, swarta utkant. De främre hafwa wid diffältets slut ett swart streck och mellan detta samt utkanten flera eller färre, parallelt med wingnerverne gående större eller mindre swarta fläckar, hwilka tillsammans bilda en båge. Stundom, ehuru mera sällan, finnes äfwen dylik teckning på bakwingarne. Ofta finnas längs bakwingarnes utkant swarta, med blått omgifna punkter. Undertill äro wingarne isgrå, wid basen, isynnerhet på de bakre, spanstgröna. Längs utkanten gå twenne hwarandra närstående rader af tydliga, swarta fläckar, obetydligt kantade med hwitt. Öfwer diften af hwardera wingen går en rad swarta, med hwitt omgifna punkter, hwilka äro störst på framwingarne, der de bilda en starkt böjd båge (nästan en halfcirkel); 1—2 af de indre punkterna stå ej i samma rad som de öfriga, utan utanföre desä. På bakwingarne är samma rad twenne gånger starkt böjd, så att den, börjande wid framkanten gör ett starkt språng utåt, derefter ett mindre inåt och sedan ångo utåt, förr än den hinner inkanten straxt framom anus. Wid diffältets slut finnes på hwardera wingen ett swart, hwitbegränsadt streck och innansför detta 1—3 swarta, af hwitt omgifna punkter wid wingbasen. Sällan saknas desä helt och hållet på framwingarne. Granarne äro ofwan hwhita, undertill swartfläckiga.

Souan lifnar i det närmaste hannen, men har på vingarna öfre färd bredare svart utfant, hvilken småningom öfvergår i grundfärgen, samt merendels större svarta fläckar.

13. Punkterade Blåvingen (*Lycænaalcon* W. V.)

Alis infra fusco-cinereis punctis nigris marginalibus biserialis obsoletis, serie arcuata punctorum ocellatorum, maculaque nigra discoidali albo-marginata; posticis ad basin aut impunctatis aut punctis ocellatis sparsis; limbris albidis, infra rufosconsis. L. al. exp. 35—40 millim.

Mas. *Alis* supra coeruleis margine tenui nigro.

Femina. *Alis* supra nigro-fuscis disco subcoeruleo punctis obsoletis nigris.

Wingarne undertill brunagtigt aftegrå med twenne rader svarta, otydliga punkter i utfanter, en bågböjd rad ocell-lika punkter och en svart, hvitbegränsad fläck i disken; de bakre wid basen antingen ofläckade eller också med ocelliska, spridda punkter; fransarne hvita, undertill brunagtiga. L. c. wingsp. $1\frac{7}{16}$ — $1\frac{5}{8}$ t.

Hanne. Wingarne öfvan blå med smal, svart utfant.

Hona. Wingarne öfvan svartbruna med söga blå diff och otydliga, svarta punkter.

Syn. Pap. *alcon* W. V. 132. Mübn. Pap. t. 55. f. 263—265. Text. 44. 4. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 1. 293. 120. *Lycæna* Ochs. Schm. I. 2. 7. IV. 25. Treitsch. A. 1. 58. *Zephyrus* Dalm. Pap. Sv. 94. 14. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. Suppl. I. pl. 50. f. 1. (fig. incorr.) *Argus* Boisd. Icon. p. 84. pl. 43. f. 1—3. *Hesp. argiades* Fabr. l. c. 300. 138. Pap. *arcas* Esp. Schm. I. t. 34. suppl. 10. f. 4. 5. p. 338. *Lycæna* Gerh. pl. 32. f. 5.

Punkterade Blåvingen är en af våra sällsyntaste dagflärlar. Den förekommer på fuktiga ängar der och hvar i Wester- och Östergöthland. Inom förra provinsen är den träffad wid Kinnekulle (*Dalm.*); inom den sednare wid Håradshammar och nedanför Namshällsberget wid Söderköping (*Stenh.*). Dess flygtid infaller i sednare hälften af Juni och i början af Juli.

Artbeskr. Puncterade Blåvingen liknar mycket föregående art, men abdomen är undertill brunagtigt grå.

Stamne. Vingarne ofwan höglå, utan swarta punkter och fläckar, men med smal, svart utfant. De främre från basen, utåt framfanten något silfverstämrande. Vingarne undertill brunagtigt askegrå med ett hwitagtigt streck och tvenne, hvarandra närstående rader af matta, otydliga, svartagtiga fläckar längs utfanterne, samt wid distfältets slut ett svart, hwitgulagtigt omgifwet streck. Emellan detta och utfanten går en rad af swarta, hwitgulagtigt omgifna punkter, hwar på bakvingarne löpa till infanten i en mera rät linia, än hos föregående art, sedan de likväl wid framfanten bildat en båge. På framvingarne är denna rad ej heller så starkt bågböjd som hos Svartfläckiga Blåvingen. Wid basen af bakvingarne, hwar der äro obetydligt anslupna med spånstgrönt, finnas 1—3 swarta, med hwitgult omgifna punkter, som sällan saknas; men på framvingarne finnas aldrig sådana. Fransarne äro ofwan hwitagtiga, undertill brunagtiga.

Honan, som till wingarnes undre sida liknar hannen, har den öfre svartbrun med blåagtig dist; wid distfältets slut ett svart streck och emellan detta samt utfanten en böjd rad af otydliga, swarta punkter.

14. Klöfver-Blåvingen (*Lycæna cyllarus* Esp.)

Alis infra lato cinereis, ad basin lato virescentibus, macula discoidali nigra albo-marginata, seriequo punctorum ocellatorum, in posticis minorum. L. al. exp. 30—35 millim.

Mas. *Alis* coeruleis, micantibus, margine tenui, ad apicem latiori, nigro.

Femina. *Alis* nigro-fuscis disco coeruleis, macula discoidali nigra.

Vingarne undertill ljust askegrå, wid basen bredt grönagtiga, med en svart, af hwitt omgifwen fläck i disten och en rad swarta, på bakvingarne små, ocell-lika punkter. *l. e. wingsp.* $1\frac{1}{4}$ — $\frac{7}{16}$ t.

Samme. Vingarne glänsande blå med smal, mot vingspetsen bredare, svart kant.

Sona. Vingarne svartbruna med blå dist och svart fläck i disten.

Syn. *Pap. cyllarus* Esp. Schm. I. t. 33. Suppl. 9. f. 1. 2. p. 334. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 4. 294. 122. *Lycæna* Ochs. Schm. I. 2. 12. IV. 25. Gerh. t. 15. f. 3. *Zephyrus* Dalm. Pap. Sv. 95. 15. *Polyommatus*. God. et Dup. Lepid. I. 222. pl. 11. f. 3. pl. 14. quart. f. 3. *Pap. damoetas* Hübn. Pap. t. 56. f. 266—268.

Liksom föregående art är Klöfwer=Blåvingen en af våra sällsyntare dagsfjärilar. Den uppehåller sig i Maj och Juni månader helst på ängsbäckar, der ekeskog finnes. I Östergötland är den tagen wid Gufum (**Wahlb.**) och wid Hårabshammar (**Stenh.**); på hwilket sednare ställe, den icke är så synnerligen sällsynt. I Upland är den träffad wid Uppsala (**Dalm.**) och wid Ekenäs på Wermdön (**Wahlb.**). Inom Norge är den anmärkt wid Christiania (**Siebtz.**).

Artbest. Antennerne swarta med hwita ringar. Klubban mörkbrun, ofwan wid spetsen hwit. Balperne blåagtigt hwita med svart spets, undertill med swarta stickelhår. Ögonen och hufvudet såsom hos föregående arter. Ryggskölden och abdomen ofwan blålubne. Den sednare undertill hwit. Fötterna blågrå; tarserne med svartagtiga ringar.

Samme. Vingarne ofwan glänsande blå med smal, mot spetsen bredare, svart borda i utkanten. Vingarne undertill ljusl aftegrå; de främre i disten med ett svart, af hwitt omgifwet streck och utansför detta 5—6 swarta, med hwitt omgifna punkter, som bilda en böjd twerrad; isynnerhet 2:ne af dessa äro mycket stora. Bakvingarne från basen, längs infanten och utöfwer midten spanskgröna, med ett otydligt, svart tverstreck wid distfältets slut och en twerrad af små, swarta, af hwitt omgifna punkter, af hwilka 1—2 stå wid framkanten, widt bildade från de öfriga; dessa stundemellan olifstora, så att några af dem snarare likna atomer än punkter. Längs utfanterne af

vingarne löper en smal mörkbrun linia invid de hvita fransarne.

Honan lifnar hannen till vingarnes undre sida med undantag deraf, att den är mera stötande i brunt. Vingarne äro ofwan svartbruna, från basen utöfver diffen blå, med ett svart tvärfreck wid diffsfältets slut. Sällan äro vingarne enfärgadt bruna på öfre sidan.

Varven, som lefwer på *Trifolium*, *Astragalus*, *Gonistamn.* fl. *wexter*, är blekt gulgrön, finluden, med en rödaktig linia längs ryggen, och mörkgröna sidolinier på hvarje sida. Hufvudet och bröstfötterna äro swarta; abdominalfötterna grönaktigt bruna. **Pupan** är brunaktig.

Äm. Bjärilen har slundom på bakvingarnes undre sida blott en ocell-lik (swart, med hvitt omgifven) punkt.

15. Fjellvick-Blåvingen (*Lycæna pherotes* Hübn.)

Alis infra cinereis, anticis macula discoidali nigra, albo marginata, serieque subangulata punctorum ocellatorum; posticis serie duplici macularum albarum. L. al. exp. 25—30 millim.

Mas. *Alis* supra cyaneis margine tenuissimo, indeterminato, nigro.

Femina. *Alis* supra fuscis, lineola discoidali obscuriori. Vingarne undertill assegrå, de främre med en svart, hvitbe-gränssad diffsläck och en nästan vinklåd rad af ocell-lika punkter; de bakre med en dubbel rad af hvita fläckar. L. e. wingsp. 1—1½ t.

Hanne. Vingarne ofwan blå med ganska smal, inåt obergränssad, svart utfant.

Sona. Vingarne ofwan mörkbruna med ett litet, mörkare streck i diffen.

Syn. *Pap. pheretes* Hübn. *Pap. Text.* 45. 8. *Lycæna* Ochs. *Schm.* l. 2. 25. IV. 25. *Gerh.* pl. 22. f. 4. *Polyommatus.* *God. et Dup.* *Lepid.* II. 202. pl. 25. f. 5. 6. *Argus Zett.* *Ins. Lapp.* 942. 3. *Pap. atys* Esp. *Schm.* l. 1. 448. c. 73. f. 4. 5. p. 40. Hübn. *Pap.* t. 97. f. 495. 496.

Fjellvick-Blåvingen upptäcktes inom Skandinavien af Prof.

Boheman 1832, under hans Norrka resa. Den fanns af honom isynnerhet allmän på norra sluttningen af Dövre ssell wid Gästgifswaregården Miise, och sedan wid Drivstuen under jednare hälften af Juni. Sedermera har den äfwen blifwet funnen i Gudbrandsdalen i Juni och Juli månader (Siebke). Förut war den endast känd från Tyrolska och Schweigiska Alperne. Den besöker isynnerhet blomstren på *Astragalus alpinus*.

Artbeskr. Antennerne ofwan swarta med hwhita ringar; undertill hwhitagtiga med bruna ringar. Klubban swart, ofwan med en hwhit tverstrimma nära spetsen. Palperne gråagtiga, mot spetsen swarta; undertill med längre grå och swarta hår. Ögonen swarta, omgifna af en hwhit ring. Hufvudet mellan ögonen swartludet med en blå, hos honan ljusbrun strimma längs midten; hjesfan blåluden, hos honan brunluden. Ryggskölden och abdomen hos hannen blåludna, hos honan brunludna. Abdomen undertill, femte bröstet, gråluden. Fötterne hwhitgrå; tarsferne med bruna ringar.

Hanne. Wingarne ofwan ljusblå med smala, swarta utkanter, hwhilka inåt ej äro skarpt affskilda från grundsfärgen, som närmaßt utkanten genomskäres af de här swarta wingnerverne. Framwingarnes främre kant smalt, men de bakres bredare swart. Framwingarne undertill aftegrå med ett swart, af hwhitt omgifwet streck wid distfältets slut och utansför detta en rad swarta, hwardera med hwhit ring omgifna, små punkter, af hwhilka den första står innanför de öfriga, som tillsammans bilda en rät linia, hwarföre hela raden synes winklad nära framkanten. Bakwingarne något mörkare, wid basen grönagtiga, med tvenne rader, till större delen ovala, hwhita fläckar, samt en mindre fläck nära framkanten wid basen. Den fläck, som är belägen wid distfältets slut, är något hjertformig. Fransarne ofwan hwhita, undertill gråagtiga.

Honan liknar hannen undertill, men är på wingarnes öfre sida mörkbrun med ett mörkare streck wid distfältets slut, samt wid wingbasen något blåpudrad.

16. Lazurfärgade Blåvingen (*Lycæna alsus* W. V.)

Alis intra cinereis macula discoidali nigra, albo-marginata; anticis serie punctorum ocellatorum subrecta; posticis serie punctorum ocellatorum abrupta, sinuata, interdum deficiente punctisque ocellatis basalibus. L. al. exp. 22—28 millim.

Mas. Alis supra fuscis, coeruleo micantibus margine nigro-fusco, tenuissimo.

Femina. Alis supra nigro-fuscis.

Wingarne undertill afsegrå med en svart, af hvitt omglifwen fläck i disten; de främre derjemte med en nästan rät rad af swarta ocell-lika punkter; de bakre med en dylik, men afbruten, bugtig, flundom försvinnande, och derjemte försedda med ocell-lika punkter wid basen. L. e. wingsp. $1\frac{5}{16}$ — $1\frac{1}{8}$ t.

Hanne. Wingarne ofwan bruna, blåskimrande, med ganska smal, svart utkant.

Sona. Wingarne ofwan svartbruna.

Syn. Pap. *alsus* W. V. 184. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 1. 295. 125. *Papilio* Hübn. Pap. t. 58. f. 278. 279. *Lycæna* Ochs. Schm. I. 2. 22. IV. 25. *Treitsch* X. 1. 65. *Gerh.* pl. 13. f. 2. *Zephyrus* Dalm. Pap. Sv. 96. 18. *Argus* Zett. Ins Lapp. 912. 4. *Polyommatus*. God. et Dup. Lepid. II. 208. pl. 26. f. 5. 6. *Pap. minimus* Esp. Schm. I. t. 34. Suppl. 10. f. 3. p. 338. *Pap. alsoides* *Gerh.* t. 13. f. 3.

Denna lilla Blåvinge finnes temligen fringspridd på vår half-ö. Under det den tyckes saknas i wisfa provinser, är den icke just sällsynt i andra. I Skåne finnes den der och hvar, såsom wid Lund (*Zett.*) Erolle-Ljungby och Årup. I Småland är den träffad wid Anneberg och wid Bröms, på gränsen emellan Skåne och Blekinge, samt i Westergöthland wid Kinnekulle (*Whm.*). På Gottland har den blifwit tagen wid Wallö Kyrkoherdeboställe (*Stenh.*) och wid Wamblingbo (*Whm.*) Inom Upland finnes den temligen allmän wid Upsala (*Dalm.*) och wid Stockholm (*Wahlb.*). I Norge är den funnen wid Christiania (*Siebk.*), wid Levanger och Alstahaug (*Zett.*), så att den här tyckes gå ganska högt mot nordn. Inom Swenska Lappmarkerne

ställ den äfwen finnas (Thbg.). I södra delarne af halsön infaller fjärilens flygtid i Maj och Juni månader, men inom de nordligare provinserne först i Juni och Juli, under hwilken sistnämnde månad den blifwit funnen wid Ålstahaug.

Artbeskr. Antennerne svartbruna, hwitringlade. Klubban brun, undertill whitagtig. Palperne blåagtigt hwita med svartagtiga spetsar. Ögonen omgifna af en whit ring. Hufvud och ryggstöld brunludna. Abdomen ofwan brun, undertill blågrå. Bröfset blågrått, ludet. Fötterne whitagtiga.

Samme. Wingarne ofwan svartbruna, blåglänsande, med smal, svart utfant. Wingarne undertill askegrå med ett svart, af hwitt omgifwet streck wid distäktets slut, och utanför denna en rad, små, swarta, af hwitt omgifna punkter. På framvingarne är denna rad nästan rät, endast första punkten wid framkanten står framom de öfriga. På bakvingarne är den deremot närmare infanten bugtig, så att en punkt står långt inom de öfriga, och wid framkanten är den afbruten, så att twenne punkter stå skilda från de öfriga och i annan riktning, än dessa; de bilda nemligen en rät linia med distrecktet, stundom saknas tillöchmed största delen af de punkter, som tillhöra denna rad. Wid basen af bakvingarne finnas några punkter af samma färg, som de förut beskrifna. Franjarne äro whitgrå.

Honan lifnar hannen, men är på wingarnes öfre sida enfärgadt svartbrun.

Parven skall lefwa på *Trifolium* (Heroltb.).

B. Ögonen ludna.

17. Ängs-Blåvingen (*Lycæna acis* Ochs.)

Alis infra cineris, ad basin haud virescentibus, macula discoidali nigra, albo-marginata, seriequo punctorum ocellatorum, anticarum arcuata, posticarum subabrupta, sinuata; basi posticarum unipunctata. L. al. exp. 30—35 millim.

Mas. *Alis* supra coeruleis margine indeterminato et extremitatibus costarum nigris.

Femina. *Alis* supra fuscis.

Wingarne undertill askegrå, wid basen obetydligt grönagtiga, med en svart, af hvitt omgifwen fläck i disken och en rad ocell-lika punkter, hvilken på de främre är bågbojd, och på de bakre något afbruten, bugtig; de bakre bas med en liten punkt. L. e. wingsp. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{7}{16}$ t.

Hanne. Wingarne ofwan blå med obegränsad, svart utfant och nervernes yttre ändar swarta.

Hona. Wingarne ofwan svartbruna, enfärgade.

Syn. *Lycæna acis* Ochs. Schm. I. 2. 44. IV. 25. Gerh. pl. 43. f. 4. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. I. 224. pl. 44. secund. f. 7. pl. 44. quart. f. 4. *Zephyrus argianus* Dalm. Pap. Sv. 95. 46. *Argus* Zett. Ins. Lapp. 942. 4. *Pap. argiolus* Hüb. Pap. I. 56. f. 269—274. Text. 45. 5. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 4. 295. 123. Esp. Schm I. t. 24. f. 4. a. b. p. 277. *Pap. acis* W. V.

Anm. Det är blott för att gifwa wifa för det allmänt antagna bruket, som wi här falla denna art *L. acis*, ehuru han med rätta borde bära det af Dalman gifne namnet, emedan derigenom all collision med följande upphäfses.

Ängs-Blåvingen är ganska allmän öfver hela Skandinavien, de nordligaste provinserne icke undantagna. Från Juni till slutet af Augusti månader flyger han i flockar och på ängar.

Artbeskr. Antennerne swarta, hwitringlade. Klubban svart, undertill hwitagtig. Palperne hwitagtiga, i spetsen swarta, undertill med swarta sticlshår. Ögonen gulbruna, omgifna af en wit ring. Ryggskölden svart, hos hannen med blå, hos honan med brun ludd. Abdomen ofwan svartagtig, undertill hwitagtig. Bröfvet blågrått ludet. Fötterne hwita med brunringlade tarfer.

Hanne. Wingarne ofwan mörktblå, i utfanten swarta, hvilken färg likväl utan bestämd färggräns inåt förlöper i grundfärgen, som wid utfanten genomfäres af de derstädes swarta wingnerverne. Yttersta framfanten af de främre wingarne smalt hwit. Wingarne undertill askegrå med ett svart, af hvitt omgifwet streck i disken och utanför detta en rad

svarta, lifalebes med hwitt omgifna punkter. Denna rad är på framvingarne temligen starkt bågöfö, lifwäl saknas stundom första punkten wid framfanten. På bakvingarne är den nära indre kanten bugtig, såsom hos föregående art, men wid framfanten icke så mycket afbruten som hos denna, emedan de två första punkterna stå här icke i linia med diffstrecket, utan med den 4:de eller 5:te punkten af samma rad. Wid basen af bakvingarne finnes nära framfanten en, de öfrige lifnande punkt, hwilken lifwäl stundom är blott antydd. - Wid basen äro wingarne obetydligt grönagtigt anslupna, lifwäl mer på de bakre, än på de främre. Granarne hwita och närmast dem går på wingarnes undre sida en smal, brunagtig linia.

Houan, som till wingarnes undre sida lifnar hannen, är till den öfre svartbrun, i en wif dager något glänsande, och stundom synes ett otydligt, mörkare streck wid slutet af diffältet. Granarne äro brunagtiga, i wingpetjarne hwita.

Obs. Högst sällan saknas största delen af de ocellulisa punkterna på wingarnes undre sida.

18. Toste-Blåvingen (*Lycæna argiolus* Lin.)

Alis infra lacteo-canis macula discoidali nigra serieque punctorum oblongorum nigrorum, anticarum subarcuata, posticarum valde abrupta, sinuata; basi posticarum tripunctata. L. al. exp. 25—35 millim.

Mas. *Alis* supra læte coeruleis apicibus anticarum tenuissime infuscatis.

Femina. *Alis* supra coeruleis, apicibus anticarum, marginisque antico posticarum lato nigro-fuscis; posticis marginis exteriori nigro-punctato.

Wingarne undertill blåagtigt hwitgrå med en svart fläck i diffen och en rad af swarta, aflånga punkter, hwilken på framvingarne är något fröft samt på bakvingarne ganfka mycket afbruten och bugtig; bakvingarne med 3:ne punkter wid basen. L. e. wingsp. 1—1⁷/₁₆ t.

Sanne. Vingarne ofwan ljusblå med spetsarne på de främre smalt brunagtiga.

Sona. Vingarne ofwan blå, de främres spetsar och de bakres framkant bredt svartbruna; de bakre med svarta punkter i httre kanten.

Syn. *Pap. argiolus* Lin. F. Sv. 284. 1076. *Lycæna* Ochs. Schm. I. 2. 27. IV. 25. & 144. *Treitsch* X. 1. 61. *Gerh.* pl. 13. I. 1. *Zephyrus*. *Dalm.* Pap. Sv. 96. 47. *Argus* Zett. Ins. Lapp. 942. 2. *Polyommatus* God. et Dup. Lepid. I. 225. pl. 14. quart. I. 5 pl. 44. secund. I. 8. *Hesperia acis* Fabr. E. S. III. 1. 295. 124. *Papilio* Hübn. Pap. t. 57. f. 272—274. Text. 46. 11.

Lofse-Blåvingen är en af vårens första tillhörigheter. Redan i början af Maj ser man honom i södra Sverige fluga fram och äter öfver sanke ängar och äfven insinna sig uti trädgårdarne. Något sednare träffas han i de medlersta och nordliga Randskapen af vår half-ö. Suru högt mot norden han egentligen går wet man ännu ej; men åtminstone träffas han ännu wid breddgraden af Hernösand (Zett.). På orter söder om denna stad är han ingenstädes sällsynt hvarfen i Sverige eller i Norge. Litwål föredrager han stogstrakterne framför slättlandet.

Artbeskr. Antennerne svarta med hvita ringar. Klubban brun, i spetsen gulagtig. Balperne blåagtigt hvita, ofwan och i spetsen svarta, undertill med svarta stickelhår. Hufvudet mellan ögonen svartludet med en långgäående blå strimma i midten. Hjesjan och ryggskölden blåluden, abdomen ofwan svart, blåvudrad, med gleja hår; undertill hvit. Bröflet ljust blågrått. Fötterne blåagtigt hvita med svarttringlade tarfer.

Sanne. Vingarne ofwan ljusblå; de främre i spetsen och utåt utkanten smalt svarta; undertill blåagtigt hvitgrå med ett svart streck wid distålets slut och utanför detta en rad af svarta, isynnerhet på framvingarne streckformiga punkter. Denna rad är på framvingarne söga bågböjd, emedan endast första punkten närmast framkanten står innansför de öfrige. På bakvingarne är den närmare infanten bugtig, så att en fläck står

der något inom de öfriga, samt närmare framkanten starkt afbruten, så att 2:ne fläckar stå der widt ifrån de öfriga och i linia med distrecktet. Detta saknas stundom alldeles, eller finnes blott antydt. Wid basen af bakwingarne finnas trenne swarta punkter: en nära framkanten, en i distäktet och en wid infanten. Sällan saknas endera af dem. Stundom finnas också på bakwingarnes undre sida, i utkanten isynnerhet nära analhörnet några otydliga svartagtiga punkter. Gransarne hvita, på framwingarne prydda med svartagtiga fläckar wid nerbernes utlopp.

Sonau, som till wingarnes undre sida lifnar hannen, är till den öfre blå med bred, svartbrun eller svart utkant på framwingarne och framkant på bakwingarne. I utkanten af de sednare finnes också en rad af stundom otydliga, swarta fläckar. Wingarnes svartbruna eller swarta färg varierar mycket till sin utsträckning.

Varven, som lefwer på *Rhamnus frangula*, är gulgrön med mörkgrön rhagglinia och högst korta hår. Hufvud och fötter äro swarta. **Pupan** är glatt och utan skarpa kanter, till främre delen grön, till den bakre stötande i brunt, samt försedt med en svart rhagglinia. (Schf.).

VII. Trib. Erycinides. BOISD.

Pedes 6; antici reliquis breviores, maris debiles, rudimentales.

Cellula discoidalis alarum semiaperta. Costa transversa in medio abrupta, tantum tumiditate connexa.

Margo anticus alarum anticarum costis 3 et ramulis duobus quartæ, nempe ramulis costæ ætæ septimæ et costis 8—10, extenditur.

Costæ alarum posticarum 8; 4:ma o trunco communi cum 2:da, radice simplice, egrediens et ramulum distinctum in lobum basalem emittens; 7:ma—8:va iterum o basi egredientes. Costæ anticarum 10, ad basin inter se æqua-

les; 4:ma e basi, 7:ma triramosa, cum 6:ta ex eodem loco egrediens.

Alæ posticæ pro receptione abdominis canaliculatæ, in margine exteriori integræ.

Larva oblongo-ovata, depressa, tuberculis carnosus hispidis obsita, capito cordato. Tacta se convolvit.

Pupa brevis, crassa, ano mucronato, hispidula, apico anali et filo per medium transverso alligata.

Fötterne 6: det främre paret fortare än de öfriga, hos hannen rudimentära.

Distfältet på vingarne halföppet. Twernerven i midten afbruten, blott sammanhängande genom en uppsvällning.

Framfanten: på framvingarne hålles utspänd genom 3:ne nerver och 2:ne grenar af en sferde; nämligen genom 7:de wingnerbens grenar och genom 8:de—10:de wingnerberne.

Nerverne på bakvingarne 8; den 1:sta, utgående från gemensamt stam med den 2:dra, har enkel rot och utfänder till rotloben en tydlig gren; 7:de—8:de utgå återigen från basen. Framvingarnes nerver 10, wid basen stäm mellan lifformiga; den 1:sta utgående från basen, den 7:de, som är tregrenig, från samma ställe som den 6:te.

Bakvingarne i indre kanten nedböjda till en ränna, deri abdomen upptages; i yttre kanten hela.

Varven aflångt-äggformig, nedtryckt, bevären med fötliga, håriga knölar och försedd med hjertformigt hufvud. Vidrörd sammanrullar den sig.

Pupan kort, tjock, finhårig, med analtagg, fästad wid denna och medelst en om kroppens midt slagen tråd.

Af denna afdelning eger vår Fauna blott ett släkte och en art.

Släktet: *Hammaris*. (HübN.)

(Argynnis Latr. Melitæa OchS. Dalm. Lycæna Treitsch.

Nemeobius Steph. H—S.)

Antennæ longiores, clavatæ. Clava determinata, ovata, compressa.

Palpi squamati, infra pilis divergentibus, apice brevioribus instructi, porrecti, triarticulati: articulus medius reliquis conjunctis multo longior, gracilis; ultimus minutissimus omnium, ovatus, ad basin articulo medio latitudine æqualis.

Oculi nudi.

Pedes antici maris brevissimi, rudimentales tarsibus inarticulatis, femine reliquis quidem breviores, sed iis conformes; femora subtilis hirsuta; articulus primus tarsorum paris intermedi 2:do—4:to longitudine æqualis; 2:dus—3:tius invicem æquales; 4:tus minutus, 5:to duplo longior, tertio fere æqualis l. eo vix longior.

Alæ integre.

Costæ alarum posticarum 8: 1:ma et 2:da, hæc vero biramosa, e trunco communi superiore, 3:ta e costa transversa, 4:ta—6:ta e trunco communi inferiori, et 7:ma—8:va e basi separatim, egredientes; 1:ma ramulum haud reflexum in lobum basalem emittens. Costæ anticarum 10: 1:ma e basi, 2:da—4:ta e trunco communi inferiori, 5:ta e costa transversa, 6:ta—9:na e trunco communi superiori, et 10:ma iterum e basi, egredientes; 6:ta et 7:ma ex eodem loco cellulæ, hæc triramosa. Costa transversa alarum posticarum inter costam 3:am et 4:tam, et anticarum inter 4:tam et 6:tam abrupta, ut costa harum 5:ta ex tumiditate egreditur.

Antennæ temligen långa, klubbformiga. Klubban tybligt stild från skftet, äggformig, sammantryckt.

Halperne fjälliga, undertill med utsperrade, mot spetsen fortare hår, framstående, treledade: medlersta leden smal, mycket längre än de öfriga tillammansattagna; sista leden minst, äggformig, vid basen lika bred som den medlersta.

Ögonen nakna.

Fötterna: de främre hos hannen ganska korta, rudimentära med

olebade tarjen, hos honan widjerstigen fortare än de öfrige, men litwål lifformiga med desja; laren undertill ludna; medlersta parets första tarvled lifa lång med den 2:dra—4:de tillfammen; den 2:dra och 3:dje flinsemellan lifa; den 4:de liten, dubbelt längre än den 5:te, nästan lifa lång med eller söga längre än den 3:dje.

Wingarne helbräddade.

Nerverne på bakvingarne 8: den 1:sta och 2:dra (denna tvågrenig) utgående från öfre nervstammen, den 3:dje från tvernerven, den 4:de 6:te från nedre nervstammen och den 7:de—8:de, stilda, från basen; den 1:sta utiänder en söga bakåtböjd gren at rotloben. Framvingarnes nerver 10: den 1:sta utgående från basen, 2:dra 4:de från nedre nervstammen, 5:te från tvernerven, 6:te—9:de från öfre nervstammen och den 10:de återigen från basen; 6:te och 7:de utgå från samma ställe af distfältet, den jednare tregrenig. Bakvingarnes tvernerv afbruten mellan 3:dje och 4:de vingnerven, och framvingarnes emellan 4:de och 6:te, så att desjas 5:te nerv utgår från uppsvällningen.

Hithörande art har endast en generation om året och framkommer om våren efter att hafwa öfvervintrat såsom pupa.

Gulvifve-Fjärilen (*Hammaris lucina* Lln.)

Alis supra fuscis testaceo maculatis, punctis subocollatis fuscis marginalibus; posticis infra fasciis duabus macularibus albidis. L. al. exp. 28—32 millim.

Wingarne ofwan svartbruna med brungula fläckar och svartagtiga ocellformiga fanpunkter; de bakre undertill med tvenne, af fläckar bestående, hwitagtiga tverband. Σ . e. wingsp. $1\frac{5}{16}$ — $1\frac{5}{16}$ t.

Syn. Pap. *lucina* Lln. F. Sv. 280. 4061. Fabr. E. S. III. 1. 250. 778. Mellæn Ochs. Schm. I. 4. 50. IV. 44. Dalm. Pap. Sv. 77. 40. *Lycæna* Treitsch. X. 1. 76. Papilio Hübner. t. 4. f. 21. 22. Text. 7. 44. Nemeobius II—S. Text. I. Niekerl. Synops. d. Lepid. Fauna Böhmens. I. 47. *Lycæna* Gerh. pl. 35. f. 6.

Gulwiswe=Hjärilen är en af våra sällsyntare dagfjärilar och förekommer i hafselsundar tidigt på våren, redan i Maj månads början. Någon annan säker lokal för dess förekomst, än den Dalman uppgifwer hafwa wi ännu ej. Omkring Upsala är nemligen arten icke sällsynt (Wahlb.). Omkring Stockholm förekommer den äfwen, hwilket Dalman och torde åsyfta, då han säger: "*alibi rarius*".

Artbeskr. Antennerne ofwan swartbruna med hwhita ringar; undertill hwhitagtiga. Klubban swart, i yttersta spetsen rödgulagtig. Balperne swarta, ludna. Hufvudet med en större swart, på sidorne hwhitagtig hårtofs emellan ögonen; på hjesfan gulbrunt ludet. Ögonen gulbruna, bakåt kantade med hwhitt. Nyggstölden brunluden. Abdomen ofwan brun, glest luden; undertill hwhitagtig. Hannens analtofs undertill rödgul, ofwan brun. Bröfket brunludet. Fötterne rödgulagtiga.

Hanne. Wingarne ofwan swartbruna (de främre isen nerhet wid basen) med brungula fläckar, som äro små och otydliga på bakwingarne. Längs utfanterne gå en rad swartagtiga punkter, omgifne hwardera af en brungul ring, hwilken på framwingarne är inåt förlängd. Undertill äro framwingarne brunagtigt gula med swarta och hwhitgula fläckar i difken, samt trefantiga swarta fläckar längs utfanterne, motsvarande öfre sidans punkter. Bakwingarne äro mörkare med tvenne tvärband af hwhitagtiga, olifflora fläckar, som dels äro ovala, dels fyråbida. Längs utfanterne stå en rad swarta, trefantiga, med ljufare brungult omgifna fläckar, som motsvara öfre sidans punkter. Fransarne äro hwhitagtiga med bruna fläckar wid nervernes utlopp.

Honan är större och har mera afrundade wingar än hannen, samt något ljufare brungula fläckar.

Parven, som lefwer på *Primula veris* och *elator*, är blekt olivbrun med swarta lufthål, rostbruna abdominalsfötter, hwhita bröstfötter och hwhitagtig bufsida. Hufvudet är platt, glänsande, rostbrunt, med swarta sidor och mundelar. De på

ryggen varande vårtorne stå i bleka fläckar. I ungdomen har den tvenne rader svarta borstler på ryggen, men med tilltagande ålder förvinna dessa och han blifwer fläderligt hårig, samt får håriga vårtor. **Bupan** är tätt öfverwuxen med fina borstler och hår, har fentlig hufvudregion, svarta wingslidor och gulagtigt hvit abdominalregion.

II. Fam. Hesperioidea.

Margo anticus alarum anticarum ecostatus costis semper 5 simplicibus sustinetur. Ex apico cellulae discoidalis alarum posticarum plica subtilissima in loco costae egreditur.

Caput magnum, thoraci latitudine fere aequale. Antennae basilate distantes. Stommata nulla.

Corpus respectu habito expansionis alarum crassum, robustum. Thorax abdomino latior, depressus, subconvexus.

Alae insecti quiescentis divaricatae l. tantum anticae suberectae. Margo internus alarum posticarum non deflexus, sed per totam longitudinem suplicatus l. subconvolutus, ut canalis pro receptione abdominis non formetur.

Larva tortriciformis, fere nuda, intra folia contorta degens. Pupa mutica, folliculata (involuta).

Framkanten af framvingarne, som sjelf safnar nerv, hålles alltid utspänd medelst fem enkla nerver. Ur spetsen af bakvingarnes distfalt utgår istället för nerv ett gansta fint wef.

Sinfiundet stort nästan lika bredt som thorax. Antennerne wid basen widt åtskillda. Inga punktfögon.

Stroppen med hånseende till wingutsträckningen stark och stor. Thorax bredare än abdomen, nedtryckt, föga konver.

Vingarne under hvilat utsperrade, eller åtminstone blott de främre något upprättstående. Bakvingarnes indre kant icke nedböjd, utan på längden något wefsad eller sammanrullad, så att ingen ränna för abdomens upptagande bildas.

Varven, lik en Bedflare-larv, nästan naken, lefwer dolt emellan sammanvecklade blad. Pupen slät, insvept i hylsa, bildad af sammanspunna blad.

Arterne af denna familj lifna i flykten mera Swärmarne och så kallade Skymningsfjärilar, än de egentliga dagfjärilarne, ehuru de såsom dessa äro i rörelse endast om dagen. Den är snabb och jenn, och flygande hämta de ofta sin näring. Varverne lefwa dels af Monocotyledoner och dels af Dicotyledoner, och arterne tyckas ej hafwa mer än en generation om året.

Githörande Släkten funna på följande sätt karakteriseras:

- A. Tibiæ pedum posticorum calcaribus duobus.
 (Costæ 7:ma et 8:va alarum anticarum approximatæ).
 Sista fotparets tibier försedda med 2:ne sporrar.
 (Gramwingarnes 7:de och 8:de nerver wid basen hvarandra närstående).; **I. Heteropterus.**

- B. Tibiæ pedum posticorum calcaribus quatuor.
 Sista fotparets tibier med 4:ra sporrar.
 1. —Costæ 7 et 8 alarum anticarum ad basin approximatæ.
 Gramwingarnes 7:de och 8:de nerver wid basen hvarandra närstående.

- a. Costa 5:ta alarum anticarum o plica transversa cellulæ egrediens et basi ad costam 4:tam propius accedens. Ex apice cellulæ discoidalis posticarum plica haud distincta egreditur. **II. Hesperia.**
 Gramwingarnes 5:te nerv utgår från distikältets tvärveck och kommer i anseende till basen närmare 4:de än 6:te wingnerven. Ur spetsfen af bakwingarnes distikält utgår ett söga märkbart wingveck.

b. Costa 5:ta alarum anticarum e plica transversa cellulæ, sed exacte in medio inter costam 4:am et 6:am, egrediens. Ex apice cellulæ discoidalis posticarum plica sat distincta egreditur.

III. Syrichtus.

Främvingarne 5:te nerv utgår från bifskäftets tverrvef, men fullkomligt midt emellan 4:de och 6:te vingnerverne. Ur spetsen af bakvingarne bifskäft utgår ett tydligt wingvef.

2. Costæ 7—9 alarum anticarum ad basin approximatae. (Costa 5:ta in medio inter costam 4:tam et 6:tam o plica transversa cellulæ egrediens).

IV. Thanaos.

Främvingarne 7—9 nerver wid basen hvarandra närstående (5:te nerven utgår från bifskäftets tverrvef midt emellan 4:de och 6:te vingnerverne).

Släktet: **Heteropterus** (DUM.) DUP.

(*Hesperia* LATR. OCHS. DALM. *Battus* SCOP. *Erynnis* SCHRANK.
Pamphila FABR. *Steropes* BOISD.)

Antennæ longiores, clavatae. Clava ovata, apice obtusa, recta.

Palpi distantes, hirsutissimi, triarticulati; articulus ultimus distinctus, gracillimus, acuminatus.

Oculi nudi.

Pedes: antici reliquis quidem breviores, sed iis conformes, tibie pedum intermediorum et posticorum ad insertionem tarsorum calcaribus duobus sat validis instructæ. Articulus primus tarsorum pedum anteriorum sequente longior, secundo tertioque longitudine æqualis; secundus tertio, hic tamen quarto, quinto æquante, longior. Articulus primus tarsorum

posticorum sequentibus longitudine æqualis, secundus tertio hic tamen quarto, minutissimo, longior; quintus tertio fere æqualis.

Alæ integræ, posteriore abdomine breviores; anticæ in quiete erectæ.

Costæ alarum posticarum 8: 1—3 o trunco superiore, 4—6 e trunco inferiore, 7—8 e basi egredientes; cellula discoidalis aperta, inter costas 3 et 4 plica transversa tantum subtilissima subclausa. Costæ alarum anticarum 12: 1:ma o basi, 2—3 o trunco communi inferiori, 5—6 e plica subtilissima transversa cellulæ, 7—11 o trunco communi superiori et 12 o basi egredientes; costa 5:ta in medio inter costam 4:tam et 6:tam egrediens; sexta et septima basi discretæ; 7:ma et 8:va ad basin approximate, ex eodem loco cellulæ egredientes; 8—11, inter se æqualiter remotæ, in marginem anticum excurrunt. Cellula discoidalis abrupto truncata, aperta, plica subtilissima inter costas 4 et 7 subclausa. Inter costam 3 et 4 alarum posticarum plica subtilissima o cellula egreditur et in marginem posticum excurrit.

Antennæ temligen långa, försedda med tyblig flubba. Denna äggformig och råt med trubbig spets.

Palperne widt åtskilda, ganska ludna, treledade; fista leden tyblig, ganska smal, tillspetsad.

Ögonen nakna.

Fötterna: de främre visserligen kortare än de öfriga, men lifformiga med desä. Medlersta och bastersta fotparets tibier försedda med tvenne temligen starka sporrar wid tarsernes ledfogning. Första leden af framfötternes tarser längre än den följande, lika lång med den 2:dra och 3:dje; den 2:dra längre än den 3:dje, denna åter längre än den 4:de, hwilken är lika lång med den 5:te. Första leden af bastersta fotparets tarser lika lång med de följande; den 2:dra längre än den 3:dje; denna åter längre än den 4:de, hwilken är minst; den 5:te nästan lika lång med den 3:dje.

Wingarne helbräddade, de bakre fortare än abdomen; de främre under hwilan uppåt hopflagna.

Nerverne på bakwingarne 8: 1:sta- 3:dje utgående från öfre nervstammen, 4:de--6:te från nedre nervstammen och 7:de 8:de från basen; distfältet öppet, blott genom ett ganfka fint tverwef tillslutet emellan 3:dje och 4:de nerverne. Framwingarnes nerver 12: 1:sta utgående från basen, 2:dra- 3:dje från nedre nervstammen, 5:te--6:te från distfältets fina tverwef, 7:de- 11:te från öfre nervstammen och den 12:te från basen; 5:te nerven utgår midt emellan 4:de och 6:te, men denna sednare är wid basen stild från den 7:de; 7:de och 8:de nerverne äro wid basen hwarandra närstående och utgå från samma ställe af distfältet; 8:de--11:te äro från hwarandra lifa långt stilda och utlöpa i framfanten. Distfältet är tverhugget, öppet och emellan 4:de och 7:de nerverne tillslutet blott af ett ganfka fint tverwef. Emellan bakwingarnes 3:dje och 4:de nerv utgår ur distfältet ett fint wingwef, som löper till utfanten.

Af detta slägte räknas endast en art med säkerhet till Skandinavien's Fauna:

Svartfläckiga Glaussmygaren

(*Heteropterus sylvius* **Knock.**)

Alis posticis supra fuscis maculis flavis in disco serieque minorum ad marginem posteriorem; intra fuscis, atomis flavis adspersis, maculis ut in parte superiore. L. al. exp. 25—30 millim.

Mas. *Alis anticis supra flavis micantibus, maculis nigris inæqualibus in disco, serieque macularum minorum ad marginem posteriorem.*

Femina. *Alis anticis supra fuscis maculis fulvo-luteis, fascia maculari margini propiore, dentata, continua, serieque ad marginem posteriorem maculata, fulvis.*

Bakwingarne ofwan mörkbruna med gulgula fläckar i disken och en rad mindre längs utfanten; undertill bruna, öfverpubrade med gula

atomer och pryddas med fläckar såsom på öfre flöden. L. c. wingsp. $1-1\frac{3}{16}$ t.

Samme. De främre vingarne ofvann guldgula, glänsande, med olivflora, svarta fläckar i disken och en rad mindre i utkanten.

Sona. De främre vingarne ofvann mörktbruna med guldgula fläckar i disken; närmare kanten ett tandadt, sammanhängande fläckband och i själfva utkanten en mindre fläckrad, båda guldgula.

Syn. **Pap. sylvius** **Knock.** Beitr. I. St. I. 5. f. 4. 2. p. 74. **Hübner.** Pap. I. 94. f. 477. 478. Text. p. 72. n. 12. **Pap. paniscus** var. b. **Fabr.** E. S. III. 4. 328. 242. **Hesperia sylvius** **Ochs.** Schm. I. 2. p. 221. **Dalm.** Pap. Sv. p. 204. n. 5. **God.** et **Dup.** Lepid. II. p. 244. pl. 27. f. 4. 2. **Heteropterus.** **Wallengr.** Öfvers. af Kongl. Vet. Acad. Förhandl. 1853. p. 22.

Denna öfver allt temligen sällsynta art, hvilken för **Dalman** endast var bekant såsom tillhörande Finlands Fauna och dertföre blef af honom upptagen bland Sveriges dagsfjärilar, har **Prof. Boheman** funnit wid Hove uti Norge och dermed ådagalagt, att den verkligen är en vår half-ös tillhörighet. På uppgifna stället träffades den omkring den 20 Juni.

Artbeskr. Antennerne ofvann svartbruna med whitagtiga ledafdelningar, undertill gula. Klubban ofvann svartbrun, i spetsen och undertill guldgul. Palperne gulagtigt grå, ludna, i spetsen svarta. Hufvud och thorax gulbrunt hårige, isynnerhet det förflnämnda. Abdomen svart, gulspradt och glest hårigt. Analborsten hos hannen svartbrunagtig, undertill gul. Bröfvet brungrått eller gulbrunt, ludet. Fötterna bruna, gulspradade.

Samme. Framvingarne ofvann gulgula, glänsande, wid basen och uti kanterna bruna med 4 svarta, större fläckar i disken, och en rad mindre längs utkanten, af hvilka jevnare de tvenne, som äro närmast wingspetsen, äro längre och belägna mera inåt wingen än de öfrige. Af de fyra disfläckarne är en belägen i själfva disfältet, en wid dettas slut och de tvenne öfriga närmare infanten, men i rätt linia med den förflnämnda.

Undertill äro framvingarne blefare gula, men för öfrigt tecknade såsom på öfre sidan. Bakvingarne ofwan mörkt bruna, glest gulpubrade, med 4—5 större och mindre gulgula fläckar i biffen, och en rad mindre dylika längs utfanten; undertill bruna, öfverpubrade med gula atomer och desutom försedda med mörkbruna vingnervor, ett mörkbrunt streck längs utfanten och blefgula, mer eller mindre tydligt af brunt omgifna gula fläckar, motsvarande öfre sidans. Franfarna bruna, mot spetsarne ljusare.

Hona. Framvingarne ofwan mörkbruna med 2:ne gulgula fläckar i biffstället, af hvilka den ena, som är nästan triangelformig, finnes innanför och den andra, som är nästan fyråddig, utanför en rundad brun fläck; närmare utfanten går ett vågigt och tandadt tverband, bildadt af gulgula fläckar, af hvilka den andra (från framfanten räknadt) är belägen närmare utfanten än de öfrige, men likväl sammanhängande med dem; i utfanten finnes en rad af små, gulgula fläckar. Föröfrigt liknar honan hannen till färgteckningen.

Num. Skuru ännu icke funnen inom Scandinaviens nuvarande gränser, må här likväl för vidare efterforskning uppföras diagnosen till en art, som af Dalman upptages såsom *Zinn* och måhända afwen någonstädes inom Sverige eller Norge kan träffas:

***Heteropterus paniscus* (Esp.)**

Alis supra nigro-fuscis, violaceo submicantibus, maculis fulvis ovatis in disco serieque macularum minutarum fulvarum marginali; anticis præterea fascia maculari, dentata, interrupta fulva; posticis infra fuscis, atomis fulvis creberrime adpersis, ut in parte superiori maculatis.

Wingarne ofwan svartbruna, något blåglänsande, med äggformiga rödgula fläckar i biffen och en rad mindre dylika längs utfanten; de främre desutom med ett af fläckar bildadt, rödgult, genombrutet tverband; de bakre undertill bruna, öfverpubrade med tätstående gula atomer och fläckiga såsom på öfre sidan.

Syn. PAP. *paniscus* ESP. Schm. 1. t. 28. Suppl. 4. f. 2. p. 322. t. 405. c. 50. f. 5. p. 44. var. FABR. E. S. III. 1. 328. 242. HESPERIA OCHS. Schm. 1. 2. 249. IV. 33. TREITSCH. X. 1. 93. DALM. Pap. Sr. p. 204. 4. GOD. et. DUP. Lepid. 1. p. 234. pl. 42. f. 4. 2. PAP. *brontes* HOB. Pap. t. 94. f. 475. 476.

Björilen förekommer i April och Maj flerstädes i Tyssland och äfwen i Finland. Den liknar mycket honan till föregående art, men har mörkare grundfärg, rödgulare fläckar och det rödgula lwerbandet, som på framvingsgarne går emellan biffältet och utkantens fläckrad, genombrutet, så att wid framanten finnes en rödgul större fläck, och, skild från denna samt närmare utkanten, tvenne små, stundem otydliga, samt derefter i rät linia med den förnämnda och infanten 3:ne andra.

Slägtet: *Hesperia* (LATR. OCHS. DALM.) BOISD.

(*Heteropterus* DUMERIL. *Battus* SCOP. *Erynnis* SCHRANK.
Pamphila FABR.)

Antennæ longiores, clavatæ. Clava elongato-ovata, recta, apico intertum mucrone hamiformi reflexo munito.

Palpi distantes, hirsutissimi, triarticulati; articulus medius maximus, latus, ad insertionem articuli basalis latior, inflatus; articulus basalis latitudine medio fere æqualis, sed ultimo longitudine haud æquans, interdum eo multo minor; articulus ultimus gracilis, cylindricus, subacuminatus, fere nudus, prope marginem apicalem superiorem articuli medii insertus, basali longior, interdum medio longitudine haud cedens, in pilositate articulorum reliquorum non occultus.

Oculi nudi.

Pedes: antici reliquis quidem breviores, sed iis conformes. Tibiæ pedum intermediarum ad insertionem tarsorum calcariis duobus validis munitæ, sed tibiæ posteriorum præterea habent calcaria duo breviora fere in medio. Femora infra hirsuta. Articulorum tarsorum proportio fere ut in genere præcedente.

Alæ integræ, posticæ abdomino haud breviores; anticæ in quiete erectæ.

Costæ alarum ut in genere antecedente; costa 1:ma seu truncus communis superior alarum posticarum ramulum rectum, apico erga corpus insecti spectantem, in lobum basalem emittit; costa 5:ta alarum anticarum, quæ sola e plica

tenuissima transversa cellulæ egredit, basi ad costam 4:am propius accedit; costa 6:ta non o plica transversa, sed o trunco communi superiore oritur. Cellula discoidalis alarum anticarum est oblique truncata, aperta, plica tantum subtilissima clausa. E plica transversa cellulæ discoidalis posticarum plica subtilissima haud distincta inter costas 3 et 4 egreditur.

Antennerne temligen långa, försedda med flubba; denna aflångt äggformig, rät, i spetsen understundom försedd med en krogformig, tillbakaföjd tagg.

Palperne widt åtskilda, ganska ludna, treledade: medlersta leden ganska stor, bred, wid basledens ledfogning bredare, uppblåst; basleden nästan lika bred med den medlersta, men knapt längre än den sista, understundom mycket mindre, än denna; sista leden smal, cylindrisk, spetsig, nästan naken, infogad i spetsen af den medlersta nära dennas öfre kant, längre än basleden, understundom söga fortare, än den medlersta, icke dold i de öfrigas hårlighet.

Ögonen nakna.

Fötterna: de främre wiðerligen fortare än de öfrige, men likformiga med dem. Medlersta fotparets tibier försedda med tvenne starke sporrar wid tarsleden, men bakssta parets tibier hafwa desutom nära midten tvenne andra fortare. Låren undertill ludna. Proportionen emellan tarslederne nästan densamma som hos föregående släkte.

Wingarne helbräddade, de bakre knapt fortare än abdomen; de främre under hwilan uppåt hopslagne.

Nerverne på wingarne såsom hos föregående släkte; 1:sta nerven, eller öfre nervstammen på bakwingarne ländler at rotloben en rät gren, som med spetsen är riktad emot insektens kropp; 5:te nerven på framwingarne utgår ensam från diståktets fina tvervef och kommer i anseende till basen närmare 4:de än 6:te nerven; 6:te nerven utgår icke från tvervefet, utan från öfre nervstammen. Diståktet på framwingarne är smedt tverhugget,

öppet, blott genom ett ganfka fint, tverreck tillslutet. Från diståltets tverreck på bakvingarne utgår ett ganfka fint, föga märkbart reck emellan 3:de och 4:de nerverne.

Hithörande arter träffas på ängar och betesmarker företrädesvis i södra och medlersta landskaperna af Scandinaviska halfön. Deras larver äro nakna, med mycket glefa hår der och hvar, samt hafva stort, klotformigt hufvud och första kroppsringen smalare än de öfriga. Pupan är konisk och smärt, samt slutar framtill med en tagg och är på baksidan försedd med en förlängd flida, som innesluter spiralunggan. I anseende till denna flida liknar den pupan till Mattjärilsläktet *Cucullia*. Den är insvept uti en tunn hylsa mellan sammanspunna blad*).

A. Antennklubban i spetsen trubbig, utan tagg. Palpernes sista led nästan lika lång med den medlersta, mycket längre än basleden.

1. Indre Tätelsmygaren (*Hesperia lineola* Scriba.)

Alis supra fulvis, anticis maris lineola nigra tenerrima in disco feminae immaculatis; posticis infra griseo-flavidis, margine interiore flavido; clava antennarum intra apice nigerrima. L. al. exp. 25—30 millim.

Vingarne ofwan rödgula, de främre hos hannen med en fin, svart linia i diften, men hos honan ofläckade; de bakre undertill grågula, i indre fanten gulagtiga; antennklubban undertill i spetsen svart. R. e. wingsp. 1—1³/₁₆ t.

*) Tabula subdivisionum hujus generis:

A. Clava antennarum apice obtuso, non hamato. Articulus palporum ultimus medio longitudine fere æqualis, basali multo longior: *H. lineola* & *linea*.

B. Clava antennarum apice hamato. Articulus palporum ultimus medio multo brevior, basali haud longior: *H. comma* & *sylvanus*.

Syn. *Pap. lineola* Scriba. Journal. III. St. p. 244. *Hesperia* Ochs. Schm. I. 2. 230. IV. 34 & 161. Boisd. Icon. p. 243. pl. 47. f. 4. 5. *Pap. virgula* Hübn. Pap. I. 130. f. 660—663. *Hesp. lineola* Wallengr. Kongl. Vet. Acad. Öfversigt 1853. p. 23. n. 1.

Denna art, som nu för första gången upptages såsom Sörensk, är i Juli och Augusti månader temligen allmän wid Trolle-Ljungby i Skåne, der den isynnerhet träffas på klöfverlanden. Vid Sjöbo och Råseberga i Skåne är den äfven träffad af Prof. Boheman.

Artbeskr. Antennerne ofwan rödgula, undertill gulagtiga. Klubban ofwan och undertill i spetsen alldeles svart, så att antennens gula färg endast på ena sidan med en smal spets utlöper på klubban. Balperne gulagtiga med rödgula och brunagtiga, tätstående, långa hår; sista leden brunagtig, naken. Hufvud och ryggsköld ludne af rödgula, längre hår. Ögonen bruna. Abdomen ofwan längs ryggen brunagtig, på sidorne rödgul, undertill ljusare; analborsten ljust rödgul. Bröflet hvitgult, ludet. Fötterna rödgula.

Hanne. Vingarne ofwan vackert rödgula med mycket smal, svart bord i utkanten, hwarest äfven nerverne äro svartagtiga. Framvingarne hafwa utanför diffältet, längs nedre nervstammen en fin, svart linia, som är alltid rät, men stundom saknas den eller finnes blott otydlig. Fransarne äro gulagtiga. Undertill äro framvingarne i diften rödgula, mot spetsarne ljusgula och i indre kanten wid basen svartagtiga. De bakre äro på samma sida ljust gula med svag gråagtig anströkning och i indre kanten gulagtiga, hwilken sednare färg utan beständ gråns öfvergår i grundfärgen.

Honan liknar till färgen hannen, men saknar den svarta linien på framvingarnes öfre sida och har på samma sida grundfärgen något dystrare, och stundom brunagtigt anslupna bakvingar.

2. Större Tåtelsmygaren (*Hesperia linea* W. V.)

Alis supra sulvis, anticis maris linea nigra in disco, seminæ immaculatis; posticis infra flavo-griseis, macula flava ad

marginem anteriorem; clava antennarum infra apice fulvo. L. al. exp. 33 millim.

Wingarne ofwan rödgula; de främre hos hannen med en svart linia i diffen, hos honan ofläckade; de bakre undertill gulagtigt grå med en höggul fläck längs indre kanten; antennslubban i spetsen undertill rödgul. *L. e. wingsp.* $1\frac{5}{10}$ t.

Syn. *Pap. linea* W. V. p. 160. Fam. A. n. 5. *Hüb.* Text. p. 72. n. 16. pl. 96. f. 485—487. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 1. 326. 236. *Ochs.* Schm. I. 2. 228. IV. 34. *Treitsch.* X. 1. 97. *Dalm.* Pap. Sv. p. 200. n. 1. *God. et Dup.* Lepid. I. p. 233. pl. 42. tert. f. 2. *Pap. thaumas* Esp. Schm. I. 1. 36. Suppl. 12. f. 2. 3. p. 344. *Pap. venula* *Hüb.* Pap. t. 131. f. 666—669. *Hesp. linea* *Wallengr.* K. Wet. Acad. Öfv. 1853. p. 23. n. 2.

Denna fjäril*) är, åtminstone enligt min erfarenhet, sällsyntare än föregående. Den förekommer wid samma tid, som denna. Af *Dalman* angifves de östra provinserna af Sverige, och särskildt Blekinge, såsom wistelseort. Från Skåne har jag sett ett exemplar, tagit af Prof. *Sundewall*.

Artbeskr. Större Tåtelmygaren lifnar så den föregående, att det är tillräckligt här endast angifwa skiljaktigheterna. Antennslubban är undertill svart med rödgul spets. Framwingarne äro smalare än hos föregående, mera långsträckt och spetsiga. Den rödgula färgen ofwan icke så ren och wacker. Den swarta bordan på öfre sidan af wingarnes utkanter bredare och wingnervverne, isynnerhet hos honan, nästan till hela deras längd swarta. Framwingarne äro undertill i spetsen grå med gul anstrykning och bakwingarne äro på samma sida mörkare grå och med mattare gul anstrykning än hos föregående art. De nämnas rotlob är på samma sida gulagtig och i infanten finnes en höggul, stor fläck, som med bestämda gränser skiljer sig från grundfärgen och sträcker sig kilformigt från utkanten nästan

*) *Hesperia lineola* est in Suecia meridionali, v. gr in Scania, sat frequens, sed *H. linea* rarissime occurit, tantum a Celeberr. Prof. *Sundewall* in Scania et a *Dalman* in Blekingia capta.

ända till vingbasen. Hannen har i diffen af framvingarne på samma ställe som Mindre Tåtelmyggaren en grön linia, hvilken ej är rät, utan sned såsom hos följande arter.

Varven är mörkgrön med en mörkare rygglinia, och twenne hwhita sidolinier, hvilka äro kantade med svart. Den lefwer på allmänna Ängståteln (*Aira caepistosa*) och andra gräsarter. Pupan är gröngulagtig med brun flida för spiraltungan (Dup.).

B. Antennklubban i spetsen försedd med en krokformigt tillbakaböjd tagg. Palpernes sista led mycket kortare än den medlersta, knapt längre än basleden.

3. Allmänna Ängsmygaren (*Hesperia comma* Lin.)

Alis posticis infra flavido-virescentibus maculis quadratis albis. L. al. exp. 25—30 millim.

Mas. *Alis supra fulvis marginibus infuscatis, maculis quadratis flavis obsoletioribus, et in disco anticarum linea obliqua nigra, argenteo inscripta.*

Femina. *Alis supra fulvis fusco inductis maculis quadratis flavis distinctioribus.*

Bakvingarne undertill gulagtigt gröna med fyråbida, hwhita fläckar. L. e. wingsp. $1-1\frac{3}{16}$ t.

Hanne. Vingarne ofwan rödgula med brunagtiga utkanter, tydligare, fyråbida, gula fläckar och i diffen af framvingarne en sned, svart linia, som i midten är tecknad med en annan, glänsande silfverfärgad.

Hona. Vingarne ofwan rödgula, öfverdragna med brunt och pryddas med tydligare, gula, fyråbida fläckar.

Syn. Pap. *comma* Lin. F. Sv. 285. 1080. Hüb. Pap. t. 95. f. 479—481. Text. 72. 13. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 1. 325. 233. Ochs. Schm. I. 2. 224. IV. 34. Dalm. Pap. Sv. 201. 3. Zett. Ins. Lapp. 945. 3. God. et Dup. Lepid. I. p. 237. pl. 42. tert. f. 4. H—S. Text. I. 459. Wallengr. Kongl. Wet. Acad. Öfversigt 1853. p. 23. n. 3.

Denna art är under Juni, Juli och Augusti månader allmän på hela Skandinaviska halfön ända upp i Lapplanden och Finnmark.

ferne, hwarest Prof. Betterstedt träffat den. Företredeswis uppe-
 caller den sig på bögländtare ängar och betesmarker; mera sällan
 förekommer den på fälandta ställen.

Hetbestfr. Antennerne mörkt rödgula. Klubban svart. Balperne
 hwitagtiga, tätludna af hwitagtiga och rödgula hår; sista leden
 brunagtig, nafen. Hufvud och ryggsköld tätludna af rödgula
 hår. Abdomen ofwan brunagtig, på sidorne rödgul, undertill
 hwitagtig; analborsten ofwan och på sidorne rödgul, undertill
 hwitagtig. Bröflet tätludet, hwitagtigt. Fötterne af samma färg.

Hanne. Vingarne ofwan rödgula, i utkanterne, äfwenfom i
 bakvingarnes framkant, smalt svartbruna; de främre i wing-
 spetsen med några otydliga, gula, fyråbåda fläckar; längs utkan-
 ten af bakvingarne synas andra dylika, men ännu otydligare; i
 disken af framvingarne en grof uppböjd, svart linia, som längs
 midten prydes af ett silfwerfärgadt streck. Framvingarne un-
 dertill rödgula, i spetsen grönagtiga, wid basen svartagtiga och
 med antydning till öfre sidans swarta diffinia; fläckarne i wing-
 spetsen synas på denna sida tydligare och hwitagtiga; trenne af dem
 stå i framkanten, stilda från hwarandra genom nerverne, och
 twenne stå längre utåt, närmare utkanten. Bakvingarne äro
 på undre sidan gulagtiga, starkt öfverdragna med grönt och
 hafwa i disken, närmare basen 2—3 fyråbåda, hwita fläckar,
 samt närmare utkanten en starkt båg böjd rad af lifaledes fyrå-
 båda och hwita fläckar, hvilka, åtskilda genom nerverne, till en
 del merendels beröra hwarandra med hörnen. Nära infanten
 finnes en silformig, gul fläck, såsom hos föregående art.

Honan liknar till färgteckningen hannen, men saknar den
 swarta diffinien på framvingarnes öfre sida och har på samma
 sida bredare brun bård i wingarnes utkanter; desutom är den
 rödgula grundfärgen öfverdragen med brunagtigt, så att win-
 garnes öfre sida stöter mera i brunt. Denna har också flera
 och tydligare gula fläckar, än hos hannen, så att utom fläckarne
 i framvingarnes spetsar och längs bakvingarnes utkanter finnas
 dylika äfwen i disken på de sednare och från distältets slut till

infanten på de förra. Undertill äro framvingarne spetsar grönagtigare och öfre flåns fläckar synas äfwen här, men flöta i hvitt. Bakvingarne äro lifaledes mera gröna, än hos hannen, och sakna flundom fläckar i biffen.

Varven är smutstgt grön, flötande i rostbrunt med en rad swarta fläckar längs ryggen och flörne. Hufvudet är swart, omgifwet af en hwit, swartkantad ring. (Ochf. Dup.).

4. Större Ängsmygaren (*Hesperia sylvanus* Esp.)

Alis posticis infra flavis, laud virescentibus, maculis quadratis flavis valde obsoletis. L. al. exp. 30—33 millim.

Mas. *Alis supra fulvis marginibus lato infuscatis, maculis quadratis flavis obsoletioribus et in disco anticarum linea obliqua nigra.*

Femina. *Alis supra fulvis, fusco inductis, maculis quadratis flavis distinctioribus.*

Bakvingarne undertill gula, söga flötande i grönt, med flrsflåiga, gula, ganska tydliga fläckar. L. e. wingsp. $1\frac{3}{16}$ — $1\frac{5}{16}$ t.

Hanne. Wingarne ofwan rödgula med bred, brun borb i utfanterne och omärfligare gula, flrsflåiga fläckar, samt i biffen af framwingarne en sned, swart linia.

Hona. Wingarne ofwan rödgula, öfwerbragna med brunt och prydda med tydligare, gula, flrsflåiga fläckar.

Syn. Pap. *sylvanus* Esp. Schm. I. t. 36. Suppl. 12. f. 1. p. 343. Hüb. Pap. t. 95. l. 482—484. Text. 72. 14. *Hesperia* Fabr. E. S. III. 1. 326. 237. Ochf. Schm. I. 2. 226. IV. 34. Dalm. P. Sv. 204. 2. God. et Dup. Lepid. I. 235 pl. 12. secund. f. 2. II—S. Text. I. p. 159. Wallengr. Kongl. Wet. Acad. Öfversigt 1853. p. 23. n. 4.

Större Ängsmygaren är icke sällsynt på ängar och betesmarker i flögstrakterne af Sveriges södra och medlersta landflaper äfvensom i södra delen af Norge. Ut i Skåne, Blekinge, Småland, Östergötland, Westergötland, Upland och Westmanland är den träffad på flera ställen, samt i Norge wid Christiania, i Österdalen och Gudbrandsdalen. Dess flågtid infaller i Juli och Augusti månader.

Artbest. Denna art liknar *Ulmänna Ångsmygaren* ganska mycket och är lätt att förblanda dermed. Den skiljes dock derifrån genom färgen på bakvingarnes undre sida, hvilken är nästan höggul med föga märkbar grön ansstrykning, samt genom de gula, matta och otydliga, ihrsidaiga fläckarne, hvilka för öfrigt hafva både på bakvingar och framvingar samma ställning som hos nämnde art. Öfre sidan är desutom mörkare med bredare svartbrun bord i utkanterne af vingarne och hannens distreck saknar helt och hållet den silfverhvita linien, som finnes i midten deraf hos föregående art. Färgskilnaden könen emellan är densamma, som hos *Ulmänna Ångsmygaren*, dock synes honan vara mörkare på vingarnes öfre sida än hos denna.

Släktet: **Syrichthus** BOISD.

(*Hesperia* LATR. OCHS. DALM. ZETT. *Heteropterus* DUM.
Battus SCOP. *Erynnis* SCHRANK. *Pamphila* FABR. *Thymeles*
 FABR. STEPH. *Syrichthus* et *Spilothyrus* DUP.)

Antennæ longiores, clavatæ. Clava elongata, sensim incrassata, obtusa, nonnihil arcuata.

Palpi distantes, hirsutissimi, triarticulati: articulus medius maximus, reliquis conjunctis major ovatus, ad insertionem articuli basali gracilior, apicem versus latior, tumidus; articulus ultimus in apice medii insertus, gracilis, ovatus, basali longitudine fere æqualis, subnudus, in pilositate reliquorum fere occultus; articulus basalis ultimo nonnihil brevior vel eo longitudine et articulo medio latitudine æqualis.

Pedes ut in genere prioro; sic etiam forma tiliarum; sed proportio articulorum tarsorum alia est: articulus primus pedum anteriorum sequentibus conjunctis æqualis, secundus tertio, hic verum quarto, minutissimo, longior, quintus tertio æqualis; articulus primus pedum posteriorum sequentibus longitudine æqualis, secundus tertio, hic tamen quarto longior, quartus quinto æqualis.

Alae integrae, posticae longitudinem abdominis non superantes; omnes in quieto horizontaliter domissae.

Costae alarum ut in genere praecedente, sed ramulus costae primae posticarum sat brevis, et costa 5:ta anticarum, cum costa 6:ta o plica transversa cellulae oriens, exacto in medio inter costam 4:tam et 6:tam egreditur. Intervallum basale inter costam 8:vam et 9:nam anticarum multo minus, quam inter costam 9:nam et 10:mam. Cellula discoidalis alarum anticarum est abrupto truncata, aperta, plica tantum tenuissima clausa. E plica transversa cellulae discoidalis posticarum plica subtilis, etsi sat distincta, inter costam 3:am et 4:tam loco costae egreditur.

Mutennerne temligen långa, flubbformiga. Klubban långsträckt, småningom tilltjocknande, trubbig, något böjd.

Basperne vidt åtskilda, ganska ludna, treledade: medlersta leden störst, större än de öfriga tillsammans, äggformig, vid ledjogningen med basleden smalare, mot spetsen bredare, jäväll; sista leden infogad i spetsen af den medlersta, smal, äggformig, nästan lika lång med basleden, nästan nafen och bolid i de öfriga hårrighet; basleden något kortare än, eller lika lång med den sista, och lika bred med den medlersta.

Fötterna såsom hos föregående släkte; så äfven tibiernes form, men förhållandet mellan tarsledderna är annorlunda: 1:sta leden af främsta fotparets tarser lika lång med de följande tillsammans, 2:dra längre än 3:dje, denna längre än 4:de, hvilken är ganska liten, 5:te lika lång med den 3:dje; 1:sta leden af bakre fotparets tarser lika lång med alla de följande tillsammans, 2:dra längre än 3:dje, denna längre än 4:de, hvilken är lika lång med den 5:te.

Wingarne helbräddade, de bakre icke öfverstigande abdomens längd; alla under hvilat horisontelt nedslagne.

Nerverne på wingarne såsom hos föregående släkte, men 1:sta nervens på bakwingarne gren ganska kort och framwingarnes 5:te nerv, som tillika med den 6:te uppkommer från diffäktets tver-

veck., utgår fullkomligt midt emellan 4:de och 6:te wingnerverne. Mellanrummet emellan 8:de och 9:de nerverne på framvingarne är wid basen mycket mindre än emellan 9:de och 10:de. Framvingarnes diffält är tverhugget, öppet, endast tillslutet af ett fint wingveck. Ur diffältets tvärvärd på bakvingarne utgår emellan 3:de och 4:de nerverne ett fint, ehuru ganpa tvärdigt, wingveck i stället för nerv.

Görhörande arter besöka både högländia och sänka ställen, isynnerhet ängar och betomarter. De flesta arterne tillhöra *Scandinaviens* medelsta och norra landskaper. Deras larver lifna föregående släkte, men puporne äro koniska och hvilat emellan sammanspunna blad uti en gläs hyfsa *).

A. De hvita fläckarne emellan 1:sta och 2:dra nerverne på bakvingarnes undre sida nästan lika stora, (den yttre icke större än den vid basen).

I. Klint-Hvisslaren (*Syrictus centaureæ* Boisd.).

Alis supra ob curo fuscis, in nigredinem vertentibus, ma-

*) *Tabula subdivisionum hujus generis:*

A. *Maculæ albæ inter costam 1:am et 2:dam in latere inferiori alarum posticarum fere æquales (postica basali non major): S. centaureæ.*

B. *Maculæ albæ inter costam 1:am et 2:dam in latere inferiori alarum posticarum inæquales, (postica basali evidenter major).*

1. *Maculæ albæ, ad fasciam in latere inferiori alarum posticarum pertinentes, inter costam 3:tiam et 4:tam subæquales, intus abrupte truncatæ: S. alveus & serratulæ.*

2. *Maculæ albæ, ad fasciam in latere inferiori alarum posticarum pertinentes, inter costam 3:tiam et 4:tam inæquales, antica longior, versus basin aut versus marginem posteriorem prominens: S. andromedæ & malvæ.*

culis quadratis albis, posticarum obsoletioribus; anticis subtilis fuscis, cinereo obductis, maculis albis ut in parte superiore lineisque longitudinalibus inter limbum albidum et seriem macularum; posticis subtus nigricantibus, haud virescentibus, costis albidis, maculis basalibus albis, serie macularum albidarum continua margineque interiore nigro-cinereo; clava antennarum antico obscuro brunnea. L. al. exp. 32—33 millim.

Wingarne ofwan mörkbruna, flötande i swart, med hwhita, fyr-sidiga fläckar, som på de bakre äro otydligare; de främre undertill mörkbruna med hwhitgrå ansträfning och fläckar såsom på öfre sidan, samt hwhita, längsgående linier emellan den hwhita utfanten och fläckraden; de bakre undertill swartagtiga, söga flötande i grönt, med hwhita nerver, hwhita fläckar wid basen, en sammanhängande rad af andra bhlifa, och swartgrå infant; antennslubban i främre delen mörkt brun. L. e. wingsp. $1\frac{5}{16}$ — $1\frac{3}{8}$ t.

Syn. *Syrichthus centaureæ* Boisd. *Hesperia* H.—S. Text. I. p. 155. pl. 1. f. 4—3. *Hesperia fritillum* Dalm. P. Sv. p. 202. 7. (certissime. Alii in Museo ejus non exstant.) Zett. Ins. Lapp. 914. 1. ex. parte. *Hesp. alveus* God. et Dup. Lepid. Suppl. I. 259. pl. 42. f. 3. 4. ? (excl. synonym.). *S. centaureæ* Wallengr. Kongl. Wet. Acad. Öfversigt 1853. p. 24. n. 4.

Obs. *H. carthami* Hübn. valde affinis sed re vera distincta. Magnitudo minor; macule albæ alarum posticarum in parte superiore obsoletiores (series interna non tam expressa quam in illa). Macula interna inter costam primam et secundam in parte superiore alarum anticarum dupplex, ubi illa maculam albam geret unicam. Alæ posticæ etiam infra obscuriores sunt, quam in illa, haud virescentes, et costæ albæ, minime virescentes.

Denna art tillhör endast den högre norden af vår half-ö, der den i Lappmarkernes sankare stogstrakter förekommer i Juni och Juli månader icke särdeles sällsynt. Wid Lycksele i Umeå Lappmark är den tagen af Prof. Zetterstedt, och af Prof. Boheman wid Quickjock i Pitå Lappmark. Från Torneå Lappmark finnas exemplar i Kongl. Wet. Academiens i Stockholm Museum *).

*) *S. centaureæ* habitat in Lapponia: ad Lycksele, Quickjock et Torneå.

Artbeskr. Antennerne ofwan swarta med hwhita ringar, undertill hwhitagtiga. Klubban ofwan swart, framtill brun eller mörkt rödbrun, undertill och baktill hwhitgulagtig. Balperne tätsudna, hwhita, med inblandade mörkbruna hår; sista leden svartbrun. Hufvud och ryggsföld tät gråsudna. Abdomen ofwan swart med grå ludd, undertill hwhitagtig. Analborsten till öfre hälften brunagtig, till den undre hwhitagtig. Bröflet starkt ludet, mörkt grått. Fötterne mörkgrå med gulagtiga tarser.

Samme och houna. Wingarne ofwan mörkbruna, slötande i swart, wid basen gråagtigt sudna. Framwingarnes främre kant hwhitfläckig, längs utfanten af samma wingars öfre sida löper en slingrande rad af spyrantiga hwhita fläckar, af hwhilka den tredje från infanten och de trenne närmast framfanten warande stå innauför den rätta linia, som bildas af de öfrige, men likväl icke i linia med hwarandra; i distältet en större hwhit fläck och wid bettas slut en mindre, hwhitagtig och otydlig; emellan den distälcken och framfanten en mindre tretanad, och emellan första och andra wingnerven en dubbel, spyrstidig, hwhit fläck. Bakwingarne hafwa ofwan wid basen en eller annan otydlig, hwhitagtig fläck, i midten af framfanten en stor, rent hwhit och från denna ett twerband af andra otydligare, samt desutom nära utfanten en rad mindre, olisformiga fläckar, alla hwhitagtiga, ehuru en och annan, stundom de flesta synas lifsom sammanflytande med grundfärgen. Framwingarne undertill bruna med grå anstrykning öfwer hela ytan, samt äro, hwad de hwhita fläckarne beträffar, tecknade såsom på öfre sidan, med undantag deraf att den dubbla fläckens emellan 1:sta och 2:dra nerven här helt och hållet saknas; emellan den hwhitagtiga utfanten och närmaste fläckrad finnas flera längsfläande, korta, hwhita linier. Bakwingarne undertill swartagtiga med obetydlig, grönagtig anstrykning, hwhilken likväl är märkbar, icke längs wingens utfant än närmare des infant; wid basen finnas trenne hwhita fläckar, hwhilka på så sätt bilda en twerrad, att de twenne inbre beröra hwarandra med långsiborne och den yttre (emellan 1:sta och

2:dra wingnerverne) flöter till desäa med ena hörnet, hvarigenom den kommer med hela sin längd bakom de öfriga; öfver diffen, från framkanten till 7:de wingnerven går en annan sammanhängande tverrad af hvita, olifformiga fläckar, bland hvilka den emellan 1:sta och 2:dra wingnerven warande är lifa stor, slundom något mindre, än fläcken emellan samma nerver vid basen, och de båda fläckar, som ligga emellan 3:dje och 4:de wingnerverne och stillas från hvarandra genom det från distaltets tverreck utgående wingwedet, äro finsemellan olitflora, på så sätt, att den intill 3:dje nerven warande är längre utdragen mot wingbasen än den intill 4:de nerven liggande; af de öfriga till samma band hörande fläckar äro de, som finnas mellan 2:dra och 3:dje, 5:te och 6:te, och emellan 6:te och 7:de nerverne, trekantiga, men den emellan 7:de och 8:de wingnerverne deremot fyråbågig, ehuru inåt och utåt merendels ofseun i kanterne. Bakwingarnes framkant och utkant på samma sida hvitagtiga, den sednare med en serie hvita balkfacklar, som begränsa grönagtiga fläckar, hvilka i synnerhet äro tydliga närmast analhörnet; wingnerverne äro rent hvita; infanten svartgrå med en mörtare, triangulär fläck i analhörnet. Wingarnes franjar äro ofwan och undertill hvita med bruna fläckar der nerverne utlöpa.

B. De hvita fläckarne emellan 1:sta och 2:dra nerverne på bakwingarnes undre sida olikstora, (den yttre större än den vid basen).

1. *De hvita fläckarne emellan 3:dje och 4:de wingnerven, hvilka tillhora tverbandet på bakwingarnes undre sida, nästan lika stora, inåt tvert afluggna.*

2. Mattumhvisslaren (Syrichtus alveus Hübn.)

Alis supra obscure fuscis, in nigredinem vertentibus, cinereo subobductis, maculis quadatis albis majoribus, posticarum cinereis obsoletioribus; anticis nuda fuscis, albido line inde ob-

ductis, maculis albis ut in parte superiore; posticis infra vire-scentibus, costis concoloribus, maculis basalibus fasciæque discoi-dali maculata continua albis, et margine interno cinereo ma-cula trigona fusca ad angulum ani; clava antennarum antico ferruginea. L. al. exp. 27—30 millim.

Wingarne ofvran mörkbruna, stötande i svart, föga öfverdragne med gratt, med hvita, temligen stora, ferskliga fläckar, som på de bakre äro gråagtiga och otvofligare; de främre undertill bruna med hår och der hvit anslutning, och med fläckar såsom på öfre sidan; de bakre undertill gröna med nerver af samma färg, hvita fläckar vid basen och ett sammanhängande band af andra lyska öfver dis-sen, samt grå intant med en triangelformig, brunagtig fläck i anal-hörnet; antennslubban framtill rostbrun. L. e. wingsp. $1\frac{1}{16}$ — $1\frac{1}{2}$ t.

Syn. Pap. *alveus* Hübn. Pap. pl. 92. f. 461—463. *Hesperia* H.—S. Text. p. 156. *Hesperia fritillum* Ochs. Schum. I. 2. 207. ex parte. Zett. Ins. Lapp. 914. n. 4. ex parte (cum *Syrichto centaureæ* et *serratulæ* com-mist.) Boheman Kongl. Vet. Acad. öfv. 1847 p. 300 (excl. syn. God. et Hübn. ad *S. fritillum* pertin.). *S. alveus* Wallengr. Kongl. Vet. Acad. Öfversigt 1853. p. 24. n. 2.

Skattunghvisflaren träffas under Juli månad på torra och högs-ländta platzar på flera ställen på Gottland och fringliggande smärre öar. Vid Wamblingo och Hoburgen på öns södra udde har den blifvit tagen af Prof. Boheman; på Thorsburgen på öns östra kust af Adj. Dahlbom och på ön Furillen lifaledes på Gottlands östra kust af Prof. Jetterstedt. Annorstädes inom Skandinavien är den icke funnen, så vidt man hittills känner *).

Merckn. Antennerne såsom hos Klint-Hvisflaren, men slubban är framtill rostbrun. Hufvudets och kroppens färg och bestäd-nad lifnar uppmärksamhet, men bröstets ludd och fötterna äro hvitagtigare.

Stämme och hona till färgen lifa hvarandra och äfven lifnande Klint-Hvisflaren, men skiljas från denna genom mindre

*) *S. alveus* habitat in Gottlandia ad Wamblingo, Hoburgen et Thors-burgen, et in insula Furillen.

storlek och mattare, gråagtiga fläckar på bakvingarnes öfre sida. Framvingarnes yttre hvita fläckband är mera brutet, äfven som fläcken i samma wingars distält är mindre. Till wingarnes undre sida lifnar denna fjäril äfven nämnde art, men framvingarnes anströkning är hvitare och renare och de hvita längs-strecken emellan samma wingars ljusare utfant och hvita fläckrad saknas helt och hållet. Bakvingarnes grundfärg är grön och wingnerverne hafva samma gröna färg. Dessutom är på bakvingarne de två fläckarne, som ligga emellan 1:sta och 2:dra wingnerven och af hvilka den ena tillhör wingbasens och den andra distens hvita fläckrad, olifflora, neml. den senare betydligt större än den förra; i distens tverband äro också fläckarne emellan 3:de och 4:de wingnerverne nästan lika stora, d. ä. inåt lika långa och tvært afbyggna, så att den ena icke går längre fram mot wingbasen än den andra. Samma wingars utfant är icke eller continuerligt hvitagtig, såsom förhållandet oftast är hos Klint-Hvisslaren, utan oftast emellan 2:dra och 3:de och alltid emellan 4:de och 5:te wingnerverne grön, stundom med en hvit punkt eller mindre fläck längre in på wingen. Samma wingars infant är mera ljusgrå och den bruna fläcken i anaförnet tydligare.

3. Ängskäre-Hvisslaren (*Syrictus serratulæ* Ramb.)

Alis supra fusco-brunneis. anticis maculis albis quadratis minoribus, posticis fere immaculatis maculis tantum fusco-cinereis obsolescentibus; anticis infra fusco-cinereis maculis albis ut in parte superiore; posticis infra virescentibus maculis albis basilaribus fasciaque in disco maculata alba, evidenter interrupta maculis inter costam 4 et 6 minutis, discretis, et margine interiore cinereo-nigro, immaculato; clava antennarum antico ferruginea. L. al. exp. 23—26 millim.

Wingarne ofwan mörkt rödbruna, de främre med hvita, jyrfliga, mindre fläckar, de bakre nästan ofläckade (fläckarne blott brungråagtiga, försvinnande); de främre undertill brungrå, med hvita fläckar såsom på öfre sidan, de bakre undertill grönaagtiga, med hvita fläckar vid basen och ett tverband af andra dylika öfver disten,

hvisket är tydligt genombrutet, så att fläckarne emellan 4:de och 6:te vingnerverne äro mycket små och skilda från hvarandra; samt med svartgrå, enfärgad infant. Antennklubban framtill rostbrun. L. e. wingsp. $1\frac{5}{16}$ — $1\frac{1}{16}$ t.

Syn. *Hesperia serratulæ* Rambur Fauna Andalous. pl. 8. f. 9. H—S. Text. I. p. 156. pl. 4. f. 18—20. Pap. *alveus* Hübn. Pap. pl. 99. f. 506. *Hesperia* Ochs. Schm. I. 2. p. 206. God. et Dup. Lepid. Suppl. I. p. 312. pl. 50. f. 7. 8. (excl. synonym. Hübn.) *Syrictus* Boisd. Icon. p. 238. pl. 46. f. 4—3. *Hesp. fritillum* Zett. Ins. Lapp. p. 914. f. ex parte. *S. serratulæ* Wallengr. Kongl. Vet. Acad. Öfversigt 1853. p. 24. n. 3.

Ängsfåre-Hvisflaren synes vara mera spridd öfver vår half-ö, än de båda föregående arterne. Den är af Prof. Boheman funnen i närheten af Gåstgöswaregården Råse och wid Drivstuen på Dowre fjäll i Norrige, af Prof. Wahlberg i Wermland, af Theol. Doct. Stenhammar wid Håradshammar i Östergöthland och af Målare-mästaren Fredrichsön i närheten af Norberg i Westmanland *). Den träffas på ängar i slutet af Juni och början af Juli, och har Doct. Stenhammar en gång fångat den på *Lathyrus pratensis* **).

Artbeskr. Hjärilen liknar mycket des båda föregående samsläktningar, men skiljes lätt från dem genom den i allmänhet mindre storleken och genom skilfaktigheterna i färgteckningen. Färgen är oöfvan mörkt rödbrun, icke slötande i svart; på framvingar-nes öfre sida saknas öfäst den hvita fläcken nära basen, emellan 1:sta och 2:dra vingnerven, hvilken Klatt-Hvisflaren har gemensam med Klint-Hvisflaren; bakvingarne äro också oöfvan nästan ofläckade, endast med brun (föga slötande i grå) antydning till de fläckar, som eljest finnas tydligt uttryckta hos de båda nämnda arterne. De hvita fläckarne på framvingar-nes öfre

*) Doct. Sieble i Christiania har i bref till Korf. uppgifwet, att *H. alveus* förefommer wid Christiania och i Gudbrandsdalen. Förmodligen torde det vara denna eller följande art, eller också båda.

**) *S. serratulæ* habitat in Dowre Norvegiæ; in Wermlandia, Westmannia et Ostrogothia Sueciæ.

fläda spira och så vara mindre, än hos Rattun-Svisslaren. Vingarnes undre fläda visar likväl största flilsaktigheten emellan denna och föregående art. De främre äro brungrå, blott med matt antydning till den hvita anströkning, som finnes hos Rattun-Svisslaren; de bakre äro ljusare grönagtiga med grå, icke rent hvit framkant; i dessens tverband äro fläckarne emellan 4:de och 6:te nerverne ofta inga, men då de finnas, äro de alltid från hvarandra flilda icke blott genom den gröna 5:te nerven, utan äfven genom grundens gröna färg, och derjemte flilda från den hvita fläcken emellan 3:dje och 4:de samt emellan 6:te och 7:de nerven, så att denne sednare, som är oval, sitter helt ensam, hvarigenom bandet synes alldeles genombrutet, och icke sammanhängande såsom hos Rattun-Svisslaren. Bakvingarnes indre kant är svartgrå enfärgad, utan mörkare fläck i analhörnet.

2. *De hvita fläckarne emellan 3:dje och 4:de vingnerven, hvilka tillhöra tverbandet på bakvingarnes undre sida, olikstora, den främre längre (mot basen eller och mot utkanten längre utdragen, än den andra).*

4. *Blontis-Elvislaren* (Syrictus andromedæ Wallengr.)

Alis supra fusco-brunneis, anticis maculis quadratis albis majoribus, posticis maculis evanescentibus; anticis infra fusco-griseis maculis albis ut in parte superiore; posticis infra virescentibus fascia media maculata alba, subcontinua maculisque albis difformibus ad basin et margine interiore cinereo, ad angulum ani dilutior; antennarum clava antico ferruginea. Mas. Long. al. exp. 27—28 millim.

Vingarne ofrån mörkt rödbruna, de främre med större fyrstidiga, hvita, de bakre med otydligare och mera försvinnande fläckar; de främre undertill brunagtigt mörkgrå med fläckar såsom på öfre sidan; de bakre undertill gröna med ett nästan sammanhängande band af hvita fläckar öfver midten, andra olikstora fläckar vid basen och gra infant, som vid analhörnet är ljusare. Antennklubbarn framtill rostbrun. $\text{L. e. wingsp. } 1\frac{1}{16} - 1\frac{1}{8} \text{ t.}$

Syn. *Syrictus andromæ* Wallengr. Kongl. Vet. Acad. Ofvörsigt 1853. p. 25. n. 4.

Blomris-Hvisflaren är upptäckt af Prof. Boheman i Dalarnes bergstrakter och på Dovre fjell i Norge. Dess flygtid infaller i slutet af Juni och i början af Juli.

Nertbestr. Denna fjäril liknar mycket Ångskäre-Hvisflaren, i synnerhet till öfre sidans grundfärg, hvilken är mörkt rödbrun och icke svartagtig, som hos Rattun-Hvisflaren, men de hvita fläckarne äro större på framvingarne och tydligare på bakvingarne, såsom hos den sistnämnde; desutom finnes mot basen af framvingarne emellan 1:sta och 2:dra nerven den hvita, dubbla fläck, som Ångskäre-Hvisflaren oftast saknar, men som alltid finnes hos Rattun-Hvisflaren. Undre sidans färgteckning skiljer likväl arten bäst och tydligast från de båda nämnda släktarterne. Midtelbandet, på bakvingarne hvita fläckar emellan 3:dje och 4:de vingnerverne äro hos denna art olifstora, så att den fläck, som är närmast 3:dje nerven, är, liksom hos Klint-Hvisflaren, längre än den andra, och skuter längre in mot vingbasen än denna, och således icke tvert afhuggen, som hos Ångskäre- och Rattun-Hvisflarne. De till samma band hörande fläckar emellan 4:de och 6:te vingnerverne äro tydliga och finsemellan föga åtskilda genom grön färg, ej eller synnerligen skilda från fläcken emellan 6:te och 7:de nerverne, likväl icke så nära förenade med denna eller så stora som hos Rattun-Hvisflaren. Infanten är grå, men icke enfärgad, såsom hos Ångskäre-Hvisflaren, utan mot analbörnet ljusare, men saknar helt och hållet den mörka, trekantiga fläck, som derstädes finnes hos Rattun-Hvisflaren.

Uten liknar också något den af Herrich-Schäffer pl. 4. r. 23. 24 afbildade och af Hambur benämnda arten *S. caca-lia*, men skiljer sig från denna derigenom, att i bakvingarnes midtelband på undre sida icke saknas hvita fläckar emellan 4:de och 6:te vingnerverne, äfvensom derigenom att vid vingbasen på samma sida finnas trenne hvita, från hvarandra likväl tydligt skilda fläckar, då hos nämnde art deremot endast en är till-

flädes, neml. emellan 1:sta och 2:dra nerverne. Äfvenså är öfre sidans färg skiffastig. Hos *S. cacaliæ* är den mera svartbrun och de hvita fläckarne på bakvingarne mycket mera utdragna, nästan inga. Äfvenledes är bakvingarnes infant på undre sidan enfärgadt grå hos *S. cacaliæ*.

Med tillhanda deß jämslägting kan vår art icke på minsta sätt sammanblandas *).

5. **Kattost-Hvisslaren** (*Syrichthus malvæ* Lin.)

Alis supra fuscis, in nigredinem vertentibus, maculis qua-

*) *Descr.* Species *Syrichtho serratulæ* quidem valde affinis, præsertim colore paginæ superioris fusco-brunneo, sed maculæ albæ alarum anticarum sunt majores et posticarum evidentiore, fere ut in *S. alveo*; præterea inter costam 4:am et 2:dam, versus basin alarum anticarum macula, ut in *S. alveo*, adest duplex, alba, quæ *S. serratulæ* sæpissime caret. Color paginæ inferioris tamen a congeneribus jam memoratis speciem facillime et optime distinguit. Maculæ albæ inter costam 3:tiam et 4:tiam alarum posticarum, ad fasciam mediam pertinentes, sunt in specie nostra inæquales, ut macula, costæ 3:tix proxima, sit longior et versus basin alæ, ut in *S. centaureæ* magis elongata, quam altera, nec abrupte truncata, ut in *S. alveo* et *serratulæ*. Maculæ inter costam 4:tiam et 5:tiam, ad fasciam eandem pertinentes, sunt distinctæ et sat conspicuæ, haud inter se colore vicescente discretæ, nec a macula inter costam 6:tiam et 7:am multo separatæ, quamquam cum ea nec ita conjunctæ, neque tam magnæ quam in *S. alveo*. Margo interior est cinereus, non tamen, ut in *S. serratulæ*, unicolor, sed ad angulum ani dilutior, et macula trigona fusca, quam ibi habet *S. alveus*, plane caret hæc species. — *S. andromedæ* est etiam *Syrichtho cacaliæ* Ramb. (H—S. pl. 4. f. 23. 24.) quodam modo similitis, sed ab eo differt fascia media alba paginæ inferioris alarum posticarum maculis inter costam 4:tiam et 6:tiam albis non carente, ut etiam maculis tribus basalibus sat discretis, dum hæc tantum unicam geret. Color paginæ superioris etiam est alius. *S. cacaliæ* habet colorem magis fuscum et maculas albas alarum posticarum obsoletiores, fere nullas; præterea geret marginem interiorem alarum posticarum in pagina inferiore cinereum, unicolorem. — Cum sequente species nostra nullo modo commisci potest.

Hab. in alpidibus Dalecarliæ et in Dowie Norvegiæ.

dratis et punctis albis, posticarum biseriatis distinctis, uticis infra fusco-griseis maculis lere ut in pagina superiori lineisque longitudinalibus inter limbum et seriem albam macularum albis, posticis infra virescentibus nervis dilutioribus, fascia alba maculata media interrupta maculisque difformibus basalibus albis, et margine interiore fusco-cinereo, unicolore: clava antennarum antico fusco-brunnea. L. al. exp. 22—24 millim.

Wingarne ofwan mörkbruna, flötande i svart, med fyrfärdiga hvita fläckar och punkter, hvilka på bakwingarne äro fläckda i tvänne rader och tydliga; framwingarne undertill svartbrunagtigt grå med hvita fläckar, nästan såsom på öfre sidan, och längsstående streck emellan utfanten och den hvita fläckraden; de bakre undertill gröngagtiga med ljufare nerver, en afbruten hvit fläckrad i midten och olifflora basfläckar af samma färg, samt brungrå, enfärgad infant; antennflubban framtill svartbrunagtigt rödbrun. E. c. wingsp. $7\frac{1}{8}$ — $1\frac{15}{16}$ t.

Syn. Pap. *malva* Lin. F. Sv. p. 285. 1081. *Hesperia* Dalm. Pap. Sv. p. 202. 6. Zett. Ins. 915. 2. Pap. *alveolus* Hübn. Pap. t. 92. f. 166. 167. *Hesperia* Ochs. Schm. t. 2. 208. God. et Dup. Lepid. t. p. 240. pl. 12. secund. f. 3.

Maculis alarum anticarum albis coadunatis, fasciam transversam constituentibus.
Bar. b. } Framwingarne's hvita fläckar sammanflötande, bildande ett tvverband.

Syn. Pap. *malva minor* Esp. Schm t. 36. f. 5. P. *sao* Bergstr. Icon t. 40. l. 8. 9. Pap. *lavatera* Fabr. E. S. III. 4. 353. 339 ?

Fascia macularia media in parte inferiore alarum posticarum continua maculis albis cohaerentibus inter costam 4:tam et 6:tam.
Bar. c. } Det hvita tvverbandet på bakwingarne's undre sida sammanhängande medelst hvita sammanhängande fläckar emellan 4:de och 6:te wingnerverne.

Obs. Pap. *malva* Lin. sine dubio est hæc species. "Habitat primo vere in pratis" Celeb. Lüne in Fn. sua

Succana dixit, quod cum alia specie succana hujus generis nullo modo convenit, quoniam *S. albeus* mense Julio *S. serratulæ* et *andromedæ* ad finem Junii et in initio Julii, et *S. centaureæ* mense Junio reperiuntur; *S. alveolus* (Hübner.) tamen jam initio Maji in pratis occurrit. Præterea loco citato legimus: "alæ supra nigro-fusæ", quod in *Syrichtum serratulæ* et *andromedæ*, qui habent colorem fusco-brunneum, nec in nigredinem vertentem, minime quadrat. *S. centaureæ* et *alveus* quidem alas supra "nigro-fuscas", i. e. fuscas in nigredinem vertentes, habent, sed alæ posticæ *Syrichti alvei* fere sunt immaculatæ, tantum maculis cinereis, obsoletioribus notatæ, dum *Linne* nullam differentiam coloris alarum posticarum et anticarum in descriptione indicavit, nam dixit: "alæ maculis parvis seu punctis quadratis albis adspersæ sunt"; et *S. centaureæ* non habet maculas quadratas parvas et nullo modo puncta, quod tamen de *Syrichto alveolo* bene dici potest, quoniam ad marginem anteriorem alarum tam anticarum tam posticarum maculas albas, quæ sub nomine punctorum bene sint referendæ, in eo reperiuntur. Hoc certe quidem sufficit, ut eo nomen *Linneanum* tribuamus, quare etiam *Celeb. Dalman* l. c. jam observavit: "Hæc (*Hesperia*) certissime *P. malvæ* *Lin.* verus, cum a speciebus affinis nulla alia occurrit cui confundatur."

På torra ängar, fält och skogsbäckar är Rattoft-Hvisharen under Maj månad ganska allmän i hela södra och medelsta Skandinavien, och förekommer åtminstone ända upp i nordligare delarne af Dalarne (Bhm.). Äfven skall den finnas i Lappmarkerna (Zett.). Någon gång träffas den äfven i Juni månad, huru dess åhgtid, åtminstone i södra Sverige, infaller egentligen i Maj. Varieteterne äro sällsyntare.

Artbete. Antennslubban undertill svartbrunagtigt rödbrun, för öfrigt lifnar arten till froppdelarnes färg Klint-Hvisharen.

Saune och hona lifna hvarandra till tårgen. Wingarne oöfwan mörkbruna, flötande i svart med hvita tyrfidiga fläckar och punkter, på följande sätt ställda: en i framwingarnes diffäkt; en vid sammas diffäktis slut; 2:ne, blott genom nerven från hvarandra skilda, emellan förflämmande fläck och utkanten; en dubbel emellan 1:sta och 2:dra wingnerven närmare wingbasen;

och en tverrad andra utanför distfältet, på samma sätt köjd och bruten som hos föregående arter; samt emellan den sistnämnde och utfanten en rad otydligare fläckar, hvilka sednare likna punkter. Bakvingarne hafva 2:ne rader hvita fläckar, af hvilka den indre, hvars fläckar äro störst, börjar wid framfanten men hinner ej infanten, utan upphör otfast på wingens midt, eller blott wisar sig derifrån mindre tydlig; den yttre deremot följer utfanten, men har mindre, nästan punktförmiga fläckar. Undertill äro framvingarne svartbrunagtigt grå, eller på svartagtigt-brun grund öfverdragna der och hvar med gråagtigt, för öfrigt med hvita fläckar nästan som på öfre sidan, dock iaknas eller blott swagt antydes den hvita fläcken som på öfre sidan finnes närmare wingbasen emellan 1:sta och 2:dra wingnerven, äfwen som den hvita punktraden, som på öfre sidan följer utfanten, här ersättes genom hvita längsgående streck, hvilka komma från nämnde kant och, mellan nerverne, sträcka sig nästan till den hvita fläckraden. Bakvingarne äro undertill mörkt grönagtiga med ljusare nerver, samt 2 — 3 oliformade hvita fläckar wid basen, ett tverband af hvita fläckar öfver midten, och hvita rundade fläckar närmare utfanten, hvilka ofta sammanflyta med denna. Midtelbandet är emellan 4:de och 6:te nerven otfast helt och hållet genombrutet, så att här inga fläckar finnas och äfwen ganska ofta endast en liten emellan 6:te och 7:de nerverne, men hos *var. c.* träffas på nämnde ställen ganska stora och tydliga fläckar. Samma bands fläckar emellan 3:dje och 4:de nerverne äro wäl oliflöra, men stundom äro båda inåt lika långa och tvert afhuggna, och endast olifa långt bakåt för långda, så att den främre derigenom blir långst, och stundom, jemte det de äro olifa långt bakåt förlängda, är den främste inåt längre utdragen åt basen, än den indre, eller den som är närmast 4:de nerven. I utfanten, isynnerhet emellan 2:dra och 3:dje, samt emellan 4:de och 5:te nerverne, finnas hvita, längsgående småstreck. Framfarn äro på båda sidor hvita med svarta fläckar.

När. b. följer sig blott derigenom att fläckarne på ofre sidan af framvingarne sammanflyta, så att ett tverrbånd derigenom bildas.

Släktet : **Thanaos** BOISD.

(*Hesperia* LATR. OCHS. DALM. *Erynnis* SCHRANK, *Heteropterus* DUM. *Thymele* FABR. STEPH.)

Antennæ longiores, clavatæ. Clava elongata, cylindrica, apice tenuiore, obtuso, valde arcuata.

Palpi distantes, hirsutissimi, triarticulati : articulus medius maximus, reliquis conjunctis major, ovatus, latus, fere conformis ; articulus ultimus in apice medii insertus, medio multo gracilior, cylindricus, basali longior, subnexus, in pilositate reliquorum fere occultus ; articulus basalis ultimo brevior, medio ad insertionem latior.

Pedes ut in genere præcedente, sic etiam forma tibiarum et proportio articulorum tarsorum pedum anteriorum, sed articuli posteriorum aliam proportionem habent : articulus primus tantum tribus sequentibus longitudine æqualis, secundus tertio longior, et tertius, quartus et quintus invicem æquales.

Alæ integræ : posticæ longitudinem abdominis nonnihil superantes ; omnes in quiete horizontaliter demissæ.

Costæ alarum ut in genere præcedente, sed costa 1:ma posticarum ramulum nullum in lobum basalem emitit et costæ 7-9 anticarum ad basin approximatae. Cellula discoidalis alarum anticarum est oblique truncata et plica subtilissima subclausa. E plica transversa cellulæ discoidalis alarum posticarum plica subtilis, etsi sat distincta, inter costam 3:am et 4:am loco costæ egreditur.

Antennerne temligen långa, flubbformiga. Klubban långsträckt, cylindrisk, mot spetsen smalare, trubbig, ganfsta mycket böjd.

Valperne widt åtfälda, ganfsta ludna, treledade : medlersta leden störst, större än de öfrige tillsammansantagna, äggformig, bred,

nästän lifformig; sista leden infogad i spetsen af den medlersta, mycket smalare än midtel-leden, cylindrisk, längre än basleden, nästan naken och bult i de öfrigas hårlighet; basleden kortare än den sista, wid ledfogningen bredare än den medlersta.

Fötterna såsom hos föregående släkte; så äfwen tibiernes form och proportionen emellan främsta fotparets tarsleder, men bakre fotparets tarsleder hafva en annan proportion 1:sta leden blott lika lång med de 3:ne närmast följande, 2:dra längre än 3:dje, och 3:dje, 4:de och 5:te sinst emellan lika långa.

Wingarne helbräddade; de bakre något längre än abdomen; alla under hvilat horisontelt nedslagne.

Nerverne på wingarne såsom hos föregående släkte; men 1:sta nerven på bakwingarne utiänder ingen gren at rotloben och 7-9 nerverne på framwingarne äro wid basen hwarandra närstående. Bakwingarnes distält är inedt tverhugget och tillslutet af ett fint nedd. Ur tvernerven till Bakwingarnes distält utgår emellan 3:dje och 4:de nerverne ett fint, ehuru ganska tydligt, wingvef.

Githörande art uppehåller sig isynnerhet på högländta lokaler.

Släktets larver lifna dem till föregående släkte, äfvensom puporne. Dessa sednare äro lifväl något bågböjda. De flesta arterne tillhöra Nordamerika.

Skogsmygaren (*Thanaos tages* Lin.)

Alis supra fuscis obsoleto albido-larvaceis, serie punctorum alborum intramarginali; anticis puncto obsoleto albo ad marginem anticum L. al. exp. 25—27 millim.

Wingarne oifvan bruna, tydligt hvitpubrade, med en rad hvita punkter i utfanten; de främre med tydlig, hvit punkt wid framfanten. *l. e. wingsp.* 1—1 $\frac{1}{8}$ t.


Syn. Pap. tages Lin. F. S. 286. 4082. *Fabr. E. S.* III. 1. 354. 346. *Hübner. Pap. t.* 91. l. 456. 457. *Text.* 70. 4. *Hesperia* Ochs. *Schm.* 1. 2. 244. *Dalm. Pap. Sv.* 204. 9. *God. et Dup. Lepid.* 1. 244. pl. 12. secund. l. 4. II—S. *Text.* 1. 458.


Denna art förekommer temligen allmän under våren i Maj och Juni månader i södra och medelsta Sverige och i södra Norge, uti Fogstrakter. Mera sällan träffas den i Augusti.

Artbeskr. Antennerne mörkbruna med hvita ringar. Klubbans i bakre hälften hvitgulagtig. Balperne undertill ljusgrå, öfvan brunagtiga, ludna. Hufvud och mellanryggen brunludna. Ögonen mörkeruna. Abdomen öfvan brun, undertill ljusbrun, äfwenfom bröstet, hvilket är starkt ludet.

Hanne och hona lifa. Vingarne öfvan svartbruna med en rad hvita punkter utmed de bruna framfärgarne. Framvingarne vid basen hvitagtigt pudrade och hafwa öfver disken ett bredare, samt närmare utfanten ett smalare tverband, bildadt af hvitagtigt eller gråagtigt puder, mellan hvilka teckningar den svartbruna grundfärgen synes såsom trenne tverband. Dock äro de gråagtiga teckningarne ej alltid lifa tydliga, iönnighet som de lätt afnötas, hvarföre vingarne ofta synas enfärgade. Bakvingarne äro öfvan mera enfärgade, och hafwa blott antydning till en rad hvitagtiga punkter nära intill utfantens punktad. Nära framfanten och utanför diskfältet finnes på framvingarne en liten, hvit punkt, som stundom är dubbel. Vingarne undertill ljusbruna, med en rad hvita punkter i utfanten. Desutom ha bakvingarne inansför nybnämnda rad en annan af samma färg och framvingarne en eller twenne hvita punkter på samma ställe som på öfre sidan.

Varven, som skall lefwa på *Eryngium campestre* och *Lotus corniculatus*, beskifves wara till färgen ljusgrön med brunt hufvud, gul och svartpunkterad rygglinia samt sidolinier af samma färg. Nupen har rödaktig abdominalregion och mörkgröna wingflidor.





JUN -- 1987

